2024年四川省市中区《执业药师之西药学专业二》资格考试王牌题库带答案（综合卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.氟替卡松吸入气雾剂用于轻度哮喘时的用法和用量为

A：一次100～250μg，一日2次

B：一次50～100μg，一日2次

C：一次500～1000μg，一日2次

D：一次250～500μg，一日2次

答案：A

2.与可待因合用，不仅加重便秘，还可增加麻痹性肠梗阻和尿潴留危险的是

A：阿托品

B：硫酸镁

C：哌替啶

D：美沙酮

答案：A

3.患者，女，41岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日6～8次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞8～10/HP，红细胞3～5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2片，口服，3次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2次/日。

A：为阿片受体激动剂

B：含地芬诺酯和阿托品

C: 地芬诺酯对肠道作用类似吗啡

D: 地芬诺酯是吗啡的衍生物

答案：D

4.（2018 年真题）用于治疗疥疮的药物有（）

A: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏

B: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比萘芬软膏

C: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏

D: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏

答案：A

5.对沙眼、结核性眼病及某些病毒性眼病均有治疗作用的药物是()

A: 卡替洛尔

B: 阿托品

C: 左氧氟沙星

D: 利福平

答案：D

6.患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素

A: 慢性胃炎

B: 妊娠期妇女

C: 心肝肾功能严重障碍者

D: 骨髓功能抑制者

答案：A

7.临床上可取代林可霉素应用的是

A: 克林霉素

B: 红霉素

C: 罗红霉素

D: 克拉霉素

答案：A

8.适用于肥胖及单用饮食控制无效的糖尿病患者的是

A: 二甲双胍

B: 胰岛素

C: 格列本脲

D: 西格列汀

答案：A

9.属于利胆类保肝药的是

A: 甘草酸二铵

B: 多烯磷脂酰胆碱

C: 还原型谷胱甘肽

D: 熊去氧胆酸

答案：D

10.长期、单一应用 β

A: 支气管痉挛

B: 头痛

C: 暂时性低血糖

D: 耐药性

答案：D

11.可特异性拮抗肝素抗凝作用的是

A: 酚磺乙胺

B: 甲萘氢醌

C: 氨甲环酸

D: 鱼精蛋白

答案：D

12.对衣原体有效的是

A: 克林霉素

B: 万古霉素

C: 红霉素

D: 替硝唑

答案：C

13.下列不属于一线抗结核药的是

A: 链霉素

B: 吡嗪酰胺

C: 对氨基水杨酸

D: 利福平

答案：C

14.利尿作用极弱，具有降低眼压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

A: 氢氯噻嗪

B: 螺内酯

C: 呋塞米

D: 乙酰唑胺

答案：D

15.关于 α 葡萄糖苷酶抑制剂的作用特点描述，不正确的是

A: 临床用于各型糖尿病

B: 口服吸收很少

C: 可单用于老年患者或餐后高血糖患者

D: 易导致低血糖

答案：D

16.能松弛前列腺和膀胱括约肌，很少发生低血压的抗前列腺增生症药为

A: 坦洛新

B: 酚苄明

C: 特拉唑嗪

D: 乙酰唑胺

答案：A

17.患者，女，26 岁，妊娠 3 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是()。

A: 头孢氨苄

B: 青霉素 G

C: 左氧氟沙星

D: 阿莫西林

答案：C

18.不宜与三环类抗抑郁药合用的药物是

A: 酚甘油滴耳液

B: 麻黄碱滴鼻液

C: 赛洛唑啉滴鼻液

D: 羟甲唑啉滴鼻液

答案：B

19.血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)应避免与()联合应用。

A：留钾利尿剂

B：人促红素

C：噻嗪类利尿剂

D：β 受体阻断剂

答案：A

20.（2020年真题）主要用于解热镇痛，但几乎没有抗炎作用的药物是

A：阿司匹林

B：对乙酰氨基酚

C：吲哚美辛

D：塞来昔布

答案：B

21.中度致吐级别的化疗药有

A：顺铂

B：卡铂

C：甲氨蝶呤

D：依托泊苷

答案：B

22.弱效(使LDL-ch水平降低<30%)的他汀类调血脂药是()

A：大剂量阿托伐他汀

B：小剂量氟伐他汀

C：依折麦布

D：小剂量阿托伐他汀

答案：B

23.患儿。女，14 岁。因出现尿频、尿急、尿痛症状 2 天就诊，诊断为急性膀胱炎，患儿既往有癫痫病史，宜选用的治疗药物是（）。

A: 阿奇霉素

B: 呋喃妥因

C: 环丙沙星

D: 青霉素 G

答案：B

24.属于促性腺激素释放激素类似物的是()

A: 普拉睾酮

B: 戈那瑞林

C: 米非司酮

D: 达那唑

答案：B

25.可使人体对维生素 B

A: 糖皮质激素

B: 丙磺舒

C: 异烟肼

D: 雌激素

答案：B

26.茶碱属于

A: β 肾上腺素受体激动剂

B: 白三烯调节剂

C: 黄嘌呤类药物

D: M 胆碱受体阻断剂

答案：C

27.（2017年真题）可以引起耳蜗神经、肾损害的药物是（）

A: 加替沙星

B: 多西环素

C: 庆大霉素

D: 甲砜霉素

答案：C

28.患者，男，68岁。发热伴咳嗽1周，表情淡漠、气急。近2天全身散在出血点及淤斑，血压60/40mmHg，血红蛋白120g/L，白细胞12×10

A: 鱼精蛋白

B: 维生素C

C: 维生素K

D: 低分子量肝素

答案：A

29.用于肝病的氨基酸制剂的是()

A: 赖氨酸注射液

B: 复方氨基酸注射液(18AA)

C: 复方氨基酸注射液(20AA)

D: 丙氨酰谷氨酰胺注射液

答案：C

30.（2017年真题）对需氧革兰阴性菌具有抗菌活性，属于单酰胺类的抗菌药物是（）

A: 氨曲南

B: 拉氧头孢

C：头孢吡肟

D：头孢西丁

答案：A

31.精神紧张、情绪恐惧所致的失眠

A：谷维素

B：氯美扎酮

C：氟西泮

D：夸西泮

答案：B

32.长期大量使用林旦后会导致的不良反应是

A：眼部水肿

B：白细胞减少

C：肝脏损害

D：中枢神经系统毒性

答案：D

33.维生素K参与合成的凝血因子不包括

A：凝血因子Ⅶ

B：凝血因子Ⅸ

C：凝血因子Ⅷ

D：凝血因子Ⅱ

答案：C

34.袢利尿药中，耳毒性最小，对听力有缺陷及急性肾衰竭者宜选用的药物是()

A：托拉塞米

B: 呋塞米
C: 依他尼酸
D: 布美他尼
答案：D

35.哌拉西林
A: 对G+、G-球菌及螺旋体等有效
B: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效
C: 对支原体有效
D: 对G+、G-球菌，特别是对G-杆菌有效
答案：B

36.白女士，74岁，以“间断性腹胀1月余”主诉入院。患者1个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史14年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：
A: 预防急性肾衰竭
B: 高钾血症
C: 高钠血症
D: 充血性心力衰竭
答案：C

37.抗菌活性强，并对 β-内酰胺酶高度稳定，属于碳青霉烯类的抗菌药物是()。
A: 头孢吡肟
B: 头孢美唑
C: 亚胺培南
D: 氨曲南
答案：C

38.易造成持久性低血糖症，老年糖尿病患者慎用的降血糖药是

A: 胰岛素

B: 格列本脲

C: 甲苯磺丁脲

D: 格列吡嗪

答案：B

39.属于一线抗结核分枝杆菌的药物是

A: 异烟肼、阿米卡星、对氨基水杨酸

B: 异烟肼、利福平、莫西沙星

C: 莫西沙星、卡那霉素、卷曲霉素

D: 异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇

答案：D

40.甘草酸二铵可作为保护肝细胞结构和功能的药物，其属于

A: 必需磷脂类

B: 解毒类药

C: 抗炎类药

D: 促进代谢类药物及维生素

答案：C

41.重症甲状腺功能亢进症病情未控制者不宜使用

A: None

B: 小剂量碘制剂

C: 大剂量碘制剂

D: 甲状腺素

答案：A

42.抗菌谱广，抗菌活性均类似于头孢噻肟的药物是

A：氨曲南

B：拉氧头孢

C：头孢孟多

D：头孢氨苄

答案：B

43.高效选择性5-HT

A：多潘立酮

B：莫沙必利

C：西沙必利

D：甲氧氯普胺

答案：B

44.属于胞嘧啶抗代谢类药物的是

A：长春瑞滨

B：吉西他滨

C：甲氨蝶呤

D：巯嘌呤

答案：B

45.硫脲类的严重不良反应是

A：关节痛

B：甲状腺肿大

C：粒细胞缺乏症

D：药疹、瘙痒

答案：C

46.属于长效避孕药的是

A：壬苯醇醚

B：氯地孕酮

C：米非司酮

D：左炔诺孕酮

答案：B

47.长春碱使细胞有丝分裂停止于

A：G

B：S期

C：G

D：M期

答案：D

48.属于第二代头孢菌素口服制剂的是()。

A：头孢拉定

B：头孢克洛

C：头孢吡肟

D：头孢克肟

答案：B

49.可出现酮尿或乳酸性血症的药物是

A：艾塞那肽

B：胰岛素皮下注射

C：刺激胰岛β细胞释放胰岛素

D：二甲双胍

答案：D

50.下述药物中，不属于促动力药的是

A: 多潘立酮

B: 甲氧氯普胺

C: 莫沙必利

D: 氢氧化铝

答案：D

51.属于多巴胺受体阻断剂的止吐药是

A: 阿瑞吡坦

B: 托烷司琼

C: 甲氧氯普胺

D: 维生素B6

答案：C

52.可导致"类流感样"反应的药物是()

A: 氯屈膦酸二钠

B: 阿仑膦酸钠

C: 依替膦酸二钠

D: 帕米膦酸二钠

答案：B

53.关于氢氧化镁的叙述正确的是

A: 中和胃酸作用强而迅速

B: 对溃疡面有保护作用

C: 不影响排便

D: 口服易吸收

答案：A

54.以下食物与华法林钠不存在相互作用的是

A：红叶苋菜

B：洋葱

C：脱皮黄瓜

D：菠菜叶

答案：C

55.治疗期间避免使用含磨砂剂的化妆品的药物()

A：异维A酸

B：阿达帕林

C：维A酸

D：壬二酸

答案：C

56.以下不属于胰岛素不良反应的是

A：皮下硬结

B：高钾血症

C：低血糖

D：脂肪萎缩与肥厚

答案：B

57.长期使用可使血钾水平升高的药品是

A：乙酰唑胺

B：吲达帕胺

C：氨苯蝶啶

D：呋塞米

答案：C

58.为高渗溶液，静脉给药后可提高血浆渗透压的药物是

A：螺内酯

B：阿米洛利

C：甘油果糖

D：甘露醇

答案：D

59.钙通道阻滞剂的药理作用不包括

A：抗动脉粥样硬化作用

B：松弛支气管平滑肌

C：主要舒张静脉，对动脉影响较小

D：抑制血小板活化

答案：C

60.患者。男，42岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

A：10%~30%

B：大于90%

C：30%~90%

D：1

答案：B

61.能竞争DNA聚合酶的抗病毒药是

A：碘苷

B：拉米夫定

C：利巴韦林

D：阿昔洛韦

答案：D

62.患者，女，46 岁。肝硬化腹水患者，长期使用噻嗪类利尿药不会引起

A: 低氯性碱中毒

B: 低钙血症

C: 高尿酸血症

D: 低钾血症

答案：B

63.通过抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解，增强去甲肾上腺素、5-HT 和多巴胺能神经功能，发挥抗抑郁作用的药物是

A: 吗氯贝胺

B: 阿米替林

C: 度洛西汀

D: 舍曲林

答案：A

64.原发性失眠首选的镇静催眠药种类为

A: 氟西泮

B: 非苯二氮?类药物

C: 苯二氮?类药物

D: 地西泮

答案：B

65.（2016 年真题）与胰岛素合用治疗高钾血症的药物是

A: 葡萄糖

B: 碳酸钙

C: 二磷酸果糖

D: 三磷酸腺苷

答案：A

66.巨幼细胞贫血可选用

A: 维生素 B12

B: 香豆素类

C: 肝素

D: 维生素 K1

答案：A

67.（2019 年真题）老年患者长期大剂量使用可引起骨折的药物是（）

A: 复方碳酸钙

B: 奥美拉唑

C: 替普瑞酮

D: 胶体果胶铋

答案：B

68.有关痤疮治疗用药注意事项，描述不正确的是()

A: 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用在同一时间、同一部位有物理性配伍禁忌

B: 过氧苯甲酰凝胶合用维 A 酸乳膏可加强疗效

C: 维 A 酸的用药部位要避免强烈的日光照射，宜在晚间睡前应用

D: 对林可霉素磷酸酯凝胶过敏者禁用

答案：B

69.关于地高辛作用特点的说法，正确的是

A: 地高辛通过激动 Na+-K+-ATP 酶增强心肌收缩力

B: 地高辛静脉注射后作用持续时间为 2-3h

C: 地高辛口服生物利用度小于 50%

D: 地高辛不经细胞色素 P450 酶代谢，以原型药物从肾脏排泄

答案：D

70.患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

A: 体外试验具有直接的抗凝活性，可抑制体外凝血过程

B: 能刺激脂蛋白脂肪酶的释放，加速血液循环中脂蛋白的清除

C: 能使凝血级联的丝氨酸蛋白酶失活

D: 通过增强抗凝血酶川（AT-1II）的活性，抑制凝血因子 IIa 和 Xa 发挥抗凝作用

答案：D

71.使用某些头孢菌素或其他药物期间，饮酒可能引起“双硫仑样”反应，临床常见的表现不包括

A: 发热、血管扩张、面色潮红

B: 喉头水肿、尿潴留

C: 头痛、胸闷、气急、出汗

D: 血压升高或降低、心率加快调

答案：B

72.患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

A: 骨髓功能抑制

B: 出血性膀胱炎

C：药物性肝炎

D：神经毒性

答案：A

73.毛果芸香碱对眼的作用是

A：缩瞳、降眼压，调节痉挛

B：缩瞳、升眼压，调节痉挛

C：扩瞳、降眼压，调节痉挛

D：扩瞳、升眼压，调节麻痹

答案：A

74.肝素应用过量可注射

A：维生素K

B：葡萄糖酸钙

C：氨甲苯酸

D：鱼精蛋白

答案：D

75.适宜餐前嚼服的助消化药是()。

A：雷尼替丁

B：前列地尔

C：泮托拉唑

D：乳酸菌素

答案：D

76.下列药物中与酚磺乙胺合用可引起中毒的是()

A：氨基己酸

B：氨甲苯酸

C: 维生素 K

D: 维生素 C

答案：A

77.奥美拉唑抑制胃酸分泌的机制是()

A: 阻断 M 受体

B: 阻断 H

C: 阻断促胃液素受体

D: 抑制胃壁细胞 H

答案：D

78.（2019 年真题）沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

A: 患者，男，47 岁，慢性心力衰竭伴高钾血症（血 K+5

B: 患者，男，47 岁，诊断为高血压，生活方式干预无效，随机血压 155/95mHg

C: 患者，男，47 岁，诊断为难治性高血压，使用依那普利、氢氯噻嗪、氨氯地平治疗仍未达标

D: 患者，男，47 岁，慢性心力衰竭，LVEF=35%，血压 120/65mmHg

答案：D

79.以下药物中，不属于散瞳类药物的是

A: 卡波姆

B: 复方托吡卡胺

C: 去氧肾上腺素

D: 阿托品

答案：A

80.手术后出血和血友病辅助治疗宜选用

A：氨甲环酸

B：硫酸亚铁

C：鱼精蛋白

D：维生素 K

答案：A

81.四环素联用抗凝药需要

A：肝毒性增加

B：调整抗凝血药的剂量

C：增加麦角中毒的风险

D：口服吸收减少

答案：B

82.可干扰细菌 DNA 回旋酶或拓扑异构酶Ⅳ，影响细菌 DNA 合成的药物是

A：多黏菌素

B：庆大霉素

C：环丙沙星

D：替加环素

答案：C

83.复方左炔诺孕酮片、复方孕二烯酮片均含有的成份是

A：雌二醇

B：去氧孕烯

C：炔雌醇

D：维生素 B6

答案：C

84.下列关于单克隆抗体抗肿瘤药物的描述，错误的是

A：贝伐单抗作用机制较为特殊，作用于血管内皮生长因子

B：静脉滴注可致患者发生过敏样反应或其他超敏反应

C：优点是选择性“杀灭”，就是只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害

D：对癌细胞和正常体细胞都有“杀灭”作用

答案：D

85.铁剂用药期间需定期做下列检查，以观察治疗效果，不包括

A：巨核细胞计数

B：血红蛋白

C：血清铁蛋白

D：网织红细胞计数

答案：A

86.根据糖皮质激素分泌的昼夜节律，慢性病治疗如何给药对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制较轻

A：晚餐前

B：中午12时左右

C：上午8时左右

D：下午4时左右

答案：C

87.（2016年真题）可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

A：重组人促红素

B：维生素B12

C：人血白蛋白

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/515133322314012033