

2024 贵州省黔西县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试王牌题库加答案下载

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2016 年真题）服药期间饮酒，最容易出现肝损伤的药物是（ ）。

- A: 氯苯那敏
- B: 伪麻黄碱
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 布洛芬

答案：C

2. 病毒神经氨酸酶抑制剂（扎那米韦、奥司他韦）使用的最佳时间是

- A: 在流感症状严重时
- B: 在流感症状初始 48 小时内
- C: 在流感症状初始时
- D: 在流感症状严重 24 小时内

答案：B

3. （2019 年真题）患者，男，72 岁。诊断：高血压，心力衰竭，肋软骨炎。

- A: 地高辛不宜选用
- B: 比索洛尔给药频次不合理
- C: 不应使用红霉素缓释胶囊
- D: 地高辛剂量偏小

答案：C

4. 通过拮抗 α 受体而用于前列腺增生症治疗的药物是

- A: 黄酮哌酯
- B: 前列康
- C: 非那雄胺
- D: 特拉唑嗪

答案: D

5. 药师应对处方进行审核、依照处方准确、快速地调配，体现处方的

- A: 法律性
- B: 技术性
- C: 经济性
- D: 有效性

答案: B

6. 患者男 78 岁，因心房颤动服用华法林治疗 2 年余。后因真菌感染使用氟康唑，用药后 INR 升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是（）

- A: 氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力，导致血中游离的华法林浓度升高
- B: 氟康唑抑制华法林的肾脏排泄，导致华法林血药浓度升高
- C: 氟康唑可增加华法林的吸收，导致华法林血药浓度升高
- D: 氟康唑可抑制 CYP2C9，导致华法林血药浓度升高

答案: D

7. 在氯化钠注射液可形成胶状不溶物是

- A: 苯妥英钠
- B: 氯化钾
- C: 青霉素

D: 红霉素

答案：D

8. 治疗大肠埃希菌所致的尿路感染，不宜选用的抗菌药物是：

A: 左氧氟沙星

B: 头孢呋辛

C: 阿奇霉素

D: 阿莫西林

答案：C

9. 用于癌性胸水

A: 腔内注射

B: 肌肉注射

C: 动脉注药

D: 静脉注射

答案：A

10. 对皮脂腺分泌过多所致的寻常型痤疮首选

A: 0.1%阿达帕林凝胶

B: 红霉素-过氧苯甲酰凝胶

C: 0.03%维 A 酸乳膏剂

D: 10%过氧苯甲酰凝胶

答案：D

11. 长期应用可引起维生素 K 缺乏的药物是

A: 顺铂

B: 格列喹酮

C: 头孢菌素类药物

D: 三环类抗抑郁药

答案：C

12. 各种肠道感染性或非感染性腹泻，或急性胃肠炎可引起

A: 黏液便

B: 冻状便

C: 米泔水样便

D: 稀糊状或水样粪便

答案：D

13. (2018 年真题) 某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A: 尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药，不需要使用额外的避孕措施

B: 在常规时间 20:00 服用 4 月 25 日的药片，不用补服 4 月 24 日的药片

C: 不再继续服用此周期药物，经过一个 7 天的停药期，再开始继续服用下一周期的药物

D: 尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药，在以后的 7 天内要加用屏障避孕法

答案：A

14. 以下药物中，适宜处置蛇类咬伤的是

A: 胃蛋白酶

B: 凝血酶

C: 糜蛋白酶

D: 胰蛋白酶

答案：D

15. 成年人血清中高密度脂蛋白胆固醇含量是

- A: 3.1~5.7mmol / L
- B: 1.03~2.07mmol / L
- C: 0.56~1.70mmol / L
- D: 2.1~3.1mmol / L

答案：B

16. 患者，女，68岁，因哮喘急性发作就医。医师处方：雾化吸入沙丁胺醇、异丙托溴铵、布地奈德混悬液，同时静脉注射氨茶碱、氯化可的松琥珀酸钠。患者用药后3h出现骨骼肌震颤。实验室检查：血钾2.7mmol / L（正常参考范围3.5~5.5mmol / L）。引起患者不良反应的药物应该是

- A: 氨茶碱
- B: 沙丁胺醇
- C: 异丙托溴铵
- D: 布地奈德

答案：B

17. 处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

- A: 过度治疗用药
- B: 无适应证用药
- C: 有禁忌证用药
- D: 联合用药不适宜

答案：B

18. 需要长期使用肾上腺皮质激素的小儿应避免选用()。

- A: 甲泼尼松
- B: 可的松
- C: 地塞米松
- D: 泼尼松

答案: C

19. 血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的 8%~9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下，血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

- A: 61~90g/L
- B: 31~60g/L
- C: <30g/L
- D: >90g/L

答案: C

20. 慢性痛风和痛风性肾病为抑制尿酸生成可选用

- A: 苯溴马隆
- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱
- D: 泼尼松龙

答案: B

21. 男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 肺动脉栓塞
- B: 下肢深静脉血栓形成

C: 病理性骨折

D: 下肢动脉栓塞

答案: B

22. 可治疗原发性痛经的药物是

A: 非甾体抗炎药

B: 钙通道阻滞剂

C: 前列腺素类似物

D: 肾上腺糖皮质激素

答案: A

23. 处方常见的外文缩写中“生理盐水”的英文缩写是

A: Aa

B: OL

C: NS

D: OU

答案: C

24. 可用于习惯性流产的药物是

A: 他莫昔芬

B: 依普黄酮

C: 司坦唑醇

D: 甲羟孕酮

答案: D

25. (2017 年真题) 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是 ()

A: 剂量递增尽可能采用最小有效剂量使不良反应减至最小

B: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判疗效

C: 当单药治疗无效时可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药

D: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗

答案：B

26. 另有草药专辑、营养品专辑、眼药专辑、非处方药和食品补充剂专辑的是

A: 《医师案头参考》

B: 《中国国家处方集（2010 年版）》

C: 《国家基本药物处方集（2012 年版）》

D: 《英国国家处方集》

答案：A

27. 患尿路感染，在无病原学结果前，一般首选（）

A: 针对革兰阳性球菌有效的抗菌药物

B: 针对革兰阴性杆菌有效的抗菌药物

C: 针对革兰阴性球菌有效的抗菌药物

D: 针对革兰阳性杆菌有效的抗菌药物

答案：B

28. 适宜进餐时给药，可以减少脂肪吸收率的药物是

A: 多潘立酮

B: 甲氧氯普胺

C: 氢氧化铝

D: 奥利司他

答案：D

29. “效用指标是患者对某种药物治疗的主观满意程度(质量调整生命年或质量调整预期寿命)，着重分析医疗成本与患者生活质量提升之间的关系”是指

- A: 成本一效益分析方法
- B: 成本一效用分析方法
- C: 最大效果分析方法
- D: 最小成本分析方法

答案：B

30. 经肾排泄的药物，在肝功能障碍时

- A: 一般无须调整剂量
- B: 需增加给药剂量
- C: 尽可能避免使用
- D: 须谨慎使用，必要时减量给药

答案：A

31. (2015 年真题) 为减少共济失调，幻觉及“宿醉现象”，老年失眠患者宜选用（）。

- A: 佐匹克隆
- B: 劳拉西泮
- C: 苯巴比妥
- D: 水合氯醛

答案：A

32. 滴虫性阴道炎宜选用

- A: 庆大霉素
- B: 甲硝唑
- C: 林可霉素

D: 制霉菌素

答案: B

33. 解救有机磷中毒过程中，入阿托品应用过量，应立即给予：

A: 麻黄碱

B: 东莨菪碱

C: 毛果芸香碱

D: 山莨菪碱

答案: C

34. 患者，男，45 岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗 1 个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是（）。

A: 可能无关

B: 肯定

C: 很可能

D: 可能

答案: B

35. （2017 年真题）患者，男，57 岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊，经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为 H1N1 甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是（）

A: 利巴韦林

B: 金刚乙胺

C: 金刚烷胺

D: 奥司他韦

答案: D

36. (2019 年真题) 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1，主诉夜间咳嗽、咽部有异物感，平躺时常有反酸、烧心、胸痛伴背痛，自用止咳糖浆无效。查体：咽红，听诊双肺未闻及干湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，血压控制在 140/85mmHg 左右，高脂血症 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

- A: 单硝酸异山梨酯缓释片
- B: 奥美拉唑肠溶胶囊
- C: 多潘立酮片
- D: 布地奈德吸入剂

答案：B

37. 治疗真菌性阴道炎可选用

- A: 复方苯甲酸酊
- B: 阿达帕林凝胶
- C: 复方角菜酸酯栓
- D: 克霉唑栓

答案：D

38. 与头孢曲松钠注射液混合可产生肉眼难以观测到的白色细微沉淀的注射液是

- A: 乳酸钠林格注射液
- B: 葡萄糖氯化钠注射液
- C: 葡萄糖注射液
- D: 氯化钠注射液

答案：A

39. 应用胆碱酯酶复活剂时做法错误的是()。

- A: 复活剂不需稀释，可以直接注射

B: 不能与碱性药物并用

C: 复活剂对解除烟碱样作用和促使患者昏迷苏醒的作用比较明显

D: 切勿两种或三种复活剂同时使用，以免毒性增加

答案：A

40. 用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发 ADR 的药品不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；可评价为

A: 可能

B: 可能无关

C: 很可能

D: 待评价

答案：A

41. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇紫绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A: 急性心肌炎

B: 急性左心衰竭

C: 支气管哮喘

D: 大叶性肺炎

答案：B

42. 亚硝酸盐中毒解救药物

A: 纳洛酮

B: 氯磷定

C: 亚甲蓝

D: 青霉胺

答案：C

43. 阿司匹林中副产物乙酰水杨酰水杨酸和乙酰水杨酸酐引起哮喘、慢性荨麻疹归属

- A: 药物制剂因素
- B: 药理作用
- C: 药动学相互作用
- D: 药物的使用

答案：A

44. 蒽环类药物的主要毒副作用是（）

- A: 肺纤维化
- B: 心脏毒性
- C: 出血性膀胱炎
- D: 溶血性尿毒症

答案：B

45. 患者，男，60岁。因面部出现慢性湿疹到药店购药，药师应推荐的药品是

- A: 特比萘芬乳膏
- B: 10%樟脑软膏
- C: 他克莫司软膏
- D: 利巴韦林软膏

答案：C

46. 患者，男，60岁，因水泡型足癣到药店购药药师应推荐的药品是（）

- A: 特比萘芬乳膏
- B: 氢化可的松软膏
- C: 10%樟脑软膏

D: 利巴韦林软膏

答案: A

47. 可用于治疗口腔溃疡，大剂量服用后，尿液可能呈黄色的药物是

A: 维生素 C

B: 维生素

C: 复合维生素 B

D: 维生素 A

答案: C

48. 抗类风湿关节炎药物中,服用 4~8 周后起效的是

A: 青霉胺

B: 柳氮磺吡啶

C: 氯喹

D: 来氟米特

答案: B

49. 接种乙肝疫苗后，血清免疫学检查可呈现阳性反应的指标是

A: 乙型肝炎病毒 e 抗原?

B: 乙型肝炎病毒 e 抗体?

C: 乙型肝炎病毒表面抗体?

D: 乙型肝炎病毒表面抗原?

答案: C

50. “嗜酸性粒细胞增多”可能提示的疾病是

A: 过敏性疾病如荨麻疹

B: 铅、钡中毒

C: 病毒感染性腹泻

D: 感染性疾病如肺结核

答案: A

51. 会使运动员情绪高涨、斗志昂扬，还能产生欣快感，能忍受竞技造成的伤痛，并提高攻击力的药物是

A: 异戊巴比妥

B: 利血平

C: 可卡因

D: 阿米替林

答案: C

52. 血尿酸升高的相关疾病是

A: 过敏性鼻炎

B: 流感

C: 痛风

D: 湿疹

答案: C

53. 下列选项中，关于老年人患病的叙述，错误的是()。

A: 自觉症状常较轻微，临床表现往往不典型

B: 机体适应能力低下，一旦发病，病情常迅速恶化

C: 常常是多系统同时发病或同一脏器、同一系统发生多种疾病

D: 患病时一般不容易出现意识障碍和精神症状

答案: D

54. 可改善睫状肌功能和增加睫状肌血流量，改善眼部调节功能的药物是

A: 聚乙烯醇滴眼液

B: 羟甲基纤维素钠滴眼液

C: 七叶洋地黄双苷滴眼液

D: 玻璃酸钠滴眼液

答案：C

55. 用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发 ADR 的药品不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；此 ADR 因果关系可评价为

A: 可能无关

B: 可能

C: 很可能

D: 待评价

答案：B

56. II 期临床试验很难发现“低于 1% 发生频率”的不良反应，缘于

A: 管理漏洞

B: 考察不全面

C: 观察时间短

D: 病例数目少

答案：D

57. 可引起驾驶员嗜睡的药物是

A: 双嘧达莫

B: 抗过敏药

C: 阿米洛利

D: 东莨菪碱

答案：B

58. 硝酸异山梨酯的别名是

- A: 安痛定
- B: 心得安
- C: 心痛定
- D: 消心痛

答案: D

59. 不属于治疗痔疮的外用非处方药的是

- A: 复方片仔癀软膏?
- B: 普济痔疮栓?
- C: 肛泰膏(栓)?
- D: 麝香痔疮栓?

答案: B

60. 长期服用可导致或加重胃溃疡的药物是

- A: 抗酸剂
- B: NSAID
- C: 米索前列醇
- D: 质子泵抑制剂

答案: B

61. 用于缓解胆石症患者疼痛症状的药物是

- A: 复方阿嗪米特
- B: 脂肪乳
- C: 匹维溴铵
- D: 头孢曲松与甲硝唑联用

答案: C

62. 患者，男，50 岁，身高 167cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查：空腹血糖 7.8mmol / L（正常值：3.9～6.1mmol / L），餐后血糖 14.8mmol / L；血尿酸 580 μmol/L（正常值：男性 180～440 μmol / L），低密度脂蛋白胆固醇 3.7mmol / L（正常值：2.1～3.1mmol / L），肌酐清除率 100ml / min。颈动脉彩超提示：动脉粥样硬化，有混合性脂质斑块。临床诊断为 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 低血糖
- B: ALT 升高
- C: 腹胀
- D: 心律失常

答案：C

63. 新生儿服用氯霉素，因其在体内蓄积导致灰婴综合征，引起药源性疾病的因素主要为

- A: 遗传因素
- B: 基础疾病因素
- C: 年龄因素
- D: 性别因素

答案：C

64. 瘦肉精（克仑特罗）中毒时，可采用的解毒药是

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 普萘洛尔
- C: 氟马西尼
- D: 乙酰胺

答案：B

65. 常用抗消化性溃疡药的合理应用应于早餐前 30 分钟服用的是 ()

- A: 瑞巴派特
- B: 吉法酯
- C: 替普瑞酮
- D: 质子泵抑制剂

答案: D

66. 血栓性疾病女性患者的凝血酶原时间可能短于

- A: 18 秒
- B: 16 秒
- C: 11 秒
- D: 10 秒

答案: C

67. 有关免疫抑制剂与药物、食物同服的影响，说法错误的有

- A: 与抑酸剂合用，吗替麦考酚酯血药浓度降低
- B: 与氟康唑同服，他克莫司血药浓度升高
- C: 与葡萄柚汁同服，西罗莫司血药浓度降低
- D: 与葡萄柚汁同服，环孢素血药浓度升高

答案: C

68. 下列药物中，不属于三环类抗抑郁药的是 ()

- A: 阿米替林
- B: 氯米帕明
- C: 氟伏沙明
- D: 丙米嗪

答案: C

69. 需要在服药时多饮水的药物不包括

- A: 平喘药
- B: 氨基糖苷类抗菌药
- C: 降糖药
- D: 抗痛风药

答案：C

70. 已肯定的致畸药物禁止使用，即

- A: 用药必须有明确的指征和适应证
- B: 可用可不用的药物应尽量不用或少用
- C: 禁止用试验性药
- D: 选用对胎儿危害较小的药物

答案：D

71. 检查注射剂的澄明度与口服溶液剂的色泽和澄清度属于

- A: 嗅觉试验
- B: 听觉试验
- C: 视觉试验
- D: 触觉试验

答案：C

72. 美托洛尔和肾上腺素的相互作用属于()。

- A: 酶诱导作用
- B: 作用于同一受体的拮抗作用
- C: 排泄
- D: 与血浆蛋白结合

答案：B

73. 适合睡前服用的是

- A: 吲哚美辛
- B: 多潘立酮
- C: 氟伐他汀
- D: 奥利司他

答案：C

74. 患者，男，40 岁，体重 70kg，因咳痰伴发热入院，诊断为肺炎，欲给予左氧氟沙星片实施治疗。该药说明书提示：肌酐清除率低于 50ml / min 时需要调整给药方案。该患者入院时行肾功能检查：血肌酐 (Cr) 130 μ mol / L。医师给出的治疗方案是

- A: 经验剂量的 3 / 4
- B: 不需要调整给药方案
- C: 延长给药间隔时间
- D: 经验剂量的 1 / 2

答案：B

75. 下列“给药时间是依据生物钟规律而设定”的事例中，最正确的是

- A: 餐前服用格列本脲
- B: 餐前服用阿莫西林
- C: 清晨服用帕罗西汀
- D: 清晨服用硫酸镁

答案：C

76. 宜于清晨服用的药品是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 阿卡波糖
- C: 糖皮质激素

D: 洛伐他汀

答案: C

77. 药物不良反应胶体果胶铋 ()

A: 溢乳现象

B: 睡眠障碍

C: 性功能障碍

D: 黑便

答案: D

78. (2015 年真题) 老年人使用可导致甲状腺功能异常，肺毒性或 Q-T 间期延长，不宜作为心房颤动一线用药的是 ()。

A: 地高辛

B: 胺碘酮

C: 福辛普利

D: 美托洛尔

答案: B

79. 可了解工作效果、并为之后工作的进一步完善的是

A: 随访了解效果，并建立档案

B: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

C: 形成答案并以口头形式提供给询问者

D: 对问题进行确定并归类

答案: A

80. 以下治疗荨麻疹的抗过敏药中，属于过敏活性物质阻释剂的药物是

A: 异丙嗪

B: 苯海拉明

C: 赛庚啉

D: 酮替芬

答案: D

81. (处方缩写) 餐后的缩写为

A: q4h

B: pc

C: iv

D: qid

答案: B

82. 治疗需用 10%葡萄糖注射液 1000ml, 现仅有 50%和 5%浓度的葡萄糖注射液, 分别取 50%和 5%浓度的葡萄糖注射液多少毫升进行配制

A: 200ml, 800ml

B: 111ml, 889ml

C: 500ml, 500ml

D: 889ml, 111ml

答案: B

83. 儿童 2 型糖尿病患者宜选用的药物是

A: 胰岛素

B: 格列喹酮

C: 格列苯脲

D: 二甲双胍

答案: D

84. 春季卡他性结膜炎严重者可选用

- A: 硫酸锌滴眼液
- B: 碘苷滴眼液
- C: 1%泼尼松龙滴眼液
- D: 杆菌肽眼膏

答案：C

85. 属于蛋白酶抑制剂的是（）

- A: 齐多夫定
- B: 依非韦伦
- C: 利巴韦林
- D: 利托那韦

答案：D

86. 服用时不宜嚼碎的是

- A: 胃黏膜保护剂
- B: 抗酸药
- C: 解痉、镇痛药
- D: 质子泵抑制剂

答案：D

87. 适宜睡前服用，用于抑制“酸突破现象”的抑酸剂是

- A: 法莫替丁
- B: 硫糖铝
- C: 乳酸菌素
- D: 铝碳酸镁

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/516032133054011030>