

全科医学住院医师：神经内科题库知识点（强化练习）

1、单选 一帕金森病患者，服用“美多巴”1年余，近1周开始出现阵发性行动迟缓、肢体震颤加重，多于中午、晚上服药前出现。该病病理改变不包括（）。

- A. 肝细胞脂肪变性
- B. (江南博哥). 神经元胞浆内出现路易小体
- C. 角膜后缘弹力层铜颗粒沉积
- D. 壳核神经元显著减少、脱失
- E. 胶质细胞增生

正确答案：B

2、问答题 试述肌力的0~5级分级法。

正确答案：0级：完全瘫痪。

1级：肌肉可收缩，但不能产生动作。

2级：肢体能在床面上移动，但不能抵抗自身重力，即不能抬起。

3级：肢体能抵抗重力离开床面，但不能抵抗阻力。

4级：肢体能作抗阻力的动作，但不完全。

5级：正常肌力。

3、名词解释 特发性面神经麻痹

正确答案：特发性面神经麻痹：指茎乳孔内面神经的非化脓性炎症所引起的周围性面瘫。

4、单选 额叶中央前回是（）。

- A. 嗅觉中枢
- B. 视觉中枢
- C. 听觉中枢
- D. 皮质运动中枢
- E. 皮质感觉中枢

正确答案：D

5、单选 周期性瘫痪表现为（）。

- A. 四肢无力，血钾减低
- B. 四肢无力，脑脊液白细胞分离
- C. 四肢无力，手套、袜套样感觉障碍
- D. 四肢无力，休息后减轻，活动后加重
- E. 四肢无力，肩胛带、骨盆带萎缩

正确答案：A

6、多选 原发性三叉神经痛的临床表现是（）。

- A. 多发生于中老年人，女略多于男
- B. 疼痛限于三叉神经分布区的一支或两支，以第二、第三支最多见，三支同时受累者极为罕见

- C. 通常无预兆，开始和停止都很突然，间歇期可完全正常
- D. 病程可呈周期性，每次发作期可为数日、数周或数月不等
- E. 神经系统检查一般无阳性体征

正确答案：A, B, C, D, E

7、填空题 三叉神经痛严重者伴有面部肌肉的反射性抽搐，口角牵向患侧，称为（）。

正确答案：痛性抽搐

8、单选 阿尔茨海默病的早期症状主要为（）。

- A. 性格改变
- B. 记忆减退
- C. 情绪急躁易怒
- D. 幻觉
- E. 妄想

正确答案：B

参考解析：近记忆障碍为首发及最明显的症状。

9、单选 重症肌无力属于（）。

- A. 中枢神经系统脱髓鞘疾病
- B. 周围神经系统脱髓鞘疾病
- C. 神经-肌肉传递障碍性疾病
- D. 血清钾低
- E. 黑质致密区含黑色素的神经元缺失

正确答案：C

10、多选 原发性癫痫的特点是（）。

- A. 病年龄较小
- B. 脑内未发现器质性病变
- C. 以全面性发作为主
- D. 以部分性发作为主
- E. 因大脑半球病变引起的癫痫发作

正确答案：A, B, C, D

11、单选 关于谵妄病人的说法，正确的是（）。

- A. 会发生冲动行为但不会有自伤
- B. 常有恐怖性的视幻觉
- C. 主要是意识范围障碍
- D. 不会产生被害妄想
- E. 突然变得安静，说明病情可能加剧

正确答案：B

参考解析：患者常因此产生紧张、恐惧的情绪反应。

12、问答题 简述 PD 的典型表现及治疗原则。

正确答案：PD 的临床表现及治疗原则：

(1) 临床表现：

- ①静止性震颤：安静时明显，随意运动时减轻，紧张时加剧，入睡后消失。
- ②肌强直：表现为铅管样强直，伴震颤时为齿轮样强直。
- ③运动迟缓：随意动作减少，“面具脸”，“写字过小征”。
- ④姿势步态异常：启动困难，步伐变小变慢，晚期慌张步态。
- ⑤植物神经症状：多汗、顽固性便秘、直立性低血压等。

(2) 治疗原则

- ①药物治疗. A. 抗胆碱能药物：安坦、金刚烷胺、左旋多巴及复方左旋多巴。
B. DA 受体激动剂：单胺氧化酶 B 抑制剂。
- ②外科手术：立体定向破坏。
- ③细胞移植：基因治疗。
- ④康复治疗。

13、填空题 CSF 的葡萄糖含量取决于血糖的水平，正常含量约为 () ~ () mmol / L。

正确答案：2. 5； 4. 4

14、填空题 重症肌无力的治疗药物中。常用的抗胆碱酯酶药物有 () 。

正确答案：溴吡斯的明

15、填空题 皮质延髓束受损出现 () 反射亢进等脑干病理征。后期伴有强哭、强笑呈现典型的真、假球麻痹并存表现。

正确答案：下颌

16、填空题 周围性面神经瘫痪病变在 () 肌神经近端，可出现舌前 2 / 3 味觉障碍及听觉过敏。

正确答案：镫骨

17、单选 男，30 岁，约一年时间孤僻、寡言，近期由于被上级批评后出现失眠，不上班并紧闭门窗，声称有人监视自己，在家中不敢谈话，说家中已被安装窃听器，公安局也要逮捕自己，不吃妻子做的饭食，认为妻子已同他人合伙在饭菜中放了毒药，因此殴打妻子。 药物治疗应首选 () 。

- A. 丙咪嗪
- B. 利培酮
- C. 氯硝西泮
- D. 碳酸锂
- E. 氯丙咪嗪

正确答案：B

18、问答题 简述蛛网膜下腔出血的临床表现。

正确答案：

蛛网膜下腔出血在各年龄组均可发病，起病时最常见的症状是突然剧烈的头痛，恶心、呕吐，可有局限性或全身性抽搐，通常无意识障碍，或仅有短暂意识障碍。体征最主要的是脑膜刺激征。一般无偏瘫等神经系统定位征，而在后交通动脉及颈内动脉瘤常引起同侧动眼神经麻痹。

19、问答题 帕金森病有哪些临床表现？

正确答案：①震颤：本病典型震颤为静止性震颤，而在做随意动作或睡眠时消失；

②强直：强直多从一侧上肢的近端开始，逐渐蔓延到远端，对侧，以及全身。面肌强直使表情动作减少，造成所谓“面具脸”。肌张力呈齿轮样增高；

③运动减少：患者随意动作减少，动作缓慢，尤以始动时为甚，精细动作差，书写困难，且越写越小，称为“写字过小症”。

20、单选 婴儿痉挛症首选（）。

A. 丙戊酸钠

B. 卡马西平

C. 乙琥胺

D. 苯妥英钠

E. ACTH

正确答案：E

21、单选 患者，男性，58岁，进行性人格改变和智能减退2年。患者于2年前开始缓慢出现人格改变，性格变得内向、孤僻和吝啬，并出现记忆力减退，对刚发生的事情不能记忆。近来出现幻听和幻视。查体发现精神抑郁，注意力涣散，记忆力、定向力和计算力均减退，行动迟缓。其他未见神经系统定位体征。头颅MRI发现脑萎缩，脑室系统扩大。本病例的脑组织病理检查可能出现的改变是（）。

A. 中脑黑质神经元缺失

B. 神经元胞浆内出现Lewy小体

C. 神经元胞浆内出现神经元纤维缠结

D. 广泛神经元空泡样变性

E. 神经胶质细胞增生不显著

正确答案：C

22、单选 腓神经麻痹出现（）。

A. 跨阈步态

B. 醉汉步态

C. 慌张步态

D. 剪刀样步态

E. 划圈样步态

正确答案：A

23、单选 幻觉的定义是（）。

- A. 对客观事物的错误感受
- B. 对客观事物的歪曲
- C. 缺乏相应的客观刺激时的感知体验

D. 客观刺激作用于感觉器官的感知体验

E. 缺乏客观刺激时的思维过程

正确答案：C

参考解析：幻觉是一种虚幻的感知，是在客观现实中并不存在某种事物的情况下，病人却感知有所存在。

24、单选 通常三环类抗抑郁药物的每天治疗剂量为（）。

A. 50mg

B. 50～75mg

C. 75～100mg

D. 150～300mg

E. 300～400mg

正确答案：D

参考解析：应注意逐渐增加剂量。

25、问答题 试述多发性神经病的概念及常见病因。

正确答案：多发性神经病（Polynetiropathy）是四肢对称性感觉障碍、下运动神经元瘫痪和 / 或自主神经功能障碍的临床综合征。根据原发受损部位可分为：神经轴索变性、节段性脱髓鞘和神经元病变。本病可由多种原因引起，多为全身性疾病所致。

（1）远端轴索病：多数多发性神经病属于此型，病因可为：药物、化学品、有机磷、重金属和白喉毒素中毒，慢性酒精中毒，代谢障碍性疾病引起的营养缺乏等。

（2）髓鞘病：包括吉兰-巴雷综合征，慢性炎症性脱髓鞘性神经病，白喉、某些副肿瘤及副蛋白血症及各种遗传病如异染性脑白质营养不良、Krabbe 病和 ChatcotMarie-Tooth 遗传性运动感觉神经病 1 型和 2 型（CMT1、CMT3）等。

（3）神经元病：主要损害脊髓前角细胞或后根神经节细胞，如遗传性运动感觉神经病 2 型、维生素 B 诱发神经病及某些副肿瘤综合征等。

26、单选 下列出现意识障碍的疾病是（）。

A. 精神分裂症

B. 脑器质性精神病

C. 焦虑症

D. 癔症

E. 抑郁症

正确答案：B

参考解析：脑器质性精神病是一组由脑部疾病所致的精神障碍。精神症状可表现为意识障碍、智能障碍、人格改变，精神病性症状、情感障碍、神经症样表现和行为障碍。

27、单选 一帕金森病患者，服用“美多巴”1 年余，近 1 周开始出现阵发性行动迟缓、肢体震颤加重，多于中午、晚上服药前出现。 该病首选治疗是（）。

- A. DA 受体激动剂
- B. 复方左旋多巴
- C. 单胺氧化酶 B 抑制剂
- D. 铜螯合剂
- E. DBS

正确答案：D

28、问答题 试述脑血栓形成的基本概念和主要病因。

正确答案：颅内外供应脑部的动脉血管壁发生病理改变，使血管腔变狭窄，最终完全闭塞，引起某一血管供血范围内的脑梗死性坏死，称为脑血栓形成。脑血栓形成最常见的病因为脑动脉粥样硬化，高血压、高血脂症、糖尿病等往往加速动脉硬化的发展。其次的病因为脑动脉炎。较少见的病因有胶原系统疾病、巨细胞动脉炎、先天性血管畸形、颅内肿瘤、真性红细胞增多症、血高凝状态等。

29、填空题 额桥束损害可产生对侧肢体（）。

正确答案：共济失调

30、单选 吉兰-巴雷综合征属于（）。

- A. 中枢神经系统脱髓鞘疾病
- B. 周围神经系统脱髓鞘疾病
- C. 神经-肌肉传递障碍性疾病
- D. 血清钾低
- E. 黑质致密区含黑色素的神经元缺失

正确答案：B

31、单选 患者如有感觉性共济失调是因为（）。

- A. 视觉障碍
- B. 前庭耳蜗刺激
- C. 浅感觉障碍
- D. 听觉障碍
- E. 深感觉发生障碍

正确答案：E

32、问答题 简述 AD 的诊断要点。

正确答案：AD 的诊断要点：

- (1) 多于 65 岁以后隐匿起病。
- (2) 症状：记忆障碍、认知障碍、精神障碍。
- (3) 体征：无感觉障碍和锥体束征。
- (4) 辅助检查：CSF 多正常，EEG 可有广泛慢波，CT 和 MRI 检查可见侧脑室扩大和脑沟增宽，尤其是额颞叶，MRI 冠状切面可显示海马萎缩。

33、单选 男性，18岁学生，不出门怕见人，不去上课，纠缠父母出钱给自己做美容手术半年。原因是半年来反复照镜子发现自己的鼻子比以前变大了，难看了。说班上的同学都讥笑他，出门就感觉别人在说他，别人的眼光看他时很特别，能使他头痛。父母不愿出钱就说父母不关心他，父母不是亲生的，曾说要去做亲子鉴定。该患者的精神症状中不存在（）。

- A. 关系妄想
- B. 物理影响妄想
- C. 非血统妄想
- D. 被控制妄想
- E. 幻想性错觉

正确答案：D

34、问答题 试述急性脊髓炎急性期的治疗措施。

正确答案：（1）药物治疗：糖皮质激素，如皮质醇 100～300mg 或地塞米松 5～10mg 静脉滴注，每天 1 次，连续 7～10 天，以后改服泼尼松。已有并发感染或为预防感染，可适当选用抗生素，并加用维生素 B1、维生素 B12 维生素 C 等。使用免疫球蛋白。

（2）护理：主要包括：①褥疮的防治；②排尿障碍及泌尿道感染的护理。可选用针灸治疗尿潴留。持续导尿者，需加闭式冲洗引流装置，并以 1：5000 呋喃西林冲洗膀胱。

（3）康复治疗。

35、填空题 GBS 患者脑神经受损以（）神经麻痹为最多见，后组脑神经以 IX、X 神经麻痹也相当常见。

正确答案：面

36、单选 病灶对侧下肢中枢性瘫是由于（）。

- A. 椎-基底动脉系统 TIA
- B. 颈内动脉血栓形成
- C. 大脑前动脉血栓形成
- D. 大脑中动脉血栓形成
- E. 大脑后动脉血栓形成

正确答案：C

37、填空题 Wallenberg syndrome 的主要临床表现为：眩晕、恶心、呕吐、眼球震颤；构音障碍；（）性感觉障碍等。

正确答案：交叉

38、填空题 脊髓亚急性联合变性周围血象显示为（）性贫血。

正确答案：巨细胞低色素

39、填空题 浅感觉检查包括（）、（）、（）等。

正确答案：痛觉；触觉；温度觉

40、填空题 继发性三叉神经痛的疼痛性质多为隐痛、钝痛或胀痛，疼痛持续

时间（），无明显间歇期或间歇期疼痛症状并不完全消失，范围多超越三叉神经分布区。

正确答案：较长

41、问答题 试述短暂性脑缺血发作（TIA）的临床特征。

正确答案：TIA 的临床表现根据缺血的部位和范围不同而多种多样，但其共同的临床特征如下：

①发作突然；

②持续时间短暂，通常在数分钟至数小时，症状和体征应在 24 小时内完全消失；

③恢复完全。一般不遗留神经功能缺损；

④常反复发作，每次发作均涉及相同的某动脉供应的脑功能区。

42、单选 思维贫乏（）。

A. 是急性精神分裂症的常见症状

B. 是慢性精神分裂症的常见症状

C. 是抑郁症的常见症状

D. 是躁狂症的常见症状

E. 是焦虑症的常见症状

正确答案：B

43、填空题 MG 患者中，胸腺几乎都有异常，10%~15%MG 患者合并（）瘤。

正确答案：胸腺

44、问答题 试述急性（横贯性）脊髓炎的临床表现。

正确答案：（1）病前常有上呼吸道感染症状，或有疫苗接种史。

（2）急性起病，常在数小时至 2~3 天发展至完全性截瘫，病变水平以下运动、感觉和自主神经功能障碍：

①运动障碍：早期常见脊髓休克，即损害平面以下肢体瘫痪，肌张力降低，腱反射消失，无病理征。恢复期肌张力逐渐增高，腱反射亢进，并出现病理征。

②感觉障碍：损害平面以下所有感觉缺失，在感觉消失水平上缘可有感觉过敏区或束带样感觉异常，随病情恢复感觉平面逐步下降，但较运动功能恢复慢。

③自主神经功能障碍：早期尿便潴留。无膀胱充盈感，呈无张力性神经源性膀胱。随着脊髓功能恢复，膀胱容量缩小，尿液充盈到 300~400mL 时自主排尿，称反射性神经源性膀胱。损害平面以下无汗或少汗、皮肤脱屑和水肿，指甲松脆和过度角化等。

（3）腰穿：脑脊液压力不高，奎氏试验通畅。白细胞数正常或增高，以淋巴细胞为主。

（4）MRI 检查：示病变部位脊髓增粗，病变部位节段内多发片状或斑点状长 T1、长 T2 信号，不均匀，可融合。

45、单选 病人体验到脑内概念不断涌现，一个意念接着一个意念，该症状为（）。

A. 强迫性思维

B. 思维奔逸

- C. 联想散漫
- D. 强制性思维
- E. 思维插入

正确答案：B

参考解析：自己的思想，反复出现，内容重复，明知没必要，但无法摆脱。

46、填空题 Webersyndrome 临床表现为病侧（）麻痹和对侧中枢性偏瘫。

正确答案：动眼神经

47、问答题 试述急性脊髓炎的临床表现。

正确答案：（1）病前常有上呼吸道感染症状，或有疫苗接种史。

（2）急性起病，较早出现脊髓休克，即损害平面以下肢体瘫痪，肌张力降低，腱反射消失，病理反射不能引出。

（3）损害平面以下传导束型感觉障碍和大小便障碍。

（4）腰椎穿刺检查，脑脊液压力不高，白细胞数正常或稍增高，以淋巴细胞为主。一般无椎管梗阻现象，一即奎氏试验通畅。

48、单选 不常发作也不很强烈的偏头痛应用（）。

- A. 非甾体药物（吲哚美辛）
- B. 发作早期给麦角胺咖啡因
- C. 5-羟色胺受体激动剂
- D. 普萘洛尔、苯噻啶等药物
- E. 皮质类固醇

正确答案：A

49、单选 颞叶内侧面钩回是（）。

- A. 嗅觉中枢
- B. 视觉中枢
- C. 听觉中枢
- D. 皮质运动中枢
- E. 皮质感觉中枢

正确答案：A

50、单选 下颌偏斜（）。

- A. 动眼神经损害
- B. 外展神经损害
- C. 三叉神经损害
- D. 面神经损害
- E. 舌下神经损害

正确答案：C

51、单选 女性，30岁，4小时前跌伤后昏迷5分钟，清醒后步行回家。1小时前因剧烈头痛，呕吐3次来诊。查体：昏迷，P64次/分，BP180/90mmHg，R18次/分，左瞳3mm，右瞳2mm，右侧下肢肌力III级。 诊断应考虑（）。

- A. 脑震荡
- B. 脑挫伤
- C. 急性硬膜外血肿
- D. 急性硬膜下血肿
- E. 急性脑内血肿

正确答案：C

52、单选 45 岁男性，经理，送来急诊，自述半小时前突然感到气紧、胸闷、心悸、头晕、出汗，认为生命垂危，要求紧急处理。近 1 个月来这种情况发生过 3 次，每次持续 0.5~1 小时，发病间隙期一切正常，发病与饮食无明显关系。最大可能的诊断是（）。

- A. 癔症发作
- B. 低钾血症
- C. 惊恐发作
- D. 心肌梗死
- E. 内脏性癫痫

正确答案：C

53、填空题 AIDS 中枢神经系统机会性感染（）、（），病毒感染和细菌感染。

正确答案：脑弓形虫病；新型隐球菌性脑膜炎

54、单选 进行性肌营养不良表现为（）。

- A. 四肢无力，血钾减低
- B. 四肢无力，脑脊液蛋白细胞分离
- C. 四肢无力，手套、袜套样感觉障碍
- D. 四肢无力，休息后减轻，活动后加重
- E. 四肢无力，肩胛带、骨盆带萎缩

正确答案：E

55、单选 属于情感活动减退的症状是（）。

- A. 焦虑
- B. 情感淡漠
- C. 情感倒错
- D. 情感低落
- E. 情感脆弱

正确答案：B

参考解析：情感淡漠为情感活动减退表现。患者对外界任何刺激均缺乏相应情感反应。

56、多选 根性感觉障碍表现（）。

- A. 受损范围呈带状
- B. 出现感觉分离

- C. 投射性疼痛
- D. 症状在病变对侧
- E. 受损范围呈节段性

正确答案： A, C

57、多选 脑血栓形成在急性期的治疗方法可选用（ ）。

- A. 早期溶栓治疗
- B. 静滴 PAMBA
- C. 静滴低分子右旋糖酐
- D. 静滴甘露醇
- E. 口服去痛片

正确答案： A, C, D

58、单选 患者对从未见到过的人感到很熟悉属（ ）。

- A. 血液质
- B. 黏液质
- C. 脑脊液质
- D. 黄胆汁质
- E. 黑胆汁质

正确答案： E

59、问答题 列表说明上运动神经元瘫痪和下运动神经元瘫痪的鉴别诊断要点。

上运动神经元和下运动神经元瘫痪鉴别诊断要点		
	上运动神经元瘫痪 (中枢性瘫痪)	下运动神经元瘫痪 (周围性瘫痪)
瘫痪分布	以整个肢体为主(单瘫、偏瘫、截瘫)	以肌群为主
肌张力	增高	减低
腱反射	增强	减低或消失
病理反射	阳性	阴性
肌萎缩	无或轻度废用性萎缩	明显
肌电图检查	神经传导速度正常, 无失神经电位	神经传导速度异常, 有失神经电位

正确答案：

60、填空题 GBS 运动感觉神经症状多在前驱症状出现后 3 天至 3 周出现, 运动神经麻痹多起病急、进展快, 呈（ ）性肢体无力麻痹和迟缓性麻痹。

正确答案： 对称

61、单选 多发性硬化属于（ ）。

- A. 中枢神经系统脱髓鞘疾病
- B. 周围神经系统脱髓鞘疾病
- C. 神经-肌肉传递障碍性疾病
- D. 血清钾低
- E. 黑质致密区含黑色素的神经元缺失

正确答案：A

62、问答题 试述脑出血的病因和发病机制。

正确答案：病因：主要是高血压和动脉硬化（85%左右）。其他少见的病因有：脑血管畸形、脑动脉瘤、血液病、脑动脉炎、抗凝治疗、淀粉样血管病、肿瘤侵袭血管壁破裂出血等。发病机制：持续高血压和脑内小动脉硬化使出血部位的血管发生玻璃样变而形成微小动脉瘤；加之脑内动脉外膜不发达，无外弹力层，中层肌细胞少，管壁较薄，大脑中动脉与其所发出的深穿支一豆纹动脉呈直角。因此当劳累用力或情绪改变等因素使血压骤然升高时，易致动脉破裂出血。

63、填空题 慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病是慢性进行性发展的，并且是（ ）依赖性的脱髓鞘感觉运动神经病。

正确答案：激素

64、问答题 简述 AIDP 的临床表现。

正确答案：AIDP 的临床表现：

（1）急性或亚急性起病，多数患者病前 1~4 周有胃肠道或呼吸道感染症状，或有疫苗接种史。

（2）运动感觉神经症状多在前驱症状出现后 3 天至 3 周出现，运动神经麻痹多起病急、进展快，呈对称性肢体无力麻痹和迟缓性瘫痪。

（3）脑神经症状：面神经麻痹最为多见，多为双侧，后组 IX、X 脑神经麻痹也常见。

（4）感觉障碍多与运动症状同时出现，大多数病例病初即有肢体麻木、疼痛等主诉，查体远端型、手套袜套样感觉减退或感觉消失。

（5）腱反射减低或消失是本病的重要特征。

（6）植物神经功能紊乱：血压波动、窦速、尿潴留、便秘、末梢循环紊乱。

65、单选 男性，18 岁学生，不出门怕见人，不去上课，纠缠父母出钱给自己做美容手术半年。原因是半年来反复照镜子发现自己的鼻子比以前变大了，难看了。说班上的同学都讥笑他，出门就感觉别人在说他，别人的眼光看他时很特别，能使他头痛。父母不愿出钱就说父母不关心他，父母不是亲生的，曾说要去亲子鉴定。如给予药物治疗，下列不属抗精神病药的是（ ）。

A. 氟哌啶醇

B. 氟奋乃静

C. 氟西汀

D. 氯氮平

E. 三氟拉嗪

正确答案：C

66、单选 一帕金森病患者，服用“美多巴”1 年余，近 1 周开始出现阵发性行动迟缓、肢体震颤加重，多于中午、晚上服药前出现。关于该病描述不正确的是（ ）。

- A. CT 可见大脑皮质萎缩
- B. 铜蓝蛋白降低
- C. 角膜可见 K—F 环
- D. 血清铜水平降低
- E. 24 小时尿铜降低

正确答案：E

67、问答题 试述昏迷的常见原因及其鉴别诊断。

正确答案：(1) 脑膜刺激征阳性，无局灶性脑定位体征时：

- ①突然起病，以剧烈头痛为前驱症状者，常为蛛网膜下腔出血。
- ②以发热为前驱症状者，常为各型脑膜炎。

(2) 脑膜刺激征阴性，无局灶性脑定位体征时：

- ①尿有异常者，要考虑尿毒症、糖尿病、急性尿卟啉症。
- ②处于休克状态者，多为低血糖、心肌梗死、肺梗死、大出血。
- ③有明确中毒原因者。多为乙醇、安眠药、一氧化碳、有机磷等中毒。
- ④有黄疸者，多为肝性脑病。⑤有发绀者，多为肺性脑病。
- ⑥有高热者，多为重症感染、中暑、甲亢危象。
- ⑦有体温过低者，多为休克、粘液水肿、冻伤。
- ⑧有气味者，多为糖尿病、肝性脑病、乙醇中毒、尿毒症。
- ⑨昏迷短暂者，多为癫痫、晕厥、脑震荡。

(3) 有局灶性脑定位体征，脑膜刺激征阳性或阴性时：

- ①突然起病者，多为脑出血、脑血栓形成、脑栓塞。
- ②以发热为前驱症状者，多为脑炎、脑脓肿、脑脊髓炎、脑血栓性静脉炎。
- ③与外伤有关者。多为颅脑外伤、硬膜外血肿、硬膜下血肿。
- ④缓慢起病者，多为颅内肿瘤、慢性硬膜下血肿。

68、填空题 昏迷病人伴有局灶性脑症状时，突然起病的常见原因为（）、（）。缓慢起病的常见原因为（）、（）。

正确答案：脑出血；脑栓塞；慢性硬膜下血肿；脑瘤

69、填空题 MS 治疗药物有（）、 α -干扰素、免疫球蛋白和免疫抑制剂。

正确答案：皮质醇激素

70、单选 关于急性脑血管病的病因，下列何者是不正确的（）。

- A. 脑出血最常见的病因是高血压和动脉硬化
- B. 脑栓塞最常见的病因是风心病合并房颤或其他的心源性栓子脱落
- C. 脑血栓形成最常见病因是动脉炎
- D. 蛛网膜下腔出血最常见病因是先天性颅内动脉瘤
- E. 短暂性脑缺血发作最常见病因是动脉粥样硬化

正确答案：C

参考解析：

这道题是记忆题，考核学生对急性脑血管病的病因的了解与掌握。常见的错误：C 以外的其他任何选项，错选 E 者多见。错误辨析：基础知识掌握不准确。本题考查的是急性脑血管病的最常见病因。脑出血最常见的病因是高血压和动脉硬化；脑栓塞最常见的病因是心源性的栓子脱落；脑血栓形成和短暂脑性缺血发作最常见的病因是动脉粥样硬化，动脉炎也是脑血栓的病因，但不是最常见病因；先天性颅内动脉瘤是蛛网膜下腔出血的最常见病因。要点：正确理解和掌握急性脑血管病的病因。

71、多选 腰穿的禁忌证为（）。

- A. 小脑肿瘤
- B. 病毒性脑膜炎
- C. 腰椎外伤畸形并颅内感染
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 腰部局部皮肤发炎

正确答案：A, C, E

72、单选 顶叶中央后回是（）。

- A. 嗅觉中枢
- B. 视觉中枢
- C. 听觉中枢
- D. 皮质运动中枢
- E. 皮质感觉中枢

正确答案：E

73、问答题 试述脑出血的手术适应证。

正确答案：（1）脑出血病人颅内压增高伴脑干受压的体征，如心率变慢、血压升高、呼吸变慢、意识障碍加深等。

（2）小脑半球血肿量 $>10\text{ml}$ 。或蚓部 $>6\text{mL}$ ，血肿破入第四脑室或脑池受压消失，出现脑干受压症状或出现梗阻性脑积水征象者。

（3）重症脑室出血导致梗阻性脑积水。

（4）脑叶出血，特别是 AVM 所致和占位效应明显者。

74、填空题 急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病多为双侧性周围性面瘫，并伴有四肢对称性迟缓性瘫痪和脑脊液（）分离现象。

正确答案：蛋白

75、单选 当某一感官处于功能状态时，另一感官出现幻觉，此现象是（）。

- A. 功能性幻觉
- B. 内脏性幻觉
- C. 假性幻觉
- D. 反射性幻觉
- E. 原始性幻觉

正确答案：D

参考解析：反射性幻觉是指当某一感官处于功能活动状态时，出现涉及另一感官的幻觉。

76、问答题 列表鉴别周围性眩晕和中枢性眩晕的区别要点。

正确答案：

周围性眩晕和中枢性眩晕的鉴别		
临床特征	周围性眩晕	中枢性眩晕
眩晕	旋转性或上下左右摇晃感 特点：突发，持续时间短（数十分钟、数小时、数天），剧烈，与头位或体位改变有关，闭目不减轻	旋转性或向一侧运动感 特点：较轻，持续时间长（数周、数月、数年），与头位或体位改变无关，闭目后可减轻
眼球震颤	水平性或旋转性，向健侧注视时加重；与眩晕同时存在，幅度与眩晕程度一致	与眩晕程度不一致，眼震粗大，持续存在
平衡障碍	站立不稳或左右摇晃	站立不稳或向一侧倾斜
自主神经症状	恶心、呕吐、出汗、面色苍白	症状较轻
耳鸣、听力减退	明显	无
脑部损害症状	无	有
病变部位	前庭感受器及内听道内前庭神经 颅外段的病变 膜迷路积水、迷路炎、中耳炎、前庭神经元炎	前庭神经颅内段、前庭神经核、核上纤维、内侧纵束及皮质和小脑的前庭代表区的病变 VBI、小脑、脑干及第四脑室肿瘤，听神经瘤，颅内高压症、癫痫

77、填空题 SAH 患者需要绝对卧床（ ）周，避免一切可引起血压及颅压增高的诱因。

正确答案：4~6

78、单选 关于妄想，下列说法正确的是（ ）。

- A. 在意识障碍时出现的杂乱思维
- B. 在智力缺损时出现的离奇想法
- C. 在意识清晰的情况下的病理性歪曲信念
- D. 是可被说服的不现实想法
- E. 在意识中占主导地位的错误观念

正确答案：C

参考解析：妄想是一种在病理基础上产生的信念，病态的推理和判断，不符合客观现实和所受的教育水平。

79、填空题 视神经检查主要检查（ ）、（ ）、（ ）。

正确答案：视力；视野；眼底

80、问答题 简述上、下运动神经元瘫痪的区分。

正确答案：上运动神经元瘫痪又称痉挛性瘫痪，肌张力高，腱反射亢进，出现病理反射，肌肉无萎缩，肌电图正常。定位于皮质、内囊、脑干、脊髓。下运动神经元瘫痪又称弛缓性瘫痪，肌张力低，腱反射减弱，无病理反射，较早肌肉萎缩，肌电图异常。定位于周围神经、神经丛、前根、脊髓前角细胞。

81、单选 治疗小舞蹈病用（）。

- A. 美多巴
- B. 新斯的明
- C. 苯妥英钠
- D. 青霉胺
- E. 氟哌啶醇

正确答案：E

82、单选 复杂部分性发作首选（）。

- A. 丙戊酸钠
- B. 卡马西平
- C. 乙琥胺
- D. 苯妥英钠
- E. ACTH

正确答案：B

83、单选 眼球内斜视（）。

- A. 动眼神经损害
- B. 外展神经损害
- C. 三叉神经损害
- D. 面神经损害
- E. 舌下神经损害

正确答案：B

84、单选 45岁男性，经理，送来急诊，自述半小时前突然感到气紧、胸闷、心悸、头晕、出汗，认为生命垂危，要求紧急处理。近1个月来这种情况发生过3次，每次持续0.5~1小时，发病间隙期一切正常，发病与饮食无明显关系。最适宜的急诊处理是（）。

- A. 输入葡萄糖
- B. 输入氧气
- C. 暗示治疗
- D. 抗癫痫药
- E. 安定注射

正确答案：E

85、单选 苍白球黑质（）。

- A. 静止性震颤
- B. 舞蹈病

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/516132101240010132>