

N2 级护理人员理论考核测试题与参考答案

一、单选题（共 104 题，每题 1 分，共 104 分）

1. 许某, 女, 62 岁。反复咳嗽, 咳痰 30 年, 加重 2 天, 夜间因烦躁不安服用地西洋(安定)5mg 入睡, 晨起呼吸浅促。导致上述表现的最可能原因是()

- A、地西洋的镇静作用
- B、地西洋的镇咳作用
- C、地西洋抑制呼吸中枢
- D、地西洋过量
- E、地西洋过敏反应

正确答案: C

2. 发生致热原反应强烈者可静脉注射地塞米松(), 给予吸氧

- A、1mg
- B、5mg
- C、4mg
- D、3mg

正确答案: B

3. 适于采用包扎疗法的烧伤创面是

- A、面颈部浅度烧伤
- B、四肢高压电接触伤
- C、II 度烧伤
- D、四肢浅 II 度及深 II 度烧伤
- E、会阴部烧伤

正确答案: D

4. 何某, 男, 32 岁。因急进性肾小球肾炎收治入院, 医嘱予以大剂量糖皮质激素治疗。在治疗期间, 为了避免病情进一步恶化, 护士应特别注意观察和预防的不良反应是()

- A、消化性溃疡
- B、血糖上升
- C、血压升高
- D、精神兴奋
- E、向心性肥胖

正确答案: C

5. 林某, 男, 65 岁。高血压病史 20 年, 平素间断服用抗高血压药治疗。入院前 2 小时因与家人争吵后突发严重头痛、恶心、呕吐, 急送医院。身体

评估:急性病容,呼吸 24 次/分,血压 240/120mmHg,心率 90 次/分,律齐,眼底出血,余无异常。此时病人最可能出现了()

- A、高血压亚急症
- B、高血压急症
- C、心律失常
- D、心力衰竭
- E、脑出血

正确答案: B

6. 高压氧治疗的含义是()

- A、在常压下呼吸纯氧
- B、在超过常压的环境下吸 30%以下浓度的氧气
- C、在超过一个大气压的密闭的环境下呼吸纯氧或高浓度的氧气
- D、在超过一个绝对压的环境下吸氧与 CO₂ 的混合气体
- E、在高压环境下吸空气

正确答案: C

7. 伤寒患者灌肠时,灌肠筒内液面不得高于肛门(),液体量不得超过 500ml

- A、31cm
- B、32cm
- C、40cm
- D、30cm

正确答案: D

8. 表面麻醉常用局部麻醉药为

- A、1%普鲁卡因
- B、0.5%利多卡因
- C、1%丁卡因
- D、1%利多卡因
- E、0.1%丁卡因

正确答案: C

9. 用于消化性溃疡出血止血治疗的药物不包括()

- A、加压素
- B、西咪替丁
- C、法莫替丁
- D、奥美拉唑

E、雷尼替丁

正确答案：A

10. 对急性胃肠炎患者需留置胃管时要谨慎，胃管的前端不要太靠近胃黏膜，以免()而引起感染。

A、影响消化

B、刺激食道

C、穿孔

D、损伤充血水肿的胃黏膜

正确答案：D

11. 李某, 男, 35 岁。于中午进餐后, 晚 7 时许出现上腹痛, 伴呕吐。身体评估: 体温 37.7° C, 上腹部压痛明显, 但无反跳痛, 肠鸣音亢进。血、便常规无异常。该病人最可能患的疾病是()

A、急性胃炎

B、急性胰腺炎

C、急性胆囊炎

D、急性肠炎

E、胃溃疡

正确答案：A

12. 李某, 男, 68 岁。高血压病史 8 年, 糖尿病病史 1 年, 血压最高 170/105mmHg, 服用抗高血压药可控制在 150/90mmHg, 吸烟, 不饮酒。根据以上情况, 判断该病人为()

A、原发性高血压, 低危组

B、原发性高血压, 很高危组

C、原发性高血压, 高危组

D、原发性高血压, 很低危组

E、原发性高血压, 中危组

正确答案：B

13. 皮内注射时, 待药液注入至局部直径约()cm 的皮丘形成, 可拔出针头

A、0.4

B、1

C、0.3

D、0.5

正确答案：D

14. 主要表现为急性右心功能衰竭:呼吸困难,呼吸频率可达()以上,可出现极度烦躁、大汗淋漓、面色青灰以及濒死感

- A、28 次/分
- B、30 次/分
- C、20 次/分
- D、40 次/分

正确答案: D

15. 母乳喂养中,下列哪项方法不正确

- A、早吸吮
- B、按需哺乳
- C、哺乳时,母亲以食指和中指夹钳乳头给婴儿吸吮
- D、哺乳毕,将婴儿直抱并轻拍其背部
- E、乳母患有急性传染病时不应哺乳

正确答案: C

16. 高压氧的绝对禁忌症之一是()

- A、有颅骨缺损者
- B、未经处理的气胸
- C、活动性肺结核
- D、妇女月经期与妊娠期
- E、急性鼻窦炎病人

正确答案: B

17. 口腔感染临床表现:轻度感染溃疡发生在舌前 1/2 处,独立溃疡少于()个,溃疡面直径()cm

- A、1, <0.3
- B、3, <0.3
- C、3, <0.2
- D、2, <0.3

正确答案: B

18. ()受损屈腕力弱,环指和小指的远节不能屈

- A、肘正中神经
- B、尺神经
- C、桡神经
- D、中枢神经

正确答案: B

19. 导尿管拔除困难时, 尽量让患者多饮水, 每天()ml

- A、1000-1500
- B、2000-1000
- C、1500-2500
- D、500-1000

正确答案: C

20. 口腔感染多为()感染, 舌头或口腔内壁可出现黄色或白色斑点, 患者自觉疼痛, 拒绝进食。

- A、真菌
- B、病毒
- C、细菌
- D、厌氧菌

正确答案: A

21. 李某, 女, 26 岁。淋暴雨后突然出现高热, 体温最高达 39.8℃, 伴咳嗽、咳痰, 痰液为铁锈色。该病人最可能的诊断是()

- A、普通感冒
- B、急性肺水肿
- C、肺炎球菌肺炎
- D、阿米巴肺脓肿
- E、克雷伯杆菌肺炎

正确答案: C

22. 属脂溶性维生素的是

- A、维生素 B1
- B、维生素 C
- C、维生素 D
- D、维生素 B6
- E、维生素 PP

正确答案: C

23. 污染的伤口消毒待干后(如需用药的伤口则正常用药), 用无菌敷料覆盖伤口, 防水敷料可作为二级敷料固定()

- A、一级敷料
- B、位置
- C、敷料
- D、三级敷料

正确答案：A

24. 叶某, 男, 38 岁。近半年来常于劳累或精神紧张后头痛、头晕。休息后好转, 未予治疗。最近体检发现血压升高, 三次不同时间测血压分别为 140/190mmHg、150/95mmHg、155/95mmHg 对其诊断与处理最重要的考虑应为()

- A、继续在不同时间内测血压, 以帮助确诊
- B、注意休息, 缓解精神紧张
- C、确定是原发性还是继发性高血压
- D、试用利尿药治疗, 观察其用药反应
- E、暂不处理, 3 个月后复查血压

正确答案：C

25. 机械通气的患者加强翻身、叩背、排痰, 翻身、叩背()1 次, 每次 5-10 分钟。

- A、每 3-4 小时
- B、每 4-6 小时
- C、每 2-3 小时
- D、每 1-2 小时

正确答案：C

26. 脑室引流常用于抢救因脑脊液循环受阻所致的颅内高压危急状态, 如()

- A、枕骨大孔疝
- B、脑疝
- C、脑出血
- D、蛛网膜下腔出血

正确答案：A

27. 朱某, 男, 40 岁。患有“胃溃疡”, 于饱餐后突然出现上腹剧烈疼痛, 腹肌紧张, 有压痛、反跳痛, 肝浊音界消失, 首先应判断为()

- A、并发幽门梗阻
- B、并发慢性穿孔
- C、急性胆囊炎
- D、溃疡癌变
- E、并发急性穿孔

正确答案：E

28. 溃疡病病人腹痛剧烈, 疑有穿孔合并症, 禁止使用()

- A、阿托品
- B、西咪替丁
- C、吗啡
- D、胃肠减压
- E、灭吐灵

正确答案：C

29. 留置胃管时如确定为食物残渣或血凝块阻塞胃管，可用（ ）从胃管注入以稀释和溶解黏稠的胃液、食物残渣或血凝块。

- A、糜蛋白酶+碳酸氢钠注射液
- B、醋酸
- C、生理盐水
- D、浓氯化钠

正确答案：A

30. 误服敌百虫中毒时忌用哪种溶液洗胃

- A、温开水
- B、蒸馏水
- C、0.9%氯化钠注射液
- D、4%碳酸氢钠
- E、1:5000 高锰酸钾

正确答案：D

31. 动脉硬化病人宜食用

- A、低盐膳食
- B、低胆固醇饮食
- C、低蛋白饮食
- D、低纤维膳食
- E、高钾低钠膳食

正确答案：B

32. 胸腔闭式引流适应于急性脓胸、胸外伤、肺及其他胸腔大手术后、张力性气胸。禁忌症为（ ）

- A、外伤
- B、结核性脓胸
- C、脓胸
- D、血性液胸

正确答案：B

33. 诊断 COPD 的必备条件是()

- A、完全可逆的气流受限
- B、不完全可逆的气流受限
- C、可逆的气流受限
- D、不可逆的气流受限
- E、完全气流受限

正确答案：B

34. 痰液黏稠者，应用生理盐水 40ml 加庆大霉素()万 u、糜蛋白酶 4000u 行雾化吸入

- A、4
- B、5
- C、6
- D、8

正确答案：D

35. 苏某, 男, 49 岁。因风湿性心脏病入院。给予抗感染和抗心力衰竭治疗后明显好转, 拟于近日出院。责任护士在指导中应强调, 预防链球菌感染最重要的措施是()

- A、减轻心理压力, 增强康复信心
- B、减少运动, 多休息
- C、坚持适当锻炼, 防治呼吸道感染
- D、坚持限制钠盐饮食
- E、定期检查, 必要时做细菌培养

正确答案：C

36. 祥式造口支架一般()拔除。

- A、3-7 天
- B、14 天后
- C、7-10 天
- D、10-14 天

正确答案：D

37. 马某, 男, 55 岁。因肝硬化并发肝性脑病入院。经治疗后神志转清, 为避免肝性脑病的诱发因素, 下列护理措施中不妥的是()

- A、放腹水时补充人血白蛋白
- B、防止感染
- C、生理盐水灌肠

D、适量应用催眠镇静药

E、保持排便通畅

正确答案：D

38. 以下关于食管的叙述错误的是()

A、食管的功能是把食物和唾液等运送到胃内

B、食管有3个狭窄

C、食管下括约肌可防止胃内容物逆流人食管

D、食管壁由黏膜、黏膜下层、肌层和浆膜层组成

E、食管连接咽和胃

正确答案：D

39. 心肺复苏最后成功的关键是()

A、脑复苏

B、肾复苏

C、心肺复苏

D、肺复苏

E、心复苏

正确答案：A

40. 急性肾衰竭少尿无尿早期主要死亡原因是()

A、低钾血症

B、低钠血症

C、高钾血症

D、低钙血症

E、高镁血症

正确答案：C

41. 下列哪项不是白血病的临床表现()

A、出血

B、器官浸润

C、血糖降低

D、贫血

E、发热

正确答案：C

42. 适宜包扎疗法的烧伤创面是

A、会阴部烧伤

B、III度烧伤

- C、四肢浅Ⅱ度及深Ⅱ度烧伤
- D、四肢高压电接触伤
- E、面部浅度烧伤

正确答案：C

43. 骨牵引病人为防止针孔感染, 护理上应注意()

- A、除去针孔血痂
- B、全身应用抗生素
- C、移动钢针调正位置
- D、定期更换牵引钢针
- E、每日 2 次乙醇滴针孔处

正确答案：E

44. 空肠造瘘管饲流质最佳温度是

- A、39℃
- B、37℃
- C、35℃
- D、38℃
- E、41℃

正确答案：E

45. 常压下连续吸纯氧的安全时限为()

- A、4~6 小时
- B、8~12 小时
- C、12~24 小时
- D、24~48 小时
- E、48 小时以上

正确答案：C

46. 张某, 男, 48 岁。有扩张型心肌病病史。入院时主诉气急、乏力、出汗较多。身体评估: 口唇发绀, 两侧肺底部可闻及湿性啰音。该病人出现乏力的主要原因是()

- A、体循环淤血
- B、容量负荷过重
- C、压力负荷过重
- D、肺循环淤血
- E、心排血量减少

正确答案：E

47. 邝某, 女, 36 岁, 护士, 经常加班, 饮食不规律。节律性上腹痛 4 年, 为饥饿痛或空腹痛。为明确诊断, 具有确诊价值的检查是()

- A、幽门螺杆菌检查
- B、X 线钡餐检查
- C、粪便隐血试验
- D、胃液分析
- E、胃镜检查

正确答案: E

48. 灌肠时做到(), 一次性使用, 不得交叉使用和重复使用

- A、一人一液一管
- B、一人一液
- C、一人两液一管
- D、一人一管

正确答案: A

49. 无机盐的生理功能不包括

- A、构成人体组织
- B、维持肌肉兴奋性
- C、提供必需氨基酸
- D、维持渗透压
- E、构成生物活性物质

正确答案: C

50. 值班护士一旦发现前列腺手术后病人持续膀胱冲洗引流液颜色逐渐加深, 下列哪项不属于立即处理措施

- A、加快冲洗速度
- B、立即通知医师
- C、安慰病人, 使其不要过于紧张
- D、给予抗感染治疗
- E、开通静脉通路

正确答案: D

51. 标准大气压是指下列哪种条件下物体在单位面积上所承受的压力()

- A、在纬度为 45° 的海平面上, 温度为 0°C 时
- B、在海平面上温度为 4°C 时
- C、在赤道海平面上, 温度为 0°C 时
- D、在赤道海平面上, 温度为 4°C 时

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/516132141024011003>