

麻醉学中级考试之相关专业知识试题及答案

1、以下哪种产科疾病不易出现失血性休克

- A、羊水栓塞
- B、宫外孕
- C、早产
- D、子宫破裂

答案：C

2、当发生心源性肺水肿时,为了增加心脏收缩力,选择下列哪项最适宜

-
- A、氧
 - B、吗啡
 - C、洋地黄
 - D、呋塞米
 - E、硝酸甘油

答案：C

3、在左心衰竭基础上,又发生右心衰竭时,下列哪个症状可以有所减轻

-
- A、腹水
 - B、呼吸困难
 - C、食欲不振
 - D、少尿
 - E、肝大

答案：B

4、幽门梗阻患者,长期呕吐可造成_____

- A、低氯低钾酸中毒
- B、低氯低钾碱中毒
- C、高氯高钾酸中毒
- D、高氯高钾碱中毒
- E、低钾高氯碱中毒

答案：B

5、增强机体对应激刺激耐受能力的激素是_____

- A、甲状旁腺激素
- B、胰岛素
- C、胰高血糖素
- D、甲状腺激素

E、糖皮质激素

答案：E

6、妇科手术最易损伤下列哪个器官_____

A、肾

B、输尿管

C、小肠

D、尿道

E、直肠

答案：B

7、妊娠合并急性脂肪肝常见而在先兆子痫中罕见的症状或检查是_____

A、黄疸

B、蛋白尿

C、碱性磷酸酶增加

D、瘙痒

E、AST>1000U/L

答案：A

8、关于食管癌手术,以下哪项正确_____

A、由于肿瘤堵塞食管,所以不会发生反流和误吸

B、单肺通气是手术的必需条件

C、与肺手术相比,单肺通气引起低氧血症的可能性较小

D、手术操作容易引起血流动力学改变

E、手术是食管癌的唯一治疗方法

答案：D

9、法洛四联症最早且主要的表现是

A、蹲踞

B、发绀

C、突然晕厥

D、杵状指趾

E、活动耐力下降

答案：B

10、有机磷农药中毒的机制_____

A、胆碱酯酶不能被磷酸化

B、乙酰胆碱被水解为胆碱及乙酸

C、胆碱酯酶活性降低,乙酰胆碱积聚

D、胆碱酯酶活性增高,乙酰胆碱减少

E、乙酰胆碱活性降低,胆碱酯酶积聚

答案: C

11、关于食管癌的描述,下列哪项是正确的

A、按病理形态,临床上可将食管癌分为四型:结节型、溃疡型、髓质型、狭窄型

B、有局部淋巴转移的病人首选放疗

C、对于可疑病例,都应该行食管稀钡 X线双重对比造影

D、上段食管癌多数是腺癌

E、食管癌多数病例可早期出现背痛和持续性胸痛

答案: C

12、终末期肾病患者死亡的首要原因是

A、心血管疾病

B、神经系统疾病

C、消化系统疾病

D、呼吸系统疾病

E、血液系统疾病

答案: A

13、ARDS的诊断哪项正确

A、FiO₂ 0.5,PaO₂ 300mmHg,PaCO₂ 30mmHg

B、FiO₂ 0.5,PaO₂ 150mmHg,PaCO₂ 54mmHg

C、FiO₂ 0.5,PaO₂ 63mmHg,PaCO₂ 28mmHg

D、FiO₂ 0.5,PaO₂ 300mmHg,PaCO₂ 42mmHg

E、FiO₂ 0.5,PaO₂ 200mmHg,PaCO₂ 77mmHg

答案: C

14、发生急性前间壁心梗的最可能是哪支冠脉阻塞_____

A、左冠状动脉前降支

B、左冠状动脉回旋支

C、右冠状动脉

D、左冠状动脉主干

E、右冠状动脉后降支

答案: A

15、患者,男性,42岁,肢浮肿,呼吸困难,查体心音遥远,奇脉,肝颈静脉回流征阳性,脉压差小。2、治疗首选

A、利尿药

B、心包穿刺引流

- C、大量静点抗生素
- D、快速输血、补液
- E、多巴胺强心

答案：B

16、关于妊娠期母体血液的改变,下列描述正确的是_____

- A、血容量于妊娠 10 周开始增加,妊娠 36 周达高峰
- B、网织红细胞数轻度减少
- C、白细胞总数增高,中性粒细胞数减少
- D、红细胞沉降率加快
- E、血浆纤维蛋白原稍增加

答案：D

17、诊断血胸最准确、可靠的检查方法是

- A、x 线胸片
- B、肺部听诊
- C、胸部 CT
- D、胸腔穿刺
- E、血气分析

答案：D

18、黄疸病人手术麻醉后肾衰的发生率增高,主要原因是

- A、胆红素毒素
- B、内毒素
- C、肾缺血缺氧
- D、药物加重肾负担
- E、凝血因子的破坏

答案：B

19、儿童颅内压正常值范围_____

- A、0.7~2.0kPa70~200mmH₂O
- B、0.5~1 kPa50~100mmH₂O
- C、0.5~1.2 kPa50~120mmH₂O
- D、0.8~1.8 kPa80~180mmH₂O
- E、0.8~1.2 kPa80~120mmH₂O

答案：B

20、急性烧伤病人可出现_____

- A、小颌畸形
- B、巨舌

- C、颞颌关节强直
- D、气管受压、喉头气管偏离
- E、呼吸道水肿

答案：E

21、患者女,25岁。渐起双手麻木、乏力半年。查体:双手小鱼际肌:骨间肌萎缩,双手部痛温觉消失,深感觉正常。最可能的诊断为_____

- A、多发性硬化
- B、肌萎缩性侧索硬化
- C、脊髓压迫症
- D、脊髓空洞症
- E、急性脊髓炎

答案：D

22、术后患者出现通气不足,可直接导致_____

- A、血压下降
- B、心率下降
- C、高碳酸血症
- D、低碳酸血症
- E、血气 pH>7.40

答案：C

23、产妇在胎儿娩出后不久,突然出现烦躁不安、呛咳、呼吸困难、发绀,心率快而弱,此时应考虑的疾病是_____

- A、产后循环衰竭
- B、先兆子痫
- C、羊水栓塞
- D、脑血管意外
- E、癫痫

答案：C

24、下列哪个病例很少会出现产后大出血?

- A、前置胎盘
- B、羊水栓塞
- C、急产
- D、稽留流产
- E、胎盘早剥

答案：C

25、对诊断系统性红斑狼疮检查无意义的是:

- A、抗双链 DNA 抗体
- B、抗核抗体
- C、抗 SM 抗体
- D、抗 RNP 抗体
- E、C 反应蛋白下降

答案：E

26、肾性尿崩症和垂体性尿崩症的鉴别常选用

- A、高渗盐水兴奋试验
- B、限水试验
- C、烟碱兴奋试验
- D、酒精或苯妥英钠抑制试验
- E、禁水和垂体后叶素试验

答案：E

27、房颤病人用洋地黄转复窦律，出现心动过缓、消化道症状，治疗措施应该是_____

- A、减少注射氯化钾
- B、继续应用洋地黄治疗
- C、同步直流电复律
- D、减少洋地黄用量
- E、停用洋地黄

答案：E

28、慢性支气管炎患者的植物神经功能失调表现为

- A、副交感神经功能进
- B、交感神经功能低下
- C、受体功能进
- D、 β_3 受体功能进
- E、副交感神经功能低下

答案：A

29、急进性肾小球肾炎的治疗_____

- A、大剂量甲泼尼龙冲击+环磷酰胺+血浆置换
- B、泼尼松 1mg/kg+环磷酰胺
- C、泼尼松 1mg/d
- D、泼尼松 30mg/d+环孢素 A
- E、抗生素 2 周+卧床休息+对症处理

答案：A

30、有关妊娠合并糖尿病的说法,错误的是_____

- A、对于糖尿病合并妊娠者需要严格控制血糖,防止出现酮症酸中毒
- B、对于妊娠合并糖尿病者首先是明确诊断,在妊娠 24~28 周进行糖耐量筛查
- C、控制母体血糖时多采用口服降糖药如二甲双胍
- D、糖尿病孕妇发生先兆子痫的风险是其他孕妇的 2~3 倍
- E、对于胎儿巨大的产妇,最好选择剖宫产

答案: C

31、甲状腺癌预后最差的组织类型

- A、乳头状癌
- B、滤泡状癌
- C、未分化癌
- D、髓样癌
- E、胶样癌

答案: C

32、以下哪种说法是错误的_____

- A、冷抗体型溶血性贫血患者,手术时应注意保暖
- B、镰状细胞贫血患者,手术时应注意保暖
- C、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者,应避免使用非甾体镇痛药物
- D、溶血性输血反应的首选治疗是糖皮质激素
- E、特发性血小板减少性紫癜患者围术期应避免感染,必要时应用糖皮质激素以防止血小板减少

答案: D

33、下列关于前置胎盘临床表现的描述,不正确的是_____

- A、无痛性阴道流血
- B、宫底高度与孕周相符
- C、子宫下段闻及胎盘血流杂音
- D、子宫张力高,胎心音不易闻及
- E、先露下降受阻

答案: D

34、下列哪种症状是洋地黄中毒的先兆表现,并可作为停药指征:

- A、室早
- B、室
- C、房性心律失常伴房室传导阻滞
- D、视觉异常

E、胃肠道反应

答案：D

35、患者女性,35岁,3小时前无明显诱因出现剧烈头痛,大汗淋漓,轻度意识障碍,烦躁。入院后查体:BP135/70mmHg,HR 90bpm,浅快呼吸,颈强直,克氏征阳性,CT显示蛛网膜下腔出血。患者既往体健。4. 确诊后,下列哪项治疗措施不正确_____

- A、严密监护
- B、可在病房内活动
- C、对有脑血管痉挛者,给予解痉治疗
- D、 Hunt 一、二级尽早手术
- E、 Hunt 三级和三级以上手术风险较大

答案：B

36、脑动脉瘤,最常用的检查是_____

- A、CT
- B、MRI
- C、脑血管造影
- D、颈动脉B超,经颅多普勒超声
- E、脊髓血管造影

答案：C

37、下列哪些情况术前药应给予异丙嗪

- A、过敏体质的病人
- B、有糖尿病的病人
- C、有高血压的病人
- D、有哮喘的病人
- E、肝肾功能损害的病人

答案：A

38、应用强心苷过程中不能补充的离子:

- A、钾
- B、镁
- C、钙
- D、钠

答案：C

39、分泌醛固酮的部位是_____

- A、肺
- B、肾上腺皮质

- C、肾上腺髓质
- D、肾
- E、肝

答案：B

40、库欣综合征是肾上腺分泌过多()

- A、甲状腺激素
- B、促肾上腺皮质激素
- C、糖皮质激素
- D、盐皮质激素
- E、TSH

答案：C

41、男,70岁,1天前因股骨颈骨折住院,今日突发呼吸困难,大汗,既往体健。查体:T36.5C,BP90/60mmHg,无颈静脉怒张,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心率100次/分,P亢进伴分裂,肝肋下未及,双下肢无水肿,心电图提示电轴右偏,SIQIIIITIII征,血清肌钙蛋白阴性。该患者最可能的诊断是_

- A、急性心力衰竭
- B、急性心肌梗死
- C、肺动脉栓塞
- D、急性呼吸窘迫综合症
- E、吸入性肺炎

答案：C

42、下列5个心脏功能指标中临床常用反映左心前负荷的指标是_____

- A、心室舒张末容积 LVEDV
- B、心室 dp/dt
- C、肺小动脉楔压 PAWP
- D、左室收缩压 LVPs
- E、动脉收缩压 Aps。

答案：C

43、男,75岁,有30年高血压史,两天前突然昏倒,神志不清。头部CT检查发现:基底节有一3cm×5cm边缘清楚,密度均匀的高密度区,周围有水肿带。根据上列病例症状和X线特征,最有可能的诊断是_____

- A、脑梗死
- B、脑水肿
- C、脑内血肿
- D、脑瘤

、脑挫裂伤

答案：C

44、女性,24岁。8个月来在左乳房外上象限扪及一直径3cm的圆形、光滑、活动、质韧之肿块,可能为_____

- A、早期乳癌
- B、纤维腺瘤
- C、Paget 乳头病
- D、乳房囊性增生病
- E、乳腺结核

答案：B

45、ARDS患者进行机械通气时,哪些描述不正确_____

- A、应用 PEEP从低水平开始,逐渐增加至合适水平,避免肺泡和小气道陷闭
- B、小潮气量,使气道峰压 $<40\text{cmH}_2\text{O}$
- C、注意补充血容量,以代偿回心血量不足
- D、吸氧浓度不宜超过60%
- E、尽量降低 PEEP水平,吸氧浓度可不加限制

答案：E

46、应用止血带的合并症应除外_____

- A、压力不合适可造成术野出血增多
- B、压力过大、时间过久或麻醉作用不全时,可出现严重的止血带痛
- C、可诱发和增加骨科手术中肺栓塞的发生
- D、放松止血带后可出现止血带休克
- E、充气压力过大和应用时间过长可造成止血带麻痹

答案：C

47、确定肺结核的主要依据是_____

- A、血常规
- B、结核菌素试验
- C、纤维支气管镜
- D、痰中找到结核菌
- E、细胞沉降率

答案：D

48、下列哪项是动脉粥样硬化的主要易患因素_____

- A、高血压
- B、肥胖
- C、饮酒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/517153011121006156>