

案例	题干（必填）	难度（必填）
	外周静脉留置针常规消毒穿刺部位皮肤直径为（ ）	中
	发泡剂药物输液时，在输注过程中，应每（ ）评估并验证回血情况1次	中
	自外周静脉推注发泡剂应限制持续时间少于（ ）	中
	渗出可分为（ ）级	中
	PICC附加的肝素帽或无针接头应每（ ）更换1次	中
	PICC导管在治疗间歇期应至少（ ）维护1次	中
	PICC更换敷料时消毒面积（ ）	中
	从PICC导管抽血后及时用（ ）生理盐水脉冲式冲管	中
	CVC可用肝素盐水封管，其浓度为（ ）	中
	PORT在治疗间歇期应至少每（ ）维护1次	中
	PORT冲管和封管应使用（ ）及以上注射器或一次性预充装置	中
	输血开始输入时速度宜慢，观察（ ）左右，无不良反应再根据病情、年龄和输血成分调节滴速	中
	输血完毕，储血袋应低温保存（ ）	中
	连续输入不同供血者的血液时，应在前一袋血输尽后，用（ ）冲洗输血器，再接下一袋血继续输注	中
	经外周留置针输注发泡性药物时，静脉推注或输注时间限制在（ ）内	中
	经外周留置针输注发泡性药物禁止使用已经建立超过（ ）的静脉穿刺部位	中

	肠外营养支持有效的适应症不包括（ ）	中
	肠外营养的禁忌症不包括（ ）	中
	单独输注脂肪乳剂时，输注时间不超过（ ）	中
	10%、20%脂肪乳注射液500ml的输注时间不少于（ ）	中
	穿刺头皮钢针时头皮针与皮肤成（ ）°角	低
	静脉留置针对于危重症/麻醉后镇静患者或者有认知障碍的患者，应（ ）小时检查1次	低
	冲管液量至少应为导管及其附加装置容积的（ ）倍	低
	使用CVC、PICC、PORT静注药物后冲封管时应使用（ ）的注射器或专用的导管冲洗装置	低
	对患者要进行两种方式以上的身份识别：（ ）	低
	PICC置管（ ）常规更换敷料	低
	当输入的药物与氯化钠不相容时，应先用（ ）冲管后再用0.9%氯化钠溶液冲管	低
	使用PICC后我们应使用浓度为（ ）的肝素盐水或不含防腐剂的生理盐水封管	低
	患者进行PICC穿刺后注意每日测量双侧臂围，每次要在同一部位测量，并与原纪录比较（ ）为异常	低
	当患者输入了（ ）后必须立即进行脉冲式冲管，再继续输注其他药物	低
	更换PICC贴膜时候我们应（ ）去处贴膜	低
	静脉治疗结束后为患者拔除PICC导管时，患者取（ ）位，置管侧手臂（ ）。 （ ）	低
	连接PORT时应使用专用的无损伤针穿刺，连续输液时每（ ）天更换无损伤针1次	低

	PORT在治疗间歇期至少（ ）维护1次	低
	肠外营养的适应症不包括（ ）	低
	血液制品从血库取出后应（ ）内输注	低
	给患者输入1个单位的全血应在（ ）内输完	低
	为患者输血时，输血器应（ ）更换一次	低
	使用抗肿瘤药物，配药时操作者应佩戴（ ）	低
	抗肿瘤药物溢出时，污染处用清水洗涤的顺序是（ ）	低
	一次性静脉输液钢针禁用范围（ ）	高
	应用以下哪些方式对患者进行身份核对确认（ ）	高
	输液过程中应告知患者输液期间注意事项有哪些（ ）	高
	静脉炎发生的原因（ ）	高
	PICC穿刺后应记录哪些内容（ ）	高
	PICC导管更换敷料时机（ ）	高
	对PICC置管的患者，护士应向患者及家属进行哪些方面的健康教育（ ）	高
	PICC穿刺点渗血、皮下出血的预防措施有哪些（ ）	高
	肠外营养疗效显著的适应症有哪些（ ）	高
	输血的禁忌症有哪些（ ）	高

	一次性静脉输液钢针适用范围（ ）	高
	下列说法错误的是（ ）	高
	合格的皮肤消毒剂包括（ ）	高
	静脉输液时当发生静脉炎临床表现有（ ）	高
	患者王某，在输液时候发生药物外渗，我们应（ ）处理	高
	当输入（ ）必须使用精密输液器	高
	（ ）情况下不能植入PICC导管	高
	为患者李阿姨进行PICC穿刺后宣教内容错误的是（ ）	高
	进行PICC穿刺时，操作方法正确的是（ ）	高
	护士小张给留置PICC的王叔叔进行维护前做法正确的是（ ）	高
	患者张某进行PICC穿刺后出现静脉炎，护士应（ ）	高
	为了预防导管相关性血栓的形成，我们应该（ ）	高
	导管相关性血流感染的预防措施包括（ ）	高
	患者刘某在使用输液港输液时出现了药液外渗，我们应（ ）	高
	以下（ ）是肠外营养支持有效的适应症	高
	肠外营养液的配置应严格配药流程（ ）	高
	肠外营养液的输注要求（ ）	高

	输血的适应症包括（ ）	高
	护士小王去血库取血进行三查、八对，其中三查指的是（ ）	高
	在给患者输注发泡性药物时应特别注意（ ）	高
	接受乳房根治术和腋下淋巴结清扫术的患者应选择健侧肢体进行穿刺	中
	无张力贴膜固定方法：双手持膜，将贴膜的中央部位落在穿刺点正上方，将蝶翼部分塑形，然后从穿刺点向四周轻压透明敷贴，贴膜下不能出现气泡	中
	当使用静脉留置针输液结束时，正压接头的留置针上的小夹子的夹闭顺序是：在封管液注射器与接头断开前夹闭	中
	当使用静脉留置针输液结束时，负压接头的留置针应先夹闭小夹子后断开注射器	中
	选择血管时，应按由远心端向近心端的顺序，尽量在一根血管上进行穿刺	中
	留置针的延长管的夹子夹闭位置宜靠近留置针远心端	中
	无菌透明辅料应至少7d更换1次，无菌纱布辅料应至少3天更换1次	中
	经PICC导管给药前宜通过回抽血液来确定导管在静脉内	中
	在进行PICC的维护，酒精消毒皮肤时，应特别注意认真消毒穿刺点	中
	在为患者进行静脉治疗时应：先输入普通液体，后输入脂肪乳剂	中
	有血栓史和血管手术史的静脉不应进行穿刺	低
	年龄小于 个月的婴儿可以用 葡萄糖氯己定乙醇溶液作为皮肤消毒剂	低
	对穿刺困难的静脉可使用血管可视化技术辅助穿刺	低

	输液时调节滴速一般成人20 40滴/分，儿童40 60滴/分	低
	撕除贴膜时应以0° 或180° 角为宜	低
	使用CVC、PICC、PORT静注药物时应使用容量≥10毫升注射器	低
	导管堵塞多是由于机械性阻塞或冲封管不当所致	低
	PICC置管后不用X线检查确定导管尖端位置可以直接输液	低
	PICC置管的患者每次测量臂围应在同一位置，以保证数据的可比性	低
	PICC导管的冲管和封管应使用5毫升注射器	低
	PICC穿刺和维护时，应遵循无菌技术操作原则，宜使用专用护理包，置管时，宜遵循最大化无菌屏障原则	低
	PICC不应使用高压注射泵注射造影剂。（耐高压导管除外）	低
	PICC拔管困难的患者，拔管前可热敷置管侧手臂30分钟	低
	PORT可用于任何性质的药物输注	低
	配置PN可在治疗室操作即可	低
	PN应现用现配，如需存放，应避光冷藏（置于4度冰箱内），复温后再输注	低
	配置好的PN标签上应注明科室、病案号、床号、姓名、药物的名称、剂量、配置日期和时间	低
	再输注的PN中不应加入任何药物，以免导致脂肪乳剂的分解，影响相容性	低
	输血患者，输血器应24小时更换一次	低
	血液制品从血库取出后30min内输注	低

试题解析	题目类型（必填）	正确选项（必填）		
	单选题		≥8cm	≥6cm
	单选题		5 1 m	1 15m
	单选题		2	1
	单选题		2级	3级
	单选题		3天	5天
	单选题		3天	7天
	单选题		1 12cm	8 8cm
	单选题		5m	1 m
	单选题		1 m	1 5 m
	单选题		1周	2周
	单选题		5m	1 m
	单选题		5m	1 m
	单选题		6	12
	单选题		生理盐水	肝素盐水
	单选题		3 6 m	6 m
	单选题		12	2

	单选题		大手术、创伤的围手术期	肠外瘘
	单选题		胃肠功能正常	需急诊手术、术前不可能实施营养支持者
	单选题		12h	24h
	单选题		5h	10h
	单选题		15°	30°
	单选题		每1h检查1次	每1~2h检查1次
	单选题		4倍	3倍
	单选题		5ml	≥10ml
	单选题		患者房间号、患者姓名	核对腕带信息、患者姓名
	单选题		24h	12h
	单选题		无菌注射用水	0.9%氯化钠溶液
	单选题		0~10 ml	10~20 ml
	单选题		> 1cm	> 2cm
	单选题		抗菌素	脂溶性维生素
	单选题		自上而下	自下而上
	单选题		半卧位、外展90°	坐位、手臂放平
	单选题		2天	3天

	单选题	C	1周	2周
	单选题	C	胃肠道梗阻患者	严重营养不良患者
	单选题		15	3
	单选题		2h	3h
	单选题		4h	2h
	单选题		PVC手套	无菌手套
	单选题		污染物同时放入清水中清洗	从污染最轻到污染最重区域
	多选题	C	腐蚀性药物	刺激性药物
	多选题		核对腕带信息	让患者说出姓名
	多选题	C	不可随意调节滴速	可以自行调节滴速
	多选题	C	无菌操作不严格	药物过酸或过碱，引起血浆PH改变，可以干扰血管内膜的正常
	多选题	C	记录穿刺静脉	记录穿刺日期
	多选题	C	每天更换	PICC置管24小时后常规更换敷料
	多选题	C	洗澡时，注意保护置管肢体，勿浸泡贴膜	告知患者每天进行3-5次/h松握拳运动，置管肢体不要上举、下
	多选题	C	提高一针穿刺成功率，避免反复穿刺	尽量避开肘窝穿刺
	多选题	C	胃肠道梗阻	胃肠道吸收功能障碍
	多选题	C	急性肺水肿、肺栓塞	充血性心力衰竭

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/517154045152006040>