

2024年浙大二院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、踝动脉压和肱动脉压的比值小于0.5，表示（ ）。

- ☐ A. 下肢动脉严重狭窄
- ☐ B. 上肢动脉严重狭窄
- ☐ C. 上肢动脉轻度狭窄
- ☐ D. 上、下肢动脉均严重狭窄
- ☐ E. 下肢动脉轻度狭窄

『正确答案』
A

『答案解析』
踝肱指数（ABI）测定，也称踝臂指数，是临床上最简单和常用的检查方法，为踝部胫后动脉或胫前动脉动脉收缩压与肱动脉收缩压的比值，正常值≥1，小于0.9为异常，小于0.5为下肢严重狭窄。

2、男性，22岁，一年来性格变得固执任性，放弃工作而一心钻研数学、哲学，有时突然变得茫然，乱翻床铺，持续时间短暂，过后否认是自己弄的，认为是别人搞得这样。一次回家路上听到母亲在桥上哭，走到桥上又听到母亲在河里哭，于是跳进河里找，被救出，意识恢复后，感到奇怪。病人4岁和16岁时有癫痫发作史。脑电图见阵发性棘慢波。其诊断是（ ）。

- ☐ A. 人格障碍
- ☐ B. 癫痫所致精神障碍
- ☐ C. 精神分裂症
- ☐ D. 偏执性精神病
- ☐ E. 脑外伤性精神障碍

『正确答案』
B

『答案解析』
暂无解析。

3、小儿咽扁桃体发育达高峰的年龄是（ ）。

- ☐ A. 6个月内
- ☐ B. 1岁末
- ☐ C. 2~3岁
- ☐ D. 3~4岁
- ☐ E. 4~10岁

『正确答案』
E

『答案解析』
小儿扁桃体于1岁时逐渐增大，咽部检查时方可见到，4~10岁发育达高峰，至14~15岁时又逐渐退化。故儿童扁桃体炎常见于学龄儿童。

4、下列哪项是诊断温抗体型溶血性贫血最重要的实验室检查？（ ）

- ☐ A. Ham试验
- ☐ B. Coombs试验
- ☐ C. 红细胞渗透性脆性试验
- ☐ D. 免疫球蛋白测定
- ☐ E. 血红蛋白电泳

『正确答案』

B

『答案解析』

溶血性贫血详细的实验室检查包括血常规、网织红细胞计数、血涂片、溶血的相关实验室检查、（Coombs试验、酸溶血试验、红细胞脆性试验等）、骨髓象检查。抗人球蛋白（Coombs）试验自身免疫性溶血性贫血时为阳性。故本题答案为B项。

5、蛋白质二级结构是指分子中（ ）。

- ☐ A. 亚基间相对的空间位置
- ☐ B. 每一氨基酸侧链的空间构象
- ☐ C. 局部主链的空间构象
- ☐ D. 氨基酸的排列顺序
- ☐ E. 每一原子的相对空间位置

『正确答案』

C

『答案解析』

蛋白质二级结构指分子中局部主链的空间构象，维系蛋白质二级结构的主要化学键为氢键。

6、交界性肿瘤是指（ ）。

- ☐ A. 既有癌组织、又有肉瘤组织的肿瘤
- ☐ B. 既有鳞癌、又有腺癌的肿瘤
- ☐ C. 既有上皮组织、又有间叶组织的肿瘤
- ☐ D. 介于良性和恶性之间的肿瘤
- ☐ E. 以局部浸润为主要特点的低度恶性肿瘤

『正确答案』

D

『答案解析』

交界性肿瘤是指介于良性和恶性之间的肿瘤。既有癌组织、又有肉瘤组织的肿瘤称为癌肉瘤。既有鳞癌、又有腺癌的肿瘤称为腺鳞癌。既有上皮组织、又有间叶组织的肿瘤可以是良性混合性肿瘤，如乳腺纤维腺瘤，也可以是腺鳞癌。以局部浸润为主要特点的低度恶性肿瘤有基底细胞癌。

7、患者，男，28岁，有不洁性交所和吸毒史，近半年来出现体重下降、腹泻、发热，反复出现口腔真菌感染，初诊为AIDS。确诊时需要参考下列哪项主要检测指标？（ ）

- ☐ A. HIV相应的抗原
- ☐ B. HIV相应的抗体
- ☐ C. AIDS患者的补体
- ☐ D. HIV相关的CD₈⁺细胞
- ☐ E. HIV相关的CD₄⁺细胞

『正确答案』

B

『答案解析』

怀疑艾滋病者应首选监测HIV病毒抗体进行筛检；确诊可进行病毒核酸或抗原检测，或病毒分离。

8、前臂缺血性肌挛缩，多见于（ ）。

- ☐ A. 肱骨髁上骨折
- ☐ B. 桡骨骨折
- ☐ C. 尺骨骨折
- ☐ D. 尺桡骨双折
- ☐ E. Colles骨折

『正确答案』

A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/518011007037006040>