

儿童保健学题库

1、促进婴儿感知觉进展的目的主要是 (b)。

- A. 促进体格发育
- B. 促进神经精神发育
- C. 促进消化吸取功能
- D. 促进代谢功能
- E. 促进内分泌功能

2、脊髓灰质炎混合疫苗在一岁以内应服用几次(c)。

- A.1 次
- B.2 次
- C.3 次
- D.4 次
- E.5 次

3、素养发育存在明显阶段性。女性的快速增长期为(a)。

- A.7~12 岁
- B.8~10 岁
- C.10~11 岁
- D.9~14 岁
- E.8~13 岁

4、青春期最易消灭 (b)。

- A. 养分问题
- B. 心理卫生问题
- C. 学习问题
- D. 人格问题
- E. 以上都不是

5、开展生活技能教育不是为(a)。

- A. 学会、把握学问或某项技能特长
- B. 进展儿童解决问题的力量
- C. 学会人际沟通
- D. 学会处理心情
- E. 学会适应环境

6、女性青春期最早的征象是(c)。

- A. 月经初潮
- B. 乳房萌出
- C. 身高生长突增的开头
- D. 消灭腋毛
- E. 消灭

7、婴儿期施行的预防接种疫苗种类及所预防的病种是 (c)。

A. 3 种疫苗, 5种疾病

B. 4 种疫苗, 6种疾病

C. 5 种疫苗, 7种疾病

D.6 种疫苗, 8种疾病

E.7 种疫苗, 9种疾病

8、社区儿童保健的实施原则不包括(c)。

- A. 个体保健与群体保健相结合
- B. 宣传教育与行政治理相结合
- C. 重视改善社区环境与提高儿童整体安康水平相结合
- D. 促进社区儿童保健效劳与社区其他职能工作相结合
- E. 建立三级预防体系, 实行防治结合

9、儿童每天摄入脂肪应占总热能的(d)。

- A.10%~15%
- B.15%~20%
- C.20%~25%
- D.25%~30%
- E.30%~35%

10、幼儿蛋白质需要量每天按体重计应为(c)。

- A.1.0g/kg
- B.1.0~1.5
- C.1.5~2.0 g/kg
- D.2.0~2.5 g/kg
- E.2.5~3.0 g/kg

11、青春期的年龄范围是(a)。

- A.10 岁~20岁
- B.9 岁~15岁
- C.12 岁~18岁
- D.13 岁~20岁
- E.12 岁~15岁

12、预防矫治弱视最主要的措施(a)。

- A. 定期检查婴幼儿视力, 早期觉察, 早期矫治
- B. 留意用眼卫生, 小儿看书距离不宜过近
- C. 常常做眼保健操
- D. 及早配戴眼镜
- E. 以上都不是

13、对儿童平衡膳食要求中不包括(e)。

- A. 合理搭配各类食品以促进各类蛋白质互补作用
- B. 合理烹调, 削减养分素损失
- C. 留意食物的色、香、味
- D. 留意饮食卫生
- E. 每日应饮用含维生素的饮料

14、轻度养分不良皮下脂肪削减的部位主要是(c)。

- A. 面部
- B. 四肢

- C. 腹部
- D. 背部
- E. 全身

15、诞生后第一个10年内生长格外快速并根本成熟的系统是 (b)。

- A. 淋巴系统
- B. 神经系统
- C. 心血管系统
- D. 呼吸系统
- E. 消化系统

16、绘人测验适用于 (d)。

- A. 2 岁~3岁
- B. 3 岁~6岁
- C. 6 岁~12岁
- D. 5 岁~9.5岁
- E. 6 岁~10岁

17、生后6天女孩，早产2周，双侧大腿外侧皮肤发硬，肿胀，压久轻度凹陷，经医生检查诊断为生儿硬肿症。治疗原则不包括 (e)。

- A. 复温
- B. 补充热能和液体
- C. 掌握感染
- D. 订正酸中毒
- E. 赐予冷静剂

18、儿童心理发育概念中不包括 (c)。

- A. 动作发育
- B. 言语、认知发育
- C. 唱歌、音乐才能的发育
- D. 心情发育
- E. 社会适应性的发育

19、以下关于发育一般规律的论述错误的选项是

(a)。A. 各系统的发育是平衡而直轄市的

- B. 生长发育过程是连续的
- C. 生长发育过程中有阶段性
- D. 生长发育的速度呈波浪式
- E. 儿童个体生长发育呈现出肯定的轨迹

20、生长发育的影响因素中对身高的影响是 (b)。

- A. 遗传因素打算了一切
- B. 遗传赐予了生长潜力，环境打算了生长发育的现实性
- C. 基因打算了最终身高
- D. 养分打算了最终身高
- E. 体育熬炼打算最终身高

21、痤疮的防治措施 (e)。

- A. 多吃清淡食物
- B. 保持心情平衡

- C. 保持皮肤清洁
- D. 必要时用药
- E. 以上都是

22、小学生合理膳食的安排最好是 (a)。

- A. 早餐和午餐应为富含蛋白质和脂肪食物
- B. 午餐应为富含蛋白质和脂肪食物
- C. 早餐应为富含蛋白质和脂肪食物
- D. 午餐和晚餐应为富含蛋白质和脂肪食物
- E. 晚餐应为富含蛋白质和脂肪食物

23、评价幼儿园的儿童智力水平或诊断智力低下的重要方法是(e)。

- A. 斯坦福-比奈量表
- B. 韦氏儿童智力气表
- C. 发育量表
- D. 贝利婴幼儿发育量表
- E. 韦氏学前儿童智力气表

24、关于素养发育特征的描述中哪项是错误的(e)。

- A. 速度发育较早
- B. 腰腹肌力气发育较早
- C. 其后为下肢爆发力
- D. 臂肌静止耐力发育比较晚
- E. 耐力发育最晚

25、学龄期常见疾病是(d)。

- A. 养分不良
- B. 贫血
- C. 佝偻病
- D. 脊柱弯曲特别
- E. 以上都不是

26、男，生后5天，开头吸奶时口张不大，后发生痉挛，痉挛缓解后神志糊涂。应承受何种特别治疗(c)。

- A. 使用冷静剂医学全在线
- B. 吸氧
- C. 使用抗毒素
- D. 清洗脐部残端
- E. 支持疗法

27、预防龋齿最重要的措施是(a)。

- A. 保持口腔卫生
- B. 少吃糖
- C. 少吃酸性食物
- D. 加强养分
- E. 药物预防

28、男，生后5天，开头吸奶时口张不大，后发生痉挛，痉挛缓解后神志糊涂。预防此种疾病的发生应实行的措施最重要的是(e)。

- A. 留意保暖
- B. 避开刺激
- C. 加强喂养
- D. 接生时避开窒息
- E. 接生时严格招待灭菌操作技术

29、对于溺水儿童实行急救措施主要是使儿童（ a ）。

- A. 马上恢复呼吸道通畅及复苏心脏搏动
- B. 呼吸颖空气
- C. 活动四肢
- D. 马上保暖
- E. 以上都不是

30、影响生长发育的生物性因素中不包括以下哪一种 (a) 。

- A. 家庭生活条件
- B. 养分状况
- C. 体育熬炼
- D. 疾病
- E. 气候环境

31、生长激素直接作用于 (a) 。

- A. 生长介素
- B. 骨 骼
- C. 肌 肉
- D. 结缔组织
- E. 内脏器官

33、对麻痹性斜视的治疗主要是 (e) 。

- A. 配戴眼镜
- B. 同时矫治弱视
- C. 常规遮盖
- D. 运动熬炼
- E. 找出病因进展治疗

34、3岁男孩，开头消灭频繁呛咳，后发生面部青紫，首先要考虑 (c) 。

- A. 急性肺炎
- B. 粟粒性肺结核
- C. 气管异物
- D. 药物中毒
- E. 以上都不是

35、诞生后其次个10年期间，哪一系统开头萎缩 (a) 。

- A. 淋巴系统
- B. 神经系统
- C. 内分泌系统
- D. 骨骼系统
- E. 泌尿系统

36、关于发育的曲线图法的描述中哪项是错误的 (b) 。

- A. 单项发育指标的等级
- B. 多项发育指标的等级
- C. 单项发育指标的发育速度，每年增长值

D. 单项发育指标多年中随年龄增长的变动趋势

E. 几个儿童发育水平及几年中某指标的发育变动趋势的比较

37、急性重型腹泻对儿童的危害最主要是(d)。

A. 养分不良

B. 内分泌紊乱

C. 代谢紊乱

D. 脱水、水电解质紊乱

E. 心脏衰竭

38、发育的主要形态标志是 (a)。

A. 细胞、组织、器官体积增加

B. 组织功能的完善

C. 细胞、组织的分化

D. 心理、智力的进展

E. 形态、功能已全面达成人水平

39、生活制度对儿童主要影响作用不含有 (d)。

A. 保障儿童生理及生活的需要

B. 防止疲乏

C. 增加机体抵抗力

D. 培育儿童良好的性格

E. 促进生长发育

40、缺铁性贫血是体内缺铁的 (e)。

A. 二个阶段的前一阶段

B. 二个阶段的后一阶段

C. 三个阶段的第一个阶段

D. 三个阶段的其次个阶段

E. 三个阶段的第三个阶段

41、促进乳房发育成熟的主要激素是 (d)。

A. 雌激素

B. 孕酮

C. 肾上腺皮质激素

D. 催乳素

E. 睾酮

42、龋齿发生的四联因素不包括 (c)。

A. 致龋细菌

B. 糖类食物

C. 酸性食品

D. 宿主

E. 时间

44、青春期月经来潮是由于 (e)。

A. 体重增加

B. 血液充盈

C. 性激素分泌

D. 生长激素分泌

E. 以上都不是

45、在月经期间避开过度劳累是为了避开 (e)。

- A. 疲乏过度
- B. 睡眠担忧
- C. 食欲不振
- D. 腰酸腿疼

E. 盆腔充血

46、对手淫的防治措施不包括 (c)。

A. 开展青春期生理卫生教育

B. 帮助青少年正确生疏手淫

C. 避开与异性接触

D. 丰富青少年的业余活动

E. 合理安排生活制度

47、以下哪一条体育熬炼的原则是错误的 (b)。

A. 鼓舞儿童常常熬炼

B. 体育运动应从小抓起，进展强化训练

C. 应按儿童年龄、性别、安康状况安排活动内容

D. 更循序渐进地增加运动量

E. 每次燃烧前后应安排充分的预备活动和整理活动

48、指出关于发育的百分位数法描述中的错误 (e)。

A. 在大数量调查根底上计算各指标的百分位数

B. 可以百分位数划分发育等级

C. 可制成某指标的百分位数图

D. 在百分位数图上能观看出儿童发育的变动

E. 能看出身体发育的均匀程度

49、儿童心理安康“标准”中不包括 (b)。

A. 智力发育正常

B. 有良好的卫生习惯

C. 心情良好

D. 心理特点与年龄相符合

E. 人际关系适应

50、3岁男孩，发热、咳嗽、肺部可闻及干性啰音。假设肺部未闻及干性啰音最可能的诊断为 (a)。

A. 上呼吸道感染

B. 支气管炎

C. 支气管肺炎

D. 大叶性肺炎

E. 支原体肺炎

51、男性的其次性征中不包括 (b)。

A.

B.C.

腋 毛

D. 胡须

E. 喉结

52、关于女性官发育特征的描述中哪项是错误的 (d)。A. 卵巢

在 8~10 岁开头发育加快，以后呈直线上升B. 卵巢重

量增加，外形由纺锤形变为扁圆形

C. 卵巢主要

功能是分泌雌激素

D. 子宫重量和

长度与一般器官一样，在发育过程中有两次突增

E. 宫体与宫颈长

度比例，在19岁时大致相等，此后宫体长度增大1倍

53、幼儿期进展安康检查时间间隔 (b)。

- A.3 个月
- B.6 个月
- C.9 个月
- D.12 个月
- E.15 个月

54、痤疮的发生主要是由于 (d)。

- A. 面部不清洁
- B. 遗传
- C. 体胖
- D. 雄激素分泌相对增多
- E. 喜吃油腻

55、不频繁的遗精是 (b)。

- A. 特别表现，应加以留意
- B. 正常的生理现象
- C. 是泌尿系统疾病前兆
- D. 提示生殖系统发育特别
- E. 以上都不是

56、婴儿期应进展几次安康检查 (d)。

- A.1 次
- B.2 次
- C.3 次
- D.4 次
- E.5 次

57、3岁男孩，发热、咳嗽、肺部可闻及干性啰音。可能的诊断为 (b)。

- A. 上呼吸道感染
- B. 支气管炎
- C. 支气管肺炎
- D. 大叶性肺炎
- E. 支原体肺炎

58、青春早期的特征是 (a)。

- A. 生长突增阶段
- B. 女性乳房发育
- C. 消灭月经初潮
- D. 男性睾丸发育
- E. 男性喉结消灭、变声

59、早期觉察养分不良患儿最主要的措施是 (a)。

- B.2 倍

- A. 开展生长发育监测
- B. 开展安康教育
- C. 指导喂养
- D. 开展疾病预防
- E. 开展体格熬炼

60、婴儿期体格生长快速，1岁时体重已到达诞生体重的 (c)。

A.1 倍

B.2 倍

- C.3 倍
- D.4 倍
- E.5 倍

61、早期教养主要在什么时间施行 (b)。

- A. 婴儿期
- B. 幼儿期
- C. 学龄前期
- D. 学龄期
- E. 以上都包括

62、电击伤的急救措施不应包括 (e)。

- A. 脱离电源
- B. 呼吸心跳停顿者要进展人工呼吸，心脏按摩
- C. 有灼伤部位进展相应处理
- D. 对症处理
- E. 用冰袋冷敷头部，保护脑组织

63、足月顺产的生儿应在诞生后什么时间开头吸吮母亲乳头 (b)。

- A.3 小时
- B.6 小时
- C.9 小时
- D.1 天
- E.3 天

64、共性心理特征在什么时期初具有雏形 (c)。

- A. 婴儿期
- B. 幼儿期
- C. 学龄前期
- D. 学龄期
- E. 青春期

65、共性心理特征在什么时期初具有雏形 (c)。

- A. 婴儿期
- B. 幼儿期
- C. 学龄前期
- D. 学龄期
- E. 青春期

66、频繁手淫可造成 (e)。

- A. 男孩频繁遗精
- B. 女孩月经失调
- C. 失眠头晕
- D. 自责内疚
- E. 以上都是

68、女孩青春期生长突增开头的年龄 (a)。

- A.9~11 岁
- B.8~10 岁
- C.10~12 岁
- D.8~12 岁

E.9~12 岁

69、社区保健的效劳对象 (e)。

- A. 患者
- B. 老人
- C. 儿童
- D. 妇女
- E. 社区成员

70、青春晚期的特征不包括 (b)。

- A. 性腺根本发育成熟
- B. 消灭月经初潮或首次遗精
- C. 其次性征发育成熟
- D. 骨骼根本愈合
- E. 体格发育渐渐停顿

71、经期卫生不包括 (c)。

- A. 清洗外阴
- B. 精神开心
- C. 清洁皮肤
- D. 适当参与体力劳动
- E. 以上都不是

72、下述发育年龄的工程中哪种是错误的(e)。

- A. 发育年龄是指某指标的发育平均水平为标准年龄
- B. 发育年龄包括形态年龄、性征年龄、牙齿年龄、骨骼年龄
- C. 齿龄适用于 2 岁以内婴幼儿
- D. 骨龄是机体成熟程度的标志
- E. 11 岁女童，身高年龄11岁、骨龄9岁说明发育落后

73、青春期少女月经来潮 (c)。

- A. 影响血液系统
- B. 对安康不利
- C. 是正常的生理现象
- D. 影响体格生长
- E. 影响心脏功能

74、儿童养分需求的主要特点中不包括(c)。

- A. 各种养分素需要量(以公斤体重计)高于成人
- B. 生长发育突增期对各种养分素的需求量明显增加
- C. 应以优质动物蛋白作为蛋白质主要来源
- D. 养分需求存在着明显的个体差异
- E. 年龄越小，养分缺乏病的发病率越高

75、第一次乙肝疫苗注射与其次次注射间隔时间 (a)。

- A.1 个月
- B.2 个月
- C.3 个月
- D.4 个月
- E.5 个月

76、儿童感染性疾病最常见的是(b)。

- A. 消化道感染
- B. 呼吸道感染
- C. 泌尿系感染
- D. 皮肤感染
- E. 口腔感染

77、遗精一般消灭在 (b)。

- A. 青春前期
- B. 青春期中期
- C. 青春后期
- D. 青春完毕
- E. 以上都不是

78、小儿生后体格生长最快的时期是 (a)。

- A. 婴儿期
- B. 幼儿期
- C. 学龄前期
- D. 学龄期
- E. 以上都不是

79、睾酮的生理作用不包括 (c)。

- A. 促进体内蛋白质的合成
- B. 促进骨骼、肌肉的发育及力气的增长
- C. 调整神经及心血管等系统的功能
- D. 促进官及其次性征的消灭
- E. 产生遗精

80、3岁男孩，发热、咳嗽、肺部可闻及干性啰音。对此患儿治疗原则不包括 (c)。

- A. 一般治疗
- B. 抗感染治疗
- C. 吸氧
- D. 对症治疗
- E. 一般护理

81、婴儿期易发生养分不良和发育落后，主要是由于 (e)。

- A. 生长快速
- B. 消化吸取功能不健全
- C. 生长快速，免疫力低下
- D. 免疫力低下，消化功能差
- E. 消化功能差，生长快速

82、佝偻病预防要点不应包括 (e)。

- A. 多晒太阳
- B. 提倡母乳喂养
- C. 必要时赐予药物预防

D. 准时添加辅食

E. 赐予大量维生素D 制剂

83、男女生长曲线的两次穿插现象的特征不包括(e)。

A. 在9~10岁前男孩平均身高高于女孩

B.9~10 岁女孩生长突增开头平均身超群过男孩

- C. 在曲线上9~10岁女孩身超群过男孩，形成第一次穿插
- D. 在13~15岁男孩平均身超群过女孩，消灭其次次穿插
- E. 两次穿插之间女孩平均身高比男孩高3cm

84、男，生后5天，开头吸奶时口张不大，后发生痉挛，痉挛缓解后神志糊涂。抗生素首选 (b)。

- A. 红霉素
- B. 青霉素
- C. 卡那霉素
- D. 庆大霉素
- E. 先锋霉素

85、青春期开头体格生长的特点是 (d)。

- A. 生长速度无变化
- B. 速度减慢
- C. 速度略加快
- D. 速度明显加快
- E. 速度明显减慢

86、哪一组织器官的生长模式不属于一般型 (c)。

- A. 心脏
- B. 肺
- C. 胸
- D. 胰腺
- E. 肠

87、关键生长期主要指 (e)。

- A. 在该期内某系统生长发育的快
- B. 在该期内某系统机能已经完善
- C. 在该期内某系统组织分化完善
- D. 在该期内某系统发育达成熟水平
- E. 在该期内正常发育受到干扰，常造成永久性缺陷或功能障碍

88、生长发育的长期变化的主要缘由是 (a)。

- A. 养分的全面改善
- B. 居住条件的改善
- C. 交通工具的改善，汽车增加
- D. 全球气候变暖
- E. 体育活动的广泛开展

89、肺活量的生长发育特征中不包括 (e)。

- A. 随年龄增长而增大
- B. 男、女孩差异明显
- C. 男孩肺活量始终大于女孩
- D. 随年龄增长男、女肺活量差异加大

E. 青春期开头女孩肺活量突增后超过男孩

90、幼儿用于生长发育的热能需要占总热能的比例大致应为 (a)。

A.15%~16%

B.13%~15%

C.12%~14%

D.11%~13%

E.10%~12%

91、对婴幼儿腹泻的预防不应包括 (d)。

- A. 合理喂养
- B. 留意饮食、饮水卫生
- C. 加强环境卫生
- D. 预防接种
- E. 准时隔离患儿

92、男，生后5天，开头吸奶时口张不大，后发生痉挛，痉挛缓解后神志糊涂。最可能的诊断是 (c)。

- A. 低钙惊厥
- B. 婴儿痉挛症
- C. 生儿破伤风
- D. 脑发育不全
- E. 以上都不是

93、对烫烧伤的小儿以下哪项措施是错误的 (b)。

- A. 快速将小儿抢离火场或脱离烫伤源
- B. 快速将烫烧伤部位衣服撕掉
- C. 用清洁被单包裹
- D. 较小灼伤可清洗创面
- E. 以上都不是

94、1岁男孩，多汗，睡眠担忧，体检：方颅，鸡胸P，化验：血钙稍低，血磷明显降低，碱性磷酸酶明显增高，X 线检查：干骺端呈毛刷样，并有杯口状转变。诊断应为(b)。

- A. 佝偻病活动早期
- B. 佝偻病活动期
- C. 佝偻病恢复期
- D. 佝偻病后遗症期
- E. 佝偻病初期

95、在对小儿进展预防接种前，需核对的内容最主要的是 (d)。

- A. 小儿年龄
- B. 小儿性别
- C. 疾病史
- D. 疫苗名称
- E. 疫苗剂型

96、青春期哪一系统发育速度突然加快 (e)。

- A. 神经系统
- B. 淋巴系统
- C. 循环系统
- D. 呼吸系统
- E. 生殖系统

97、婴幼儿腹泻最常见的病原是(a)。

- A. 病毒
- B. 细菌
- C. 寄生虫

- D. 真菌
- E. 以上都不是

98、以下心理测定方法中哪一种属筛查性测验(a)。

- A. 绘人测验
- B. 贝利婴幼儿发育量表
- C. 发育量表
- D. 比奈量表
- E. 韦氏智力气表

99、感染性疾病最易发生的时期是(c)。

- A. 婴儿期
- B. 幼儿期
- C. 婴幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

100、幼儿期易发生意外损害主要是由于(c)。

- A. 运动功能发育较快
- B. 语言功能发育较快
- C. 缺乏自我保护力量
- D. 平衡功能较差
- E. 以上都不是

101、弱视分类包括(e)。

- A. 斜视性
- B. 形觉剥夺性
- C. 屈光不正性
- D. 屈光参差性
- E. 以上都是

102、对异物吸入的小儿应(e)。

- A. 嘱小儿蹦跳，将异物咳出
- B. 刺激咽喉部，使异物咳出
- C. 观看，必要时送往医院
- D. 拍背，帮助孩子咳出异物
- E. 马上送往医院

103、生后6天女孩，早产2周，双侧大腿外侧皮肤发硬，肿胀，压久轻度凹陷，经医生检查诊断为生儿硬肿症。预防要点最主要的是(a)。

- A. 预防早产，留意保暖
- B. 预防早产，留意喂养
- C. 防止感染，留意护理
- D. 避开窒息，防止感染
- E. 保持较高的室内温度

104、儿童的年龄性别身凹凸于同年龄，同性别参照人群值的正常范围，属于养分不良的哪

一型 (b)。

A. 体重低下

B. 生长缓慢

C. 消瘦

- D. 养分性水肿
- E. 以上都不是

105、神经系统中发育成熟最早，最快达成人水平的器官是 (d)。

- A. 视觉器官
- B. 听觉器官
- C. 大脑
- D. 脊髓
- E. 小脑

106、其次性征发育是在哪一期 (e)。

- A. 婴儿期
- B. 幼儿期
- C. 学龄前期
- D. 学龄期
- E. 青春期

107、青春期前女性雌激素大局部产生于 (a)。

- A. 肾上腺皮质
- B. 卵巢
- C. 甲状腺
- D. 胸腺
- E. 胰岛

108、诊断缺铁性贫血必需有以下哪一条 (b)。

- A. 有明确的缺铁病因
- B. 小细胞低色素性贫血，MCHC ↓ MCV ↓
- C. 血清铁降低
- D. 红细胞游离原卟啉个
- E. 铁治疗有效

109、指出以下描述月经初潮论点中哪项是错误的 (a)。

- A. 月经初潮是性成熟的标志
- B. 说明卵巢中的发育，有周期性排卵功能
- C. 具有生育的可能性
- D. 是女性青春发育中的重要标志
- E. 初潮时生殖器官还未完全成熟

110、缺铁性贫血最早发生转变的生化指标是 (d)。

- A. 血清铁
- B. 总铁结合力
- C. 细胞游离原卟啉
- D. 血清铁蛋白
- E. 血红蛋白

111、屈光不正的预防原则 (e)。

- A. 培育儿童留意阅读、书写卫生
- B. 留意户外活动
- C. 坚持做眼保健操
- D. 改善学习环境
- E. 以上都是

112、影响青春期发育的主要激素中话 (a b)。

- A. 生长激素
- B. 胰岛素
- C. 催乳素
- D. 甲状腺素
- E. 睾酮

113、掌握婴幼儿腹泻感染选用的抗生素不包括 (e)。

- A. 复方诺明
- B. 庆大霉素
- C. 氨苄青霉素
- D. 黄连素
- E. 青霉素

114、3岁男孩，发热、咳嗽、肺部可闻及干性啰音。假设病情进一步进展，最可能会消灭哪组表现 (d)。

- A. 咳嗽猛烈，发热不退
- B. 伴呕吐、腹痛
- C. 头痛、嗜睡
- D. 气促、闻及湿性啰音
- E. 呼吸困难，面色青紫

115、个体儿童生长监测的目的是为了 (d)。

- A. 对小儿进展体格测量
- B. 完善治理档案
- C. 使父母了解孩子的状况 2
- D. 早期觉察生长特别，准时干预
- E. 评价保健措施

116、以下方法中哪一种可检测小儿智力水平 (b)。

- A. 贝利婴幼儿发育量表
- B. 图片词汇测验
- C. 发育量表
- D. 斯坦福--比奈量表
- E. 韦氏学前儿童智力气表

117、婴幼儿腹泻治疗除抗感染外，最主要的是 (c)。

- A. 饮食疗法
- B. 支持疗法
- C. 补液疗法
- D. 对症治疗
- E. 使用止泻剂

118、对于腹泻患儿，最主要的检查应是(d)。

- A. 有无心衰表现
- B. 有无神经系统特别
- C. 有无肾衰表现
- D. 有无脱水表现
- E. 有无发热

119、生后6天女孩，早产2周，双侧大腿外侧皮肤发硬，肿胀，压久轻度凹陷，经医生检

查诊断为生儿硬肿症。此患儿体温是 (c)。 医学全在线 A. 正 常

B. 上 升

C. 降低

D. 严峻时可升到38℃以上

E. 以上都不是

120、预防蛔虫病最重要的措施是 (c)。

A. 改善环境卫生

B. 灭蝇、灭虫

C. 搞好个人饮食卫生

D. 搞好粪便的征处理

E. 不生吃瓜果、蔬菜

121、丹佛发育筛查测验适用于 (a)。

A. 2 个月~6岁的婴幼儿

B. 3 岁以下小儿

C. 3~6 岁小儿

D. 1 岁以下婴儿

E. 2 岁以下小儿

122、女孩背肌力、握力突增开头的年龄是 (c)。

A. 7~12 岁

B. 8~10 岁

C. 10~11 岁

D. 11~12 岁

E. 12~13 岁

123、男性青春期发育的第一个信号是 (a)。

A. 睾丸增大

B. 身高生长突增的开头

C. 增 长 D. 消灭

E. 喉结消灭

124、给生儿清洗皮肤主要目的是 (d)。

A. 清洁

B. 舒 适

C. 防止出疹

D. 防止感染

E. 防止小儿搔抓

125、小儿缺铁病因最主要的是 (a)。

A. 铁供给缺乏

B. 吸 取 障 碍

C. 需要增加

D. 慢性失血

E. 慢性疾病

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/518015126112006137>