专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024福建省连江县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题完整版附答案【基础题】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.流行性出血性结膜炎可选用

A：0.1%羟苄唑滴眼剂

B：0.1%碘苷滴眼剂

C：2%色甘酸钠滴眼剂

D：四环素眼膏

答案：A

2.用白色处方纸书写，右上角无标注的是

A：第二类精神药品处方

B：急诊处方

C：第一类精神药品处方

D：普通处方

答案：D

3.滴眼液或眼膏开瓶后保质期一般为

A：10~20天

B：25~35天

C：28~40天

D：28~30天

答案：D

4.发热在应用解热镇痛药时，老年人的用药时间间隔是

A：3～6小时

B：3～5小时

C：2～5小时

D：4～6小时

答案：D

5.癫痫全面性发作首选

A：佐匹克隆

B：布桂嗪

C：丙戊酸钠

D：多奈哌齐

答案：C

6.血尿酸检查超过正常值

A：诊断心肌梗死

B：诊断急性胰腺炎

C：诊断痛风

D：诊断消化性溃疡

答案：C

7.针对严重单纯急性酒精中毒同时出现烦躁不安症状的患者，下列救治措施中错误的是（）

A：静脉滴注维生素C注射液1g

B：静脉注射50%葡萄糖注射液100ml和胰岛素20U

C：肌内注射维生素B1、维生素B6和烟酸各100mg

D：静脉注射纳洛酮0.4mg和吗啡20mg

答案：D

8.敏感化作用的配伍用药是

A: 青蒿素与乙胺嘧啶或磺胺多辛联用延缓抗药性

B: 应用地高辛与氢氯噻嗪

C: 阿托品联用吗啡镇痛

D: 纳洛酮用于解救吗啡中毒

答案：B

9.以下有关项目中，可作为药品外观质量检查的主要内容是

A: 药品中包装

B: 药品性状

C: 药品外包装

D: 药品内包装

答案：B

10.患者，男，27岁，电话咨询药师朋友，告知目前正在欧洲旅游，从昨夜开始出现腹泻，呈水样便，起夜4次，希望药师给出建议。有关药师给予该患者的建议，错误的是

A: 口服左氧氟沙星胶囊0.2gtid

B: 口服补液盐ORSIII50ml/kg，4～6h内服完

C: 口服双八面体蒙脱石散，与抗菌药物同服

D: 避免高脂肪、高糖饮食

答案：C

11.（2018年真题）下列药物中,可以增加缺血性脑卒中发作风险的药物是（）

A: 阿司匹林

B: 银杏叶片

C: 口服避孕药

D: 叶酸

答案：C

12.属于核苷酸类HIV逆转录酶抑制剂的是（）

A: 洛匹那韦

B: 阿巴卡韦

C: 奈韦拉平

D: 多替拉韦

答案：B

13.患儿，男，6个月，体重9．0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有乒乓球感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

A: 维生素C

B: 维生素D3

C: 维生素B12

D: 维生素A

答案：B

14.阿昔洛韦用于肾功能不全患者应（）

A: 避免应用

B: 减量使用

C: 在危及生命时方可使用

D: 加量使用

答案：B

15.（2016年真题）用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是（）。

A: 氟马西尼
B: 纳洛酮
C: 青霉胺
D: 乙酰胺
答案：C

16.（2017年真题）根据《中国成人超重和肥胖预防控制指南》体重指数（BMI）判断为肥胖的标准是（）
A: BMI＜21.5
B: BMI≤18.5
C: BMI≥24.0
D: BMI≥28.0
答案：D

17.下列对于轻度沙眼疗效最好的药物是
A: 红霉素
B: 硫酸锌
C: 磺胺醋酰钠
D: 酞丁安
答案：D

18.V级临床研究的结论或任何级别多个研究有矛盾或不确定的结论属于循证医学证据推荐强度的
A: B级
B: E级
C: D级
D: C级
答案：C

19.需要用10%酒精或植物油冲洗是清除（）
A: 眼内进入固体腐蚀性颗粒
B: 皮肤污染酚类毒物
C: 眼内污染毒物
D: 毛发被毒物污染
答案：B

20.关于治疗肺炎的用药注意事项，叙述不正确的是
A: 肺炎的抗菌药物治疗应尽早进行，一旦怀疑为肺炎即应马上给予首剂抗菌药物
B: 抗菌药物治疗后48～72h应对病情进行评价
C: 肺炎的药物治疗应避免使用抗生素，其他药物无效时再考虑使用抗生素
D: 体温正常48～72h，无肺炎任何一项临床不稳定征象可停用抗菌药物
答案：C

21.患者，女，22岁，因淋雨导致发热、咳痰伴胸痛1天就诊。查体：体温38.6℃，脉搏90次／分，呼吸24次／分，血压正常；双肺布满湿啰音。实验室检查：WBC11×109／L，胸片显示斑片状浸润性阴影。既往无过敏史。选用有效抗生素治疗后2天，体温恢复正常，咳痰减少。
A: 鲍曼不动杆菌
B: 副流感病毒
C: 铜绿假单胞菌
D: 肺炎链球菌
答案：D

22.（2019年真题）患者，女，45岁，常有上腹部饱胀、恶心食欲不振等消化不良症状。宜选用的药物

A：蒙脱石散

B：干酵母片

C：奥美拉唑肠溶胶囊

D：复方阿嗪米特肠溶片

答案：B

23.药师应对处方进行审核、依照处方准确、快速地调配

A：有效性

B：经济性

C：技术性

D：法律性

答案：C

24.（2019年真题）患者，女，27岁，孕32周，因尿急、尿痛就诊，诊断为尿路感染，应选用的药物是

A：复方磺胺甲噁唑片

B：阿莫西林胶囊

C：阿奇霉素片

D：莫西沙星片

答案：B

25.急迫性尿失禁首选哪种药物

A：非甾体抗炎药

B：钙通道阻滞剂

C：抗胆碱能药物

D: 选择性a1受体激动药

答案：C

26.铁剂联用维生素C，可增加疗效的机制是（）

A: 作用于不同的靶点

B: 协同作用

C: 延缓或降低抗药性

D: 促进机体的吸收利用

答案：D

27.患尿路感染，在无病原学结果前，一般首选（）

A: 针对革兰阳性球菌有效的抗菌药物

B: 针对革兰阳性杆菌有效的抗菌药物

C: 针对革兰阴性球菌有效的抗菌药物

D: 针对革兰阴性杆菌有效的抗菌药物

答案：D

28.对流行性结膜炎可选用

A: 杆菌肽眼膏

B: 硫酸锌滴眼液

C: 碘苷滴眼液

D: 1%泼尼松龙滴眼液

答案：C

29.巨幼细胞贫血患者出现周围神经系统症状应首选

A: 苯妥英钠注射液

B: 硫酸亚铁片

C: 维生素B12

D: 叶酸片

答案：C

30.下列哪个不是慢性咽炎的临床表现

A: 常伴有发热

B: 咽喉部不适、干燥、发痒、疼痛或有异物感

C: 清晨起床后常会吐出微量的稀痰，伴有声嘶

D: 有刺激性咳嗽

答案：A

31.痛风急性发作期选用的抗痛风药物

A: 秋水仙碱

B: 别嘌醇

C: 阿司匹林

D: 呋塞米

答案：A

32.（2019年真题）患者，男，34岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物昏迷入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制，可选用的解救药物是

A: 亚甲蓝

B: 二巯丙醇

C: 纳洛酮

D: 维生素K

答案：C

33.氢氯噻嗪与地高辛同服出现心律失常的机制是

A: 协同作用

B: 敏感化作用
C: 减少不良反应
D: 竞争性拮抗作用
答案：B

34.患者，女性，32岁，咳嗽、有脓性痰，痰液色黄或黄白相间，右侧胸痛，吸气时明显。体检：体型胖，神志清，急性病容，无口唇发绀，呼吸急促，体温39.3°C，心率100次/分，肺部可闻及湿性啰音，WBC14×109/L，对青霉素类药物过敏。临床诊断为社区获得性肺炎。
A: 红霉素
B: 左氧氟沙星
C: 链霉素
D: 布地奈德
答案：B

35.阿片类中毒出现呼吸抑制时给予
A: 苯妥英钠
B: 去甲肾上腺素
C: 有机硫类
D: 阿托品
答案：D

36.护士用药咨询的内容是
A: 抗菌药物的合理使用
B: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品
C: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法
D: 减肥、补钙、补充营养素
答案：B

37.药师审核后判定为合理处方，应该

A：拒绝调配处方

B：调配处方并发药

C：拒绝调配处方，联系处方医师并进行干预

D：拒绝调配处方，并依照有关规定报告

答案：B

38.下列治疗蛔虫病的药物中，以对肠道寄生虫具有神经一肌肉阻滞作用而显效的是

A：阿苯达唑

B：甲苯咪唑

C：噻嘧啶

D：噻苯达唑

答案：C

39.对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

A：戊酸雌二醇／雌二醇-醋酸环丙孕酮片

B：雌二醇／雌二醇-地屈孕酮片

C：雌二醇一屈螺酮片

D：17β 一雌二醇

答案：A

40.（2018年真题）患儿，男，50天，体重5kg,时值夏季，体温37.9℃，出现烦躁，哭闹不安，无其他症状。其家人到药店询购买退热药，药师应推荐（）

A：对乙酰基酚片（500mg）1/10片，溶于少量温开水服用

B：阿司匹林泡腾片（500mg）1/10片，溶于少量温开水服用

C：阿苯片，半片，研碎后溶于少量温开水服务

D：减少衣被，可物理降温或必要时就诊

答案：D

41.儿童使用后可造成软骨病，18岁以下儿童禁止使用的药物是

A：阿米卡星

B：莫西沙星

C：阿奇霉素

D：头孢哌酮

答案：B

42.肾上腺皮质激素可能引起

A：尿葡萄糖

B：尿胆红素

C：尿液隐血

D：尿蛋白

答案：A

43.用于口服后吸收迅速而完全，解热镇痛作用明显的非处方药是

A：布洛芬

B：阿司匹林

C：对乙酰氨基酚

D：谷维素

答案：B

44.尤以铅中毒疗效好的解毒剂是

A：依地酸钙钠

B: 青霉胺

C: 二巯丙醇

D: 二巯丁二钠

答案：A

45.格列齐特片的适宜服药时间是

A: 餐后

B: 清晨

C: 餐前

D: 餐中

答案：C

46.归属于上市前药品临床评价阶段的临床试验分为

A: 4期

B: 3期

C: 1期

D: 2期

答案：B

47.患者，女，44岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断服用沙丁胺醇4mgtid治疗，没有规律用药治疗。因秋冬季交替出现明显喘憋，话不成句，被紧急送医预防治疗。

A: 沙丁胺醇气雾剂

B: 布地奈德气雾剂

C: 沙丁胺醇片

D: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂

答案：D

48.与贝母枇杷糖浆不宜联用的药物是

A：氨茶碱

B：氢氧化铝

C：苯巴比妥

D：乳酶生

答案：A

49.患者，女，61岁，有痛风病史。间歇期服用别嘌醇、丙磺舒治疗时，又出现一次急性发作，此时应采取的治疗方法是

A：加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服对乙酰氨基酚

B：停用别嘌醇、丙磺舒，改用秋水仙碱

C：减少别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱

D：加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱

答案：C

50.患者,男,80岁,因发热、咳嗽、咳痰2天就诊诊断为社区获得性肺炎,给予左氧氟沙星、甘草合剂、氨溴索、对乙酰氨基酚、维生素C等治疗。患者用药3天后出现失眠、烦躁不安等症状最可能引起该症状的药物是()

A：氨溴索

B：左氧氟沙星

C：甘草合剂

D：对乙酰氨基酚

答案：B

51.为保证用药安全，一些药物应用前需要实施皮肤敏感试验。一些权威性较高的二次文献中记载的需进行皮肤敏感试验的药品是

A：青霉素钠注射剂

B: 鱼肝油酸钠注射剂

C: 链霉素注射剂

D: 玻璃酸酶注射剂

答案：D

52.静滴、静注等给药途径的不良反应发生率较高，说明药源性疾病的药物因素是

A: 不良生活方式

B: 生理因素

C: 药物制剂因素

D: 药物的使用

答案：D

53.（2018年真题）患者,女,50岁,近期出现失眠、潮热、出汗、烦躁等不适症状,临床诊断为围绝经期综合征,在使用激素替代治疗之前应先排除禁忌证。下列情况不属于禁忌证但属于慎用的是（）

A: 乳腺增生

B: 严重肝功能障碍

C: 近6月内患活动性静脉栓塞性疾病

D: 耳硬化症

答案：A

54.下述药物中，具有肝药酶抑制作用的是

A: 卡马西平

B: 利托那韦

C: 西咪替丁

D: 苯巴比妥

答案：C

55.患者，男，58岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀40mgqd。患者用药期间应定期监测的生化指标是

A：RBC

B：ALT

C：BUN

D：Hb

答案：B

56.可提示隐性黄疸或亚临床性黄疸的是

A：STB>342μmol/L

B：STB34.2μmol/L～171μmol/L

C：STB17.1μmol/L～34.2μmol/L

D：STB17.1μmol/L～171μmol/L

答案：C

57.抗真菌药

A：血红蛋白量增多

B：血小板减少

C：嗜酸性粒细胞减少

D：中性粒细胞减少

答案：D

58.抗肿瘤药物中，属于拓扑异构酶抑制剂的是

A：顺铂

B：甲氨蝶呤

C：依托泊苷

D：放线菌素

答案：C

59.欲了解更多的药品不良反应信息，可优先查阅的文献是

A：《梅氏药物副作用》

B：《中国国家处方集》

C：《新编药物学》

D：《中华人民共和国药典》

答案：A

60.吸附力强、可阻止毒物吸收的是

A：药用炭混悬液

B：1%氯化钠溶液

C：淀粉溶液

D：1%硫酸镁溶液

答案：A

61.长期服用可导致或加重胃溃疡的药物是

A：质子泵抑制剂

B：米索前列醇

C：NSAID

D：抗酸剂

答案：C

62.苯丙胺中毒出现

A：明显的锥体外系症状

B：谵妄、躁狂、幻觉

C：肌肉震颤、抽搐

D：心血管毒性

答案：B

63.患者，男，54岁，患冠心病3年，长期服用阿司匹林，近几天肢体多处出现瘀斑，故前来就诊。实验室检查：PLT70×109／L。下列药物中不会引起血小板减少的药物是

A：磺胺异噁唑

B：阿司匹林

C：氯霉素

D：碳酸锂

答案：D

64.主要用于降低三酰甘油的药物是

A：贝丁酸类

B：考来烯胺

C：他汀类

D：普罗布考

答案：A

65.患儿，男，5个月，体重9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有“乒乓球”感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

A：6000IU

B：10000IU

C：4000IU

D：400IU

答案：C

66.患者，男，60岁，呈典型的“面具脸”、“慌张步态”及“小字征”表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病药物是（）

A: 司来吉兰

B: 多奈哌齐

C: 左旋多巴

D: 普拉克索

答案：C

67.患者，女，实验室检查：血红蛋白95g/L，临床诊断为缺铁性贫血，处方口服硫酸亚铁片，下列向患者交代的用药注意事项，错误的是

A: 不宜同时进食牛奶和蛋类

B: 宜同时补充维生素C

C: 不宜与钙剂同时服用

D: 宜空腹服用

答案：D

68.稳定型心绞痛发作应首选的药物是

A: 美托洛尔

B: 氨氯地平

C: 硝酸甘油

D: 单硝酸异山梨酯

答案：C

69.（2015年真题）患者，男，64岁，身高174cm，体重92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A: 曲美他嗪片
B: 特拉唑嗪片
C: 阿司匹林肠溶片
D: 氨氯地平片
答案：B

70.（2019年真题）患者，女，35岁，复杂部分发作性癫痫病史12年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6个月前因癫痫控制不佳提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊，患者同时患有2型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素B。
A: 共济失调
B: 视物模糊
C: 低血糖
D: 牙龈增生
答案：C

71.癫痫持续状态的好发年龄段为（）
A: 65岁以上
B: 55岁以上
C: 6岁以内
D: 1岁以内及65岁以上
答案：D

72.可引起嗜酸性粒细胞增多的药物是()
A: 头孢氨苄
B: 氯苯那敏

C：碳酸氢钠

D：坎地沙坦

答案：A

73.（2019年真题）用药时宜限制饮水的药物是

A：环丙沙星片

B：苯溴马隆胶囊

C：利托那韦片

D：胶体果胶铋胶囊

答案：D

74.关于现代药学的发展,临床药学阶段的特征是

A：药师的工作局限于药品调配、供应等基础工作

B：以促进合理用药为主

C：以药品工业化生产为中心

D：以新药研制为中心

答案：B

75.头孢克洛片及胶囊应存放于()。

A：低温库

B：凉暗库

C：常温库

D：专用仓库

答案：B

76.（2019年真题）患者，男，64岁，因右足肿痛就诊。查体:右脚第一趾关节红肿，触痛明显。化验结果:血尿酸588.1μmol/L。诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病，目前正服用氢氯噻嗪片25mgqd、美托洛尔缓释47.5mgqd、赖诺普利片20mgqd、辛伐他汀片10mgqd、阿司匹林肠溶片100mgqd。

A: 贝诺酯片

B: 双氯芬酸钠片

C: 阿司匹林片（300mg）

D: 别嘌醇片

答案：B

77.有关血红蛋白的叙述正确的是

A: 血红蛋白承担着机体向器官组织运输氧气和运出二氧化碳的功能

B: 缺铁性贫血时红细胞计数的减少程度较血红蛋白的减少程度明显

C: 血红蛋白常被称为"血色素"，是组成血液的主要成分

D: 血红蛋白减少是诊断贫血的重要指标，并能确定贫血的类型

答案：A

78.患者向药师咨询停用口服避孕药后多久可备孕。下列答复中正确的是()

A: 复方短效口服避孕药停药后即可备孕

B: 长效避孕药停药后即可备孕

C: 复方短效口服避孕药停药3个月后方可备孕

D: 复方短效口服避孕药停药6个月后方可备孕

答案：A

79.根据老年人的特殊生理变化，80岁以上老年人用药的初始剂量应为成人剂量的

A：1／5～1／4

B：45355

C：45293

D: 45387

答案：C

80.提供的信息是否涉及某个厂家或某个品牌的药品，是衡量互联网信息的

A: 合理性

B: 归因性

C: 权威性

D: 新颖性

答案：A

81.可引起A/G比值＜1的是

A: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害

B: 各种原因脱水所致的血液浓缩

C: 摄入不足、消化不良时

D: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等

答案：A

82.惠者女56岁,诊断为高血压伴快速型心律失常,首选的药物是（）

A: 螺内酯

B: 氯沙坦

C: 美托洛尔

D: 维拉帕米

答案：C

83.再生障碍性贫血、巨幼细胞性贫血可导致

A: 血红蛋白生成减少

B: 红细胞丢失过多

C：红细胞生成减少

D：红细胞生成过多

答案：C

84.为提高叶酸治疗营养性巨幼细胞贫血的疗效，应同时用

A：维生素D

B：维生素K

C：维生素B1

D：维生素B12

答案：D

85.下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是：B

A：血小板计数<100×10

B：甘油果糖脱水作用较甘露醇强且快

C：急性脑梗死的溶栓治疗时间窗是48小时

D：应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林

答案：A

86.癫痫患者禁用下列哪种抗焦虑药物（）

A：曲唑酮

B：舍曲林

C：氯米帕明

D：艾司唑仑

答案：C

87.过敏性肠炎、慢性菌痢等可引起

A：稀糊状或水样粪便

B: 黏液便

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/518040005042007022