

2024 福建省三元区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题审定版

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2021 年真题）静脉滴速过快，易致红人综合征的药物是（）

- A: 万古霉素
- B: 美罗培南
- C: 克拉霉素
- D: 头孢哌酮

答案：A

2. （2017 年真题）患者女 45 岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片 20mgbid，甲硝唑片 0.4gbid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 0.6gbid。

- A: 维生素 A 缺乏
- B: 维生素 B2 缺乏
- C: 维生素 B6 缺乏
- D: 维生素 B12 缺乏

答案：D

3. （2015 年真题）氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是（）。

- A: 肝病
- B: 胃肠类疾病
- C: 血液系统疾病
- D: 神经系统疾病

答案：D

4. 归属专业学术机构网站的是

A: www.merck.com

B: www.ashp.org

C: www.google.com

D: www.cmt.tom.cn

答案：B

5. 解热镇痛药用于退热属于对症治疗，因此两次用药的间隔时间应该是

A: 2~4 小时

B: 5~7 小时

C: 4~6 小时

D: 3~5 小时

答案：C

6. 哮喘急性发作的首选药为

A: 沙丁胺醇?

B: 布地奈德?

C: 沙美特罗?

D: 福莫特罗?

答案：A

7. 以下药物中，可影响华法林吸收的为（）

A: 奥美拉唑

B: 胶体果胶铋

C: 硫糖铝

D: 雷尼替丁

答案：C

8. 阿片类中毒出现呼吸抑制时给予

A: 苯妥英钠

B: 有机硫类

C: 去甲肾上腺素

D: 阿托品

答案：D

9. 抗结核治疗中，细胞内外均有杀菌作用，且单一杀菌力最强的药物是

A: 吡嗪酰胺

B: 利福平

C: 乙胺丁醇

D: 异烟肼

答案：D

10. 冠心病二级预防的“ABCDE”方案中，“A”是指

A: 控制饮食和糖尿病

B: 健康教育和运动

C: β 受体阻断剂和血压控制

D: 阿司匹林和 ACEI

答案：D

11. (2017 年真题) 患者, 男, 72 岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入沙丁胺醇气雾剂 100 μ g prn 吸入, 氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg prn 舌下含服治疗。

- A: 硝酸甘油剂量不足
- B: 布地奈德剂量太大
- C: 沙丁胺醇的不良反应
- D: 氨氯地平的不良反应

答案: C

12. 降低痰液黏度, 使痰液易于排出的药品是

- A: 可待因
- B: 右美沙芬
- C: 苯丙哌林
- D: 羧甲司坦

答案: D

13. 口服氯化铵用于解救

- A: 苯丙胺中毒
- B: 硝西泮中毒
- C: 氯丙嗪中毒
- D: 瘦肉精中毒

答案: A

14. 患者, 男, 60 岁, 因上臂出现湿疹到药店购药, 药师应推荐的药品是 ()

- A: 利巴韦林软膏
- B: 氢化可的松软膏
- C: 10%樟脑软膏

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

D: 特比萘芬乳膏

答案：B

15. (肾功能不全者的药物排泄机制)有机酸排出减少

- A: 肾小球滤过减少
- B: 肾血流量减少
- C: 肾小管分泌减少
- D: 肾小管重吸收增加

答案：C

16. 《中国药典》规定"凉暗处"除避光外，温度不应超过（）

- A: 15℃
- B: 4℃
- C: 10℃
- D: 20℃

答案：D

17. (消化性溃疡并发症)，穿孔

- A: 规律性上腹痛
- B: 突发上腹剧痛，继而至全腹
- C: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物
- D: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血

答案：B

18. 具有临床耐受性良好、无戒断效应特点的治疗失眠症药物为（）

- A: 艾司唑仑
- B: 小剂量米氮平
- C: 阿戈美拉汀
- D: 低剂量的多塞平

答案：D

19. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 肺动脉栓塞
- B: 慢性支气管炎急性发作
- C: 急性左心衰竭
- D: 支气管哮喘

答案：C

20. 属于广谱抗病毒药，具有抗病毒、调节免疫和抗增生作用的是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 奥司他韦
- C: 干扰素
- D: 更昔洛韦

答案：C

21. 能促使体格强壮、肌肉发达、增强爆发力，并缩短体力恢复时间的兴奋剂

- A: 蛋白同化激素
- B: 精神刺激剂
- C: β -受体阻断剂
- D: 利尿剂

答案：B

22. (2016 年真题) 患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院、目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是 ()。

- A: 利伐沙班
- B: 阿司匹林
- C: 氯吡格雷
- D: 肝素

答案：B

23. 对某些患者应教会正确量取内服液体制剂，是针对

- A: 交代用药途径及用药方法
- B: 交代药品贮存条件与方法
- C: 交代药物的用量
- D: 交代用药注意事项

答案：C

24. 下列分析方法中，不属于药物经济学评价方法的是()

- A: 最小成本分析法
- B: 成本-效用分析法
- C: 成本-效应分析法
- D: 成本-效益分析法

答案：C

25. 阿尔兹海默病患者应该避免使用的药物是（）

- A: 卡巴拉汀
- B: 美金刚
- C: 颠茄
- D: 多奈哌齐

答案：C

26. 适用于早期、轻度症状者

- A: 左旋多巴
- B: 恩托卡朋
- C: 苯海索
- D: 司来吉兰

答案：D

27. 患者，女，62 岁，医师处方如下：姓名：×××性别：女年龄：62 岁
临床诊断：2 型糖尿病、高血压 2 级、高脂血症、PCI 术后

- A: 二甲双胍
- B: 氯吡格雷
- C: 阿卡波糖
- D: 氨氯地平

答案：D

28. 不能用热水送服的药物是

- A: 镇静催眠药
- B: 磺胺类药物
- C: 胃黏膜保护剂
- D: 微生态制剂

答案：D

29. 将药物治疗的成本与所产生的效益归化为以货币为单位的数字，用以评估药物治疗方案的经济性是指

- A: 成本-效用分析
- B: 最小成本分析
- C: 最大效果分析
- D: 成本-效益分析

答案：D

30. (2016 年真题) 从事驾车、高空作业的患者不宜服用的药物是 ()

。

- A: 布洛芬
- B: 伪麻黄碱
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 氯苯那敏

答案: D

31. (新生儿期的药动学特点) 肾脏的有效循环血量与肾小球滤过率较成人低 30%~40%可影响

- A: 药物中毒
- B: 药物吸收
- C: 药物代谢
- D: 药物排泄

答案: D

32. 成人空腹血糖正常参考区间是

- A: 3.9~6.1mmol / L
- B: 3.5~6.1mmol / L
- C: 3.7~6.1mmol / L
- D: 3.3~5.5mmol / L

答案: A

33. 伴发 OAB 的前列腺增生症治疗药物索利那新的不良反应是

- A: 心动过缓
- B: 体位性低血压
- C: 性功能障碍

D: 加重闭角型青光眼

答案：D

34. 目前唯一被批准用于治疗类风湿关节炎的 IL-1 拮抗剂类生物制剂为

A: 阿达木单抗

B: 阿巴西普

C: 英夫利昔单抗

D: 阿那白滞素

答案：D

35. 通过与肠黏膜接触，刺激肠壁的感受神经末梢，引起肠反射性蠕动增强而排出柔软成形粪便的药物是

A: 比沙可啶

B: 硫酸镁

C: 甘油栓

D: 乳果糖

答案：A

36. 药名容易混淆的药物识别,安定 / 地西洋

A: 抗心绞痛药

B: 抗高血压药

C: 抗焦虑药

D: 退热药

答案：C

37. 有较强刺激性，服药时不可嚼碎的泻药是

A: 比沙可啶

B: 聚乙二醇 4000

C: 硫酸镁

D: 双歧杆菌

答案：A

38. 根据体重计算婴幼儿的剂量时注

A: 可适当调整

B: 选用剂量的上限

C: 应减少用量

D: 不可调整

答案：B

39. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第一跖趾关节剧痛。3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

A: 阿司匹林

B: 布洛芬

C: 尼美舒利

D: 对乙酰氨基酚

答案：D

40. 三环类抗抑郁药中毒解救和治疗时，不宜使用的是

A: 吐根糖浆

B: 毒扁豆碱

C: 高锰酸钾溶液

D: 普鲁卡因胺

答案：B

41. 重症、急救治疗时，要求药物迅速起效，最不适宜选用的给药途径是

- A: 喷雾给药
- B: 腔道给药
- C: 吸入给药
- D: 静脉滴注

答案：B

42. 患者，男性，35 岁，因间断上腹痛 5 年、加重 1 周来诊。患者自 5 年前开始间断出现上腹胀痛，空腹时明显，进食后可自行缓解，有时夜间痛醒，无放射痛，有暖气和反酸，常因进食不当或生气时诱发，每年冬春季节易发病。1 周前因吃凉白薯后病情再犯，腹痛较前加重。发病以来无恶心、呕吐和呕血，饮食尚可，二便正常，无便血和黑便，体重无明显变化。既往体健，无肝肾疾病及胆囊炎和胆石症病史，无手术、外伤和药物过敏史，无烟酒嗜好。

- A: 化学物质的刺激
- B: 吸烟
- C: 遗传因素
- D: 胃窦部幽门螺杆菌感染

答案：D

43. 新生儿白细胞计数的正常范围值

- A: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- B: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9/L$
- C: $(10.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- D: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

答案：D

44. 可引起血清尿素氮降低的是

- A: 胃溃疡
- B: 严重肝病
- C: 肾衰竭
- D: 急性胰腺炎

答案：B

45. (2018 年真题) 患者, 男, 53 岁, 因纳差、食欲减退来药店购药, 药师应推荐的药品是 ()

- A: 酵母片
- B: 甲氧氯普胺片
- C: 乳酶生片
- D: 多潘立酮片

答案：A

46. 非甾体抗炎药的不良反应, 引起荨麻疹、瘙痒、剥脱性皮炎等皮肤损害

- A: 保泰松
- B: 塞来昔布
- C: 美洛昔康
- D: 布洛芬

答案：C

47. 患者, 男, 52 岁, 诊断为高血压、冠心病。医师处方:

- A: 氟伐他汀
- B: 左旋氨氯地平
- C: 比索洛尔
- D: 雷米普利

答案：A

48.（2019 年真题）下列药物中，适宜在餐前服用的是

- A: 头孢辛酯片
- B: 双氯芬酸钠片
- C: 莫沙必利片
- D: 伊马替尼片

答案：C

49.（2018 年真题）可以引起视物模糊、红绿色视野受限的药物是（）

- A: 异烟肼
- B: 对氨基水杨酸钠
- C: 乙胺丁醇
- D: 链霉素

答案：C

50. 贮存温度在 2℃ 以上时，温度越低，对多数药品保管越有利。降钙素鼻喷雾剂说明书标明“冷处”贮存，其贮存条件是指

- A: 温度不超过 20℃
- B: 温度在 2℃～10℃ 之间
- C: 避光，温度不超过 -5℃
- D: 温度在 10℃～30℃ 之间

答案：B

51. 患者，女，33 岁，因“近期阴道分泌物增多，呈鱼腥臭味，并伴有外阴瘙痒，且性交后症状加重”前来就诊。

- A: 克林霉素 300mg，bid，po
- B: 甲硝唑 400mg，bid，po

C: 替硝唑，2g，qd，po

D: 氟康唑 150mg，顿服

答案：B

52. 使肿瘤所在局部药物浓度达到相当高的水平而全身药物浓度很低。

A: 膀胱灌注

B: 动脉注射

C: 腹腔注射

D: 腔内注射

答案：C

53. 结核杆菌生命力顽强，且易产生耐药性，临床采用标准化学治疗方案

A: 3HRZE / 9HR

B: 2HRZE / 4HR

C: 2HRE / 7HR

D: 2HRZE / 4HR

答案：D

54. 肾功能重度损害时，抗菌药每日剂量分别减低至正常剂量的

A: 1/10~1/15

B: 1/2~1/5

C: 2/3~1/2

D: 1/5~1/10

答案：D

55. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 硝普钠
- B: 毛花苷丙
- C: 卡托普利
- D: 阿替洛尔

答案：B

56. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 μmol/L (正常值: 男性 180~440 μmol/L)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 低血糖
- B: 腹胀
- C: ALT 升高
- D: 心律失常

答案：B

57. 适用于静脉推注的抗肿瘤药为

- A: 氮芥
- B: 阿糖胞苷
- C: 塞替派
- D: 甲氨蝶呤

答案：A

58. 无症状菌尿

- A: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同
- B: 宜选用毒性小的抗菌药物
- C: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再出现菌尿，菌种与上次相同
- D: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次，尿细菌数 $>10^5$ cfu/ml

答案：D

59. 应在睡前服用，疗效较好的是

- A: 噻氯匹定
- B: 沙丁醇胺
- C: 硫酸镁
- D: 维生素 B1

答案：B

60. 餐后 1~2h 服用的是

- A: 质子泵抑制剂
- B: 抗酸药
- C: 解痉、镇痛药
- D: 胃黏膜保护剂

答案：B

61. (2018 年真题) 患者, 女, 68 岁, 体重 45kg, 因发热、咳嗽咳痰入院治疗, 临床诊断为社区获得性肺炎。化验结果: 白细胞计数 $11.76 \times 10^9/L$, 肌酐清除率 18ml/min。该患者使用下列抗菌药物治疗时不需要减量的是 ()

- A: 莫西沙星
- B: 头孢噻肟钠
- C: 阿莫西林
- D: 左氧氟沙星

答案: A

62. 应告知患者用药后宜多饮水的药物是

- A: 苦味健胃药
- B: 止咳糖浆
- C: 氨茶碱
- D: 甘草合剂

答案: C

63. 患者术后, 给予肠外营养液 10%GS500ml、50%GS250ml、20%脂肪乳 250ml、8.5%复方氨基酸 750ml、水溶性维生素 10ml、脂溶性维生素 10ml、微量元素 10ml、10%氯化钠注射液 40ml、10%氯化钾注射液 30ml

- A: 1150kcal
- B: 450kcal
- C: 200kcal
- D: 700kcal

答案: B

64. 尿隐血检查阳性的病人中, 最可能导致尿血红蛋白阳性的药物是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

A: 巴比妥类

B: 酒精中毒

C: 海洛因

D: 阿司匹林

答案: D

65. (2019 年真题) 患儿，男，1 岁 4 个月，家长为预防幼儿缺钙，每日给患儿服用维生素 D5000IU，3 个月后患儿出现乏力、恶心、呕吐、食欲不振等症状，化验结果：血钙 18mg/dl，25-OH-D3 水平 632ng/ml。诊断为维生素 D 中毒，下列处理措施错误的是

A: 增加日晒

B: 停用钙剂

C: 停用维生素 D 及强化食品

D: 停饮牛奶

答案: A

66. 下列药物中，即使肝功能不全的病人也可使用原剂量的是

A: 洋地黄毒苷

B: 青霉素

C: 氯霉素

D: 苯妥英钠

答案: B

67. 过敏性肠炎、慢性菌痢等可引起

A: 黏液便

B: 冻状便

C: 稀糊状或水样粪便

D: 米泔水样便

答案: B

68. 适用于各型癫痫的药物

- A: 丙戊酸钠
- B: 拉莫三嗪
- C: 卡马西平
- D: 苯妥英钠

答案：A

69. 孕妇、绝经后女性及骨质疏松患者可适当选服

- A: 复合营养素
- B: 钙剂
- C: 复合维生素
- D: 中草药制剂

答案：B

70. 可引起尿液碱度增高的疾病是

- A: 呼吸性酸中毒
- B: 代谢性碱中毒
- C: 糖尿病
- D: 痛风

答案：B

71. 抗菌谱广，属于碳青霉烯类的药物是

- A: 氨曲南
- B: 头孢哌酮
- C: 亚胺培南
- D: 克拉维酸

答案：C

72. 适宜于餐中给药的药物是

- A: 缬沙坦
- B: 二甲双胍
- C: 复方铝酸铋
- D: 法莫替丁

答案：B

73. 治疗幽门螺杆菌感染的一线方案，其典型组方中不包括的药物是

- A: 克拉霉素
- B: 西咪替丁
- C: 甲硝唑
- D: 胶体果胶铋

答案：B

74. 消化性溃疡抗 Hp 的四联疗法正确的是

- A: 雷尼替丁+阿莫西林+胶体次碳酸铋+甲硝唑
- B: 兰索拉唑+阿莫西林+克拉霉素+胶体次碳酸铋
- C: 奥美拉唑+甲硝唑+阿奇霉素+胶体次碳酸铋
- D: 西咪替丁+胶体次碳酸铋+哌仑西平+替硝唑

答案：B

75. 患者，女，65 岁，今日因天气骤变出现急性支气管炎症状，出现喘息困难，无其他基础疾病，可给予的治疗药物是

- A: 喷托维林 25mg tid
- B: 沙丁胺醇气雾剂 1~2 喷 q6h
- C: 马来酸氯苯那敏片 4~8mg tid
- D: N-乙酰半胱氨酸片 600mg bid

答案：B

76. 属于 β 受体激动剂的是

- A: 异丙托溴铵
- B: 乙酰胆碱
- C: 美托洛尔
- D: 福莫特罗

答案：D

77. 非甾体抗炎药引起的典型药源性肌病是

- A: 神经系统疾病
- B: 血液系统疾病
- C: 胃肠道疾病
- D: 肌病

答案：C

78. 关于处方书写要求，错误的是

- A: 处方上需要标明临床诊断结果
- B: 化学药、中成药可以开在一张处方纸上，但每种药品必须分行书写，药品总数不得超过 5 种
- C: 一张处方最多可以为 2 名患者开具药品
- D: 处方如果修改，需要在修改处有医师签名和日期

答案：C

79. 不能用于治疗缺铁性贫血的药物是

- A: 去铁胺
- B: 硫酸亚铁
- C: 乳酸亚铁
- D: 葡萄糖酸亚铁

答案：A

80. 非杓型高血压患者的合理给药时间是

- A: 睡前给药
- B: 一日三餐后给药
- C: 清晨给药
- D: 早、晚给药

答案：A

81. 患者，男，68 岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天”入院。查体：体温 39.1℃，血压 138 / 80mmHg，心率 102 次 / 分，呼吸 32 次 / 分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 x 线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A: 阿莫西林-克拉维酸钾+阿奇霉素
- B: 左氧氟沙星+阿奇霉素
- C: 阿奇霉素
- D: 多西环素

答案：A

82. 对中枢神经有抑制作用的是

- A: 酒
- B: 食醋
- C: 脂肪
- D: 食盐

答案：A

83. (2021 年真题) 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/mr，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 吗啡控释片
- B: 颠茄片
- C: 双氯芬酸钠缓释片
- D: 加巴喷丁胶囊

答案：C

84. 患者，男，72 岁。诊断：高血压，心力衰竭，肋软骨炎 RX 地高辛片 0.25mg×10 片 0.125mgqd 比索洛尔片 5mg×20 片 2.5mgqd 红霉素缓释胶囊 250mg×12 粒 500mgbid 布洛芬胶囊 200mg×10 粒 200mgprn

- A: 地高辛剂量偏小
- B: 比索洛尔给药频次不合理
- C: 地高辛不宜选用
- D: 不应使用红霉素缓释胶囊

答案：D

85. 作用于 DNA 化学结构的药物

- A: 放线菌
- B: 培美曲塞
- C: 顺铂
- D: 依托泊苷

答案：C

86. 恶性肿瘤

- A: 白细胞增多

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

B: 血小板增多

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/518052013042007022>