

2024 年辽宁省银州区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题完整版 (全国使用)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 某男性，27 岁，间断上腹痛 3 年，表现为餐后痛，约 1~2h 后缓解，以冬春季多发。

- A: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂
- B: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂
- C: 法莫替丁+克拉霉素+阿莫西林+铋剂
- D: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁

答案：B

2. 由环境（灰尘、风沙、倒睫、屈光不正）刺激所致的非细菌性结膜炎可选用

- A: 杆菌肽眼膏
- B: 硫酸锌滴眼液
- C: 1%泼尼松龙滴眼液
- D: 碘苷滴眼液

答案：B

3. 对于妊娠期用药，下述治疗措施错误的是

- A: 可使用 A 级药物
- B: 能单独用药就避免联合用药
- C: 禁止在孕期给予试验性用药
- D: 可使用 D 级药物

答案：D

4. 双侧肾动脉狭窄患者禁用的抗高血压药物为()。

A: 利尿剂（噻嗪类）

B: ACEI

C: 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂

D: 利尿剂（袢利尿药）

答案：B

5. 医师书写处方时经常使用外文缩写，医师在指导用药时需要准确掌握和解释。OS. 是()

A: 右眼

B: 适量

C: 左眼

D: 立即

答案：C

6. 以下不同群中，白细胞计数正常值参考范围的数值最高的是

A: 成人男性

B: 儿童

C: 新生儿

D: 成人女性

答案：C

7. (2017 年真题) 治疗急性腹泻可选用 ()

A: 莫沙必利

B: 聚乙醇 4000

C: 双八面体蒙脱石散

D: 阿苯达唑

答案：C

8. 噻托溴铵平喘的主要机制是

A: 抑制白三烯受体

B: 拮抗 M 胆碱受体

C: 阻断腺苷受体

D: 激动肾上腺素 β_2 受体

答案：B

9. 既无兴奋、镇静作用，又无抗胆碱、抗组胺作用的药物是

A: 帕罗西汀

B: 氟伏沙明

C: 阿米替林

D: 丙咪嗪

答案：B

10. 药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是()

A: 双歧三联活菌胶囊

B: 硫普罗宁片

C: 西地碘片

D: 乳酶生片

答案：A

11. FBG 较高者宜选用作用快且强的药物是

A: 格列喹酮

B: 格列吡嗪控释片

C: 甲苯磺丁脲

D: 格列本脲

答案：D

12. 相互作用使药物吸收增加的联合用药是

A: 硝苯地平联用普萘洛尔

B: 铁剂联用维生素

C: 阿托品联用普萘洛尔

D: 阿托品联用吗啡

答案：B

13. 记录患者用药问题、药学干预内容、药学监护计划的技能是

A: 自主学习能力

B: 药历书写技能

C: 沟通技能

D: 药品警戒技能

答案：B

14. (2018 年真题) 干眼症可选用 ()

A: 色甘酸钠滴眼液

B: 七叶洋地黄双苷滴眼液

C: 氧氟沙星滴眼液

D: 玻璃酸钠滴眼液

答案：D

15. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g / L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 300 $\mu g / L$ 。

A: 硫酸亚铁口服

B: 输血

C: 维生素 B12 肌内注射

D: 右旋糖酐铁肌注

答案：A

16. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 $Hb < 90g/L$ 。

A: 氨基酸

B: 维生素

C: 奥美拉唑

D: 维生素 B1

答案：C

17. 清晨始升高，午后达高峰，凌晨跌低谷，是指

A: 肝脏合成胆固醇的规律

B: 糖皮质激素的分泌规律

C: 胰岛 B 细胞的分泌规律

D: 胃酸的分泌规律

答案：C

18. 胶囊壳染料可引起固定性药疹

A: 生活和饮食习惯

B: 药物的使用

C: 药物制剂因素

D: 生理因素

答案：C

19. 质子泵抑制剂

- A: 埃索美拉唑
- B: 多潘立酮
- C: 法莫替丁
- D: 铝碳酸镁

答案：A

20. 关于奥利司他说法错误的是

- A: 可干扰维生素的吸收
- B: 应在服药前 2h 补充维生素
- C: 进餐时服用
- D: 对肝脏无影响

答案：D

21. 属于医师用药咨询的是

- A: 栓剂、气雾剂的正确使用方法
- B: 抗菌药物的合理应用
- C: 减肥、补钙、补充营养素
- D: 注射剂溶媒的正确选择

答案：B

22. 用 10%氯化钠注射液 9ml 加适量注射用水稀释成 90ml 的溶液，其氯化钠浓度是（）

- A: 0.01
- B: 0.009
- C: 0.1
- D: 0.1

答案：A

23. 杨某，男性，25 岁，间断上腹痛 2 年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

- A: PPI+克拉霉素+呋喃唑酮？
- B: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂？
- C: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂？
- D: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁？

答案：C

24. 可用 1%硫酸铜溶液催吐用于解救的中毒是

- A: 三唑仑中毒
- B: 磷化锌中毒
- C: 丙戊酸钠中毒
- D: 丙米嗪中毒

答案：B

25. 鲜血便主要见于（）

- A: 小肠炎症
- B: 霍乱
- C: 下消化道出血
- D: 慢性菌痢

答案：C

26. 药物治疗结核病的原则及早用药以利于杀灭结核菌株

- A: 适量
- B: 联合
- C: 早期
- D: 规律

答案：C

27. 药师在调剂工作中，首先要审核处方的

- A: 合法性
- B: 完整性
- C: 用药适宜性
- D: 规范性

答案：A

28. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 $\mu\text{mol/L}$ (正常值: 男性 180~440 $\mu\text{mol/L}$)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: ALT 升高
- B: 腹胀
- C: 低血糖
- D: 心律失常

答案：B

29. 以下血浆脂质水平检查结果中，不能判断为高脂血症的是

- A: 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-ch) 高于同年龄正常值
- B: 总胆固醇(Tc) 高于同年龄正常值
- C: 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-ch) 高于同年龄正常值
- D: 三酰甘油(TG) 高于同年龄正常值

答案：D

30. (2015 年真题) 氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是 ()。

- A: 肝病
- B: 胃肠类疾病
- C: 血液系统疾病
- D: 神经系统疾病

答案: D

31. 脂质体药物属于

- A: D 级高危药品
- B: B 级高危药品
- C: C 级高危药品
- D: E 级高危药品

答案: C

32. 用于疼痛治疗、耐受性最好的非甾体抗炎药是

- A: 塞来昔布
- B: 阿司匹林
- C: 布洛芬
- D: 贝诺酯

答案: C

33. 患者，男，38 岁，身高 175cm，体重 70kg。3 日前自觉全身肌肉酸痛、头疼，轻微咳嗽，自服抗感冒药物效果不佳，近 1 日觉畏寒，发热，体温 37.7℃，遂来本院就诊。检查结果：患者神清，查咽喉部红肿，扁桃腺 (-)，双肺呼吸音清，心脏听诊无异常，腹检无异常。血象 WBC 正常，其他正常。诊断为：上呼吸道感染（感冒）。

A: 流感疫苗是最有效预防流感及其并发症的手段，需每五年接种一次

- B: 感冒一般为自限性，病程多在 1 周左右
- C: 密切接触会有传播普通感冒的可能
- D: 手卫生是预防上呼吸道感染的最有效的方式

答案：A

34. 药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

- A: 引用参考文献的质量
- B: 出版或更新的频率
- C: 索引的完备程度
- D: 检索路径及费用

答案：A

35. （2015 年真题）易经乳汁分泌的药物的特征是（ ）。

- A: 分子量大
- B: 蛋白结合率高
- C: 脂溶性大
- D: 弱酸性

答案：C

36. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 $Hb < 90g / L$ 。

- A: 缺铁性贫血
- B: 溶血性贫血
- C: 白血病
- D: 巨幼细胞性贫血

答案：A

37. 癌症患者化疗出现腹泻合并中性粒细胞核左移时，需给予的预防性治疗药物是

- A: 洛哌丁胺
- B: 广谱抗生素
- C: 药用炭
- D: 莫沙必利

答案：B

38. 关于非甾体抗炎药的叙述正确是

- A: 发热时可首选非甾体抗炎药
- B: 出现疼痛症状可首选非甾体抗炎药
- C: 使用非甾体抗炎药引起的肾功能不全发生率高于氨基糖苷类抗生素引起的肾功能不全
- D: 非甾体抗炎药联合应用糖皮质激素类药物是造成胃肠道损害的危险因素

答案：D

39. 描述是否充分、详细、准确是评价

- A: 前言
- B: 摘要
- C: 讨论
- D: 结果

答案：D

40. 吸烟后促使儿茶酚胺释放，降低其吸收的药物是

- A: 氯丙嗪

- B: 胰岛素
- C: 西咪替丁
- D: 呋塞米

答案：B

41. 有时需要利用所提供的参考文献去验证信息的正确性是指

- A: 三级信息源
- B: 四级信息源
- C: 一级信息源
- D: 二级信息源

答案：A

42. 急性脑血管病中病死率最高的疾病为

- A: 短暂性脑缺血发作
- B: 原发性蛛网膜下腔出血
- C: 脑梗死
- D: 脑出血

答案：D

43. (2015 年真题) 静脉注射两性霉素 B 的适宜溶媒是 ()。

- A: 0.9 氯化钠注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 5%葡萄糖注射液
- D: 复方氯化钠注射液

答案：C

44. 胰岛素的给药时间适宜餐前 5~10 分钟给药的胰岛素制剂种类是

- A: 门冬胰岛素

- B: 赖脯胰岛素
- C: 精蛋白锌胰岛素
- D: 普通胰岛素

答案：A

45. 双膦酸盐属于

- A: 促进骨矿化剂
- B: 骨吸收抑制剂
- C: 激素替代剂
- D: 骨形成刺激剂

答案：B

46. (2019 年真题) 夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是

- A: 含漱剂
- B: 滴眼剂
- C: 直肠栓剂
- D: 软膏剂

答案：C

47. (2019 年真题) 患者，男，60 岁，诊断为高血压伴高尿酸血症，首选的药物是

- A: 美托洛尔
- B: 维拉帕米
- C: 螺内酯
- D: 氯沙坦

答案：D

48. 以下有关肌酸激酶检查值升高的临床意义中，最正确的是

- A: 诊断恶性贫血
- B: 诊断痛风
- C: 诊断急慢性白血病
- D: 诊断心肌梗死

答案：D

49. 患者，女，62 岁，医师处方如下：患者：××X，性别：女，年龄：62 岁。临床诊断：2 型糖尿病高血压 2 级高脂血症 PCI 术后。

- A: 二甲双胍
- B: 阿卡波糖
- C: 氯吡格雷
- D: 氨氯地平

答案：D

50. 患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断服用沙丁胺醇 4mg tid 治疗，没有规律用药治疗。因秋冬季交替出现明显喘憋，话不成句，被紧急送医预防治疗。

- A: 沙丁胺醇气雾剂
- B: 布地奈德气雾剂
- C: 沙丁胺醇片
- D: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂

答案：A

51. 某男性患者，57 岁，既往高血压病史 10 年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清。查体：BP220 / 120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激(+)，左侧肢体不活动，左侧巴彬斯基征阳性。

- A: 止血

B: 降压

C: 脱水

D: 扩容

答案：C

52. 长期应用糖皮质激素后的实验室检查结果常会出现（）

A: 淋巴细胞增多

B: 淋巴细胞减少

C: 中性粒细胞减少

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：B

53. 下面有关帕金森病治疗的说法错误的是

A: 康复与心理治疗是帕金森病治疗中重要的辅助措施

B: 司来吉兰适用于帕金森病早期阶段，胃溃疡患者慎用；其可以与 5-羟色胺再摄取抑制剂一起提高疗效

C: 药物治疗在病程晚期多数疗效不佳

D: 药物治疗的目标是延缓疾病进展，尽可能延长症状控制的年限

答案：B

54. (抗癫痫药物的选择)，癫痫全身强直阵挛发作的一线用药是

A: 乙琥胺

B: 卡马西平

C: 加巴喷丁

D: 扑米酮

答案：B

55. 可引起体位性低血压，服用后，患者由卧而坐起或由坐而站起等从低位向高位的转换动作时均应缓慢，动作不能突然的药物是

- A: 特拉唑嗪
- B: 左氧氟沙星
- C: 头孢哌酮
- D: 卡马西平

答案：A

56. 某女性，45 岁，肥胖多年，自觉口渴、消瘦 5 个月，尿糖阳性，空腹血糖 8.9mmol/L，餐后两小时血糖 15.1mmol/L

- A: 1 型糖尿病
- B: 肥胖症
- C: 甲状腺功能亢进症
- D: 2 型糖尿病

答案：D

57. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 卡马西平
- B: 奥美拉唑
- C: 氯化钾
- D: 红霉素

答案：D

58. 患者，女，77 岁，53kg，既往糖尿病病史 10 年，因“反复尿路感染 4 个月，加重 3 天”来院就诊。4 个月前，患者无明显诱因出现排尿疼痛，间断低热，体温波动在 37.2℃~37.5℃之间，自服左氧氟沙星片 0.29bid 治疗 5 天后好转停药。其间多次反复发作，自服左氧氟沙星片好转。3 天前，患者再次出现尿路刺激症状，自行口服左氧氟沙星 0.29bid 治疗后无明显好转。门诊查尿常规示：白细胞（+++），白细胞计数 463.2 / g1，细菌计数 1262.1 / μ l。查体：T37.9℃P86 次 / 分 R21 次 / 分 BP132 / 77mmHg，心、肺听诊无异常，腹平软，无压痛及反跳痛，左肾区叩击痛（+），双下肢无水肿。辅助检查：血常规：白细胞计数 $12.35 \times 10^9 / L$ 、中性粒细胞百分比 86.5%，CRP69.5mg / L。血生化：AST15U / L，ALT11U / L，ALB43.29 / L，Scr669 μ mol / L。尿培养及药敏试验结果：大肠埃希菌（ESBLs+），细菌计数 $>10^5$ cfu / ml；对左氧氟沙星耐药，对哌拉西林一他唑巴坦、亚胺培南敏感。

- A: 4.5gqd
- B: 1.5gqd
- C: 1.5gq8h
- D: 4.5gq8h

答案：D

59. 患者，男，43 岁，患有家族性痛风，既往有磺胺类药物过敏史为防止尿酸结晶和痛风结石的产生，药师应建议患者在服用上述药物时加服

- A: 丙磺舒
- B: 碳酸氢钠
- C: 别嘌醇
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

60. 尤以铅中毒疗效好的解毒剂是

A: 二巯丙醇

B: 二巯丁二钠

C: 依地酸钙钠

D: 青霉胺

答案: C

61. 一般来讲，细菌药敏试验的报告不包括

A: 临床信息（送检科室、临床诊断、标本类型等）

B: 药敏试验（细菌名称、药物通用名、试验方法以及敏感结果判定）

C: 涂片、培养鉴定

D: 临床治疗方案

答案: D

62. 患者女,55 岁,因持续性中上腹疼痛 2 日入院。查体:体温 38℃中上及左上腹有压痛。化验结果:白细胞计数 $18.7 \times 10^9/L$,血清淀粉酶 1993U/L,血脂肪酶 6116U/L。其诊断可考虑是（）

A: 急性胃炎

B: 急性阑尾炎

C: 急性胆囊炎

D: 急性胰腺炎

答案: D

63. 可用于香豆素类杀鼠药中毒药物是

A: 维生素 K1

B: 碘解磷定

C: 亚硝酸钠

D: 乙酰胺

答案: A

64. 患者，男，36 岁。临床诊断痛风性关节炎急性发作期。症见左侧踝关节红肿，剧烈疼痛。为控制炎症，治疗首选药是

- A: 非布司他
- B: 布洛芬
- C: 尼美舒利
- D: 秋水仙碱

答案：D

65. 患者，女，75 岁，近来因家庭变故出现焦虑相关的精神和躯体症状，入睡困难，多梦易惊醒，诊断为焦虑症、核查其用药记录，患者在服用氨氯地平、阿托伐他汀钙。

- A: 心悸、震颤
- B: 极度烦躁不安的自伤和伤人行为
- C: 可致宿醉现象，容易跌倒
- D: 体重增加

答案：C

66. 促动力药

- A: 铝碳酸镁
- B: 埃索美拉唑
- C: 多潘立酮
- D: 法莫替丁

答案：C

67. 对有过敏倾向和特异质以及有 ADR 家族史的患者，最重要的是

- A: 了解患者及家族的过敏史
- B: 注意 ADR 症状，尤其是迟发反应
- C: 注意定期监测器官功能

D: 注意特殊人群用药

答案：A

68. 核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂（）

A: PIs

B: NRTIs

C: NNRTIs

D: FIs

答案：B

69. 穿孔（消化性溃疡并发症）

A: 规律性上腹痛

B: 突发上腹剧痛，继而至全腹

C: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血

D: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物

答案：B

70. 吩噻嗪类抗精神病药中毒癫痫发作时给予（）

A: 有机硫类

B: 去甲肾上腺素

C: 阿托品

D: 苯妥英钠

答案：D

71. 头痛伴恶心且一侧瞳孔改变，提示可能有

A: 动脉瘤

B: 脑肿瘤

C: 脑膜炎

D: 脑血管意外

答案：A

72. 以健康受试者进行初步的临床药理学及人体安全性评价是指

A: 临床预试验

B: II 期临床试验

C: I 期临床试验

D: III 期临床试验

答案：C

73. 服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

A: 酒

B: 浓茶

C: 咖啡

D: 烟

答案：A

74. 急性细菌性扁桃体炎患者常表现为()

A: 中性粒细胞增多

B: 血红蛋白减少

C: 红细胞增多

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：A

75. 影响核酸合成的药物是

A: 放线菌

B: 培美曲塞

C: 依托泊苷

D: 顺铂

答案: B

76. 对肠道寄生虫具有神经肌肉阻滞作用，蛔虫产生痉挛性麻痹作用的是

A: 甲苯咪唑

B: 枸橼酸哌嗪

C: 噻嘧啶

D: 阿苯达唑

答案: C

77. 适用于有完整子宫，仍希望有月经样出血的妇女

A: 雌孕激素连续联合用药

B: 单纯雌激素补充治疗

C: 雌孕激素序贯用药

D: 单纯孕激素补充治疗

答案: C

78. 患者，男，40 岁，因肺结核使用抗结核药后，肌肉痉挛，四肢感觉异常，导致这种症状的药物是

A: 异烟肼

B: 利福平

C: 乙胺丁醇

D: 吡嗪酰胺

答案: A

79. 放射性静脉造影剂属于

A: B 级高危药品

B: C 级高危药品

C: E 级高危药品

D: D 级高危药品

答案: A

80. 患者，女，45 岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的 NSAID 是

A: 吲哚美辛

B: 塞来昔布

C: 双氯芬酸

D: 布洛芬

答案: B

81. 对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

A: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片

B: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片

C: 雌二醇一屈螺酮片

D: 17 β -雌二醇

答案: D

82. 为氧化剂，不能用于乐果中毒的洗胃液是

A: 3%鞣酸溶液

B: 活性炭混悬液

C: 1: 5000 高锰酸钾

D: 淀粉溶液

答案: C

83. 阿片类中毒出现呼吸抑制时给予

- A: 阿托品
- B: 有机硫类
- C: 间羟胺
- D: 地西泮

答案：A

84. （2018 年真题）患者，男，53 岁，因纳差、食欲减退来药店购药，药师应推荐的药品是（）

- A: 甲氧氯普胺片
- B: 多潘立酮片
- C: 酵母片
- D: 乳酶生片

答案：C

85. 心力衰竭抗高血压药物的禁忌证

- A: 依那普利
- B: 氢氯噻嗪
- C: 美托洛尔
- D: 维拉帕米

答案：D

86. 患者，男，34 岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物而致昏迷，送入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制。可选用的解救药物是

- A: 亚甲蓝
- B: 二巯丙醇
- C: 纳洛酮

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 维生素 K

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/518056022115007022>