# 北京住院医师儿内科Ⅰ阶段《儿童保健找答案》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 | 判断题 | 计算题 | 附加题 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | |

| 评卷人 | 得分 |
|---|---|
| | |

1、单项选择题：营养不良诊断标准中体重应小于（　）A.中位数

B.中位数减一个标准差

C.中位数减两个标准差

D.均数

E.第 10 百分位

2、单项选择题：5～6 个月小儿可添加的辅食为（　）A.稀粥、蛋黄、碎肉

B.维生素 AD 制剂、豆制品

C.馒头片、熟土豆、水果汁

D.米汤、鱼肉汤、豆腐

E.烂面条、带馅食品、碎菜

3、单项选择题：小儿 5 个月，烦躁不安，多汗，后枕部脱发有”乒乓头”。诊断及治疗为（　）A.佝偻病初期，维生素 D0.5 万～1 万 IU／d

B.佝偻病激期，维生素 D500～1000IU／d

C.佝偻病恢复期，维生素 D400～800IU／d

D.佝偻病初期，维生素 D1 万～2 万 IU／d

E.佝偻病激期，维生素 D0.5 万～1 万 IU／d

4、单项选择题：营养不良患儿皮下脂肪消失的顺序是（　）A.面颊胸背腹部臀部四肢

B.胸背腹部臀部四肢面颊

C.腹部胸背臀部四肢面颊

D.臀部四肢面颊胸背腹部

E.腹部胸背四肢面颊臀部

5、单项选择题：营养不良的并发症，不包括（　）A.营养性缺铁性贫血

B.感染性疾病

C.维生素缺乏症

D.脑发育不全

E.自发性低血糖

6、单项选择题：维生素 D 缺乏性手足搐搦症与婴儿痉挛症的主要鉴别是（　）。A.发病年龄在 1 年以内

B.突然四肢抽动

C.伴有意识障碍

D.脑电图有高幅异常节律

E.发作后神志清楚

7、单项选择题：1岁小儿的动作能，不可能的是（　）A.会爬

B.会拍手

C.回自己坐起来

D.会骑三轮车

E.会弯腰拾东西

8、单项选择题：牛乳成分与母乳成分相比较，哪项是不正确的（　）A.蛋白质含量多，且以酪蛋白为主

B.含饱和脂肪酸较多

C.乳糖含量低于母乳

D.牛奶矿物质盐类较少

E.铁含量少，吸收率低

9、单项选择题：人乳是喂哺婴儿合适的食物，哪点是错误的（　）A.钙磷比例适当，利于吸收

B.含脂肪酶较多

C.酪蛋白多，乳块少

D.含较多的乳铁蛋白

E.蛋白质、脂肪、糖比例适当

10、单项选择题：患儿囟门未闭，身材矮小，骨骼痿软，行走无力。主要是由于（　）。A.元气的功能减弱

B.宗气的功能减弱

C.肺气的功能减弱

D.卫气的功能减弱

E.营气的功能减弱

11、单项选择题：新生儿，保健重点应放在（　）A.生后第一周

B.生后第二周

C.生后第三周

D.生后第四周

E.生后28天

12、单项选择题：羊乳喂养的唯一缺点是（　）A.羊乳中蛋白质含量较牛乳多

B.羊乳中脂肪多且脂肪球少

C.羊乳中叶酸与维生素B含量少

D.羊乳中矿物质含量与牛奶相仿

E.每100ml羊乳的热卡与牛奶相仿

13、单项选择题：哪一项不是小儿生长发育所需能量的特点（　）A.所消耗的能量多少与生长发育速度成正比

B.年幼婴儿生长快，消耗能量也多

C.青春期生长加速能量消耗也增多

D.能量供应不足可使生长发育速度减少或停滞

E.每增加1g体重约需能量100kcal

14、单项选择题：佝偻病的预防措施中，错误的是（　）A.妊娠后期孕妇加服钙剂及维生素D

B.生后3～4个月开始加服维生素D

C.维生素D预防量为400～800IU/d

D.合理喂养

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/525012014023011201