

陕西省麟游县 2023-24 年《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库大全 a4 版可打印

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 能治疗强心苷中毒引起的窦性心动过缓的是

- A: 阿托品
- B: 苯妥英钠
- C: 利血平
- D: 哌替啶

答案：A

2. 孟鲁司特的作用机制是

- A: 抑制磷酸二酯酶
- B: 阻断白三烯受体
- C: 阻断 α 受体
- D: 阻断 M 受体

答案：B

3. 长期服用糖皮质激素不会产生下列哪种副作用()

- A: 满月脸
- B: 肾上腺皮质萎缩
- C: 高血钾
- D: 溃疡或出血穿孔

答案：C

4. 属于第三代头孢菌素的药物是()。

- A: 头孢拉定
- B: 头孢吡肟
- C: 头孢氨苄
- D: 头孢哌酮

答案：D

5. 治疗普通型奈瑟球菌脑膜炎是()

- A: 磺胺嘧啶
- B: 复方磺胺甲噁唑
- C: 柳氮磺吡啶
- D: 磺胺米隆

答案：A

6. 下列哪个药物没有散瞳作用

- A: 去氧肾上腺素
- B: 毛果芸香碱
- C: 硫酸阿托品
- D: 托吡卡胺

答案：B

7. 静脉溶栓首选的药物是

- A: 达比加群酯
- B: 阿替普酶
- C: 维生素 K
- D: 重组人促红素

答案：B

8. 关于 NSAIDS 类药物所致不良反应的说法，正确的是()

- A: 选择性 COX-2 抑制剂导致胃及十二指肠溃疡和出血的风险高于非选择性 NSAIDS 类药物
- B: 非选择性 NSAIDS 类药物可导致胃及十二指肠溃疡和出血等风险
- C: 非选择性 NSAIDS 类药物导致的心血管风险高于选择性 COX-2 抑制剂
- D: NSAIDs 类药物所致的胃肠道不良反应中，以萎缩性胃炎最为常见

答案：B

9. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10/HP，红细胞 3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次/日。

- A: 修复消化道黏膜
- B: 平衡消化道正常菌群，提高免疫功能
- C: 吸附消化道内气体和各种病原体、毒素
- D: 作用于肠壁的阿片受体，抑制肠蠕动

答案：D

10. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

- A: 超过常规服药时间的 12 小时后漏服，应在下次常规服药时间服用加倍剂量
- B: 单次负荷量 300mg 开始，然后以 75mg，每日 1 次连续服药
- C: 在常规服药时间的 12 小时内漏服，应立即补服一次标准剂量，并按照常规服药时间服用下一次剂量
- D: 发现氯吡格雷抗血小板作用不足者可进行代谢酶基因型检测

答案：A

11. 发热需采用非甾体抗炎药时，应首选

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 双氯芬酸
- C: 布洛芬
- D: 阿司匹林

答案：A

12. 呋塞米可增加下列哪种药物的耳毒性

- A: 青霉素
- B: 四环素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 链霉素

答案：D

13. 患者，男性 35 岁，大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是

- A: 氯霉素
- B: 哌拉西林
- C: 庆大霉素
- D: 林可霉素

答案：B

14. 螺内酯临床常用于

- A: 尿崩症
- B: 脑水肿
- C: 急性肾功能衰竭

D: 醛固酮升高引起的水肿

答案：D

15. 患儿，女，8 岁。长期发热，伴有精神不振、头痛、胸闷气短等症状，诊断为草绿色链球菌引起的心内膜炎。

A: 头孢菌素类

B: 喹诺酮类

C: 氨基糖苷类

D: 四环素

答案：C

16. 我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗癌药

A: 奎宁

B: 氯喹

C: 伯氨喹

D: 青蒿素

答案：D

17. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38. 8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82. 1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0. 59，每 6 小时一次。

A: 热带念珠菌

B: 新型隐球菌

C: 克柔念珠菌

D: 白色念珠菌

答案：C

18. 不得与碱性物质或铁器接触的是()

A: 苯甲酸苄酯

B: 阿达帕林

C: 林旦霜

D: 克罗米通

答案：C

19. 可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是()

A: 对乙酰氨基酚

B: 阿司匹林

C: 双氯芬酸

D: 塞来昔布

答案：B

20. 葡醛内酯属于

A: 抑酸剂

B: 肝胆疾病辅助用药

C: 胃黏膜保护剂

D: 促胃肠动力药

答案：B

21. 长期大量使用林旦后可导致的不良反应是

A: 眼部水肿

B: 中枢神经系统毒性

C: 白细胞减少

D: 肝脏损害

答案：B

22. 可与 PPI、铋剂联合使用治疗幽门螺杆菌感染的药物是()

A: 替考拉宁

B: 美罗培南

C: 大观霉素

D: 克拉霉素

答案：D

23. 属于甲状腺激素类药的是

A: 甲巯咪唑

B: 生长抑素

C: 醋酸去氨加压素

D: 左甲状腺素

答案：D

24. 可降低极低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油，主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是

A: 依折麦布

B: 利血平

C: 瑞舒伐他汀

D: 阿昔莫司

答案：D

25. 红霉素的抗菌作用机制()

A: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性

B: 影响胞浆膜通透性

C: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成

D: 作用于细菌 70S 核糖体的 50S 亚基，抑制转肽酶

答案：A

26. 可抑制骨髓造血功能，或引起“灰婴综合征”，新生儿禁用的抗菌药物是

A: 酰胺醇类(氯霉素)

B: 四环素类

C: 氨基糖苷类

D: 林可霉素类

答案：A

27. 患者。女,43 岁,左乳浸润性导管癌术后放、化疗 3 年后复发左肺门、左锁骨上、左腋窝淋巴结转移现采用卡培他滨+多西他赛行复发后第一周期化疗化疗后第 2 日,患者出现重度恶心、呕吐,根据化疗药物致吐分级,宜选用的对症治疗药物是 ()

A: 昂丹司琼

B: 地塞米松

C: 奥美拉唑

D: 甲氧氯普胺

答案：A

28. 可出现酮尿或乳酸性血症的药物是

A: 二甲双胍

B: 艾塞那肽

C: 胰岛素皮下注射

D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：A

29. 吸收后代谢成活性产物而发挥抗甲型和乙型流感病毒的前体药物是
()

- A: 奥司他韦
- B: 金刚烷胺
- C: 金刚乙胺
- D: 扎那米韦

答案：A

30. 磷霉素的主要抗菌作用机制是

- A: 抗叶酸代谢
- B: 抑制细菌蛋白质合成
- C: 增加细菌胞浆膜的通透性
- D: 干扰细菌细胞壁的合成

答案：D

31. 可能导致牙龈出血的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 依诺肝素
- C: 拉西地平
- D: 普伐他汀

答案：B

32. 可用于慢性活动性肝炎的治疗 ()

- A: 复方氨基酸注射液 (18AA)
- B: 复方氨基酸注射液 (3AA)
- C: 精氨酸
- D: 赖氨酸

答案：B

33. 下列药物中，能促进食物消化的药物是

- A: 雷尼替丁
- B: 兰索拉唑
- C: 胶体果胶铋
- D: 乳酶生

答案：D

34. 关于他扎罗汀治疗银屑病的叙述，错误的是

- A: 成人每晚(睡前半小时)1 次，一般 12 周，使用面积应不超过 20% 体表面积
- B: 不用于 18 岁以下银屑病患者
- C: 育龄期妇女用药前 2 周，应进行血清或尿液妊娠试验
- D: 对严重的银屑病效果显著

答案：D

35. 红霉素的抗菌作用机制

- A: 影响胞浆膜通透性
- B: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性
- C: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性
- D: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成

答案：C

36. 属于广谱抗心律失常药物

- A: 利多卡因
- B: 胺碘酮
- C: 苯妥英钠

D: 地高辛

答案: B

37. 患者女，59 岁，既往高脂血症病史 5 年，心功能 II 级。因发现血压升高 7 天入院。入院查体血压 172/95mmHg，心率 62 次 / 分。该患者目前服用的药物除抗高血压药外有辛伐他汀。

A: 特拉唑嗪

B: 美托洛尔

C: 双氯芬酸

D: 氢氯噻嗪

答案: D

38. (2017 年真题) 可能引起高铁血红蛋白血症的抗高血压药是 ()

A: 硝普钠

B: 氨氯地平

C: 阿利克仑(阿利吉仑)

D: 卡托普利

答案: A

39. 属于 II 类抗心律失常药 ()

A: 利多卡因

B: 奎尼丁

C: 普萘洛尔

D: 胺碘酮

答案: C

40. (2021 年真题) 能抑制外周 (甲状腺外) T₄ 转化为 T₃ 的抗甲状腺药物是 ()

- A: 卡比马唑
- B: 甲巯咪唑
- C: 美托洛尔
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：D

41. 长期大剂量使用，会降低阿司匹林对心血管的保护作用，应避免合用的药物是()

- A: 格列齐特
- B: 布洛芬
- C: 阿托伐他汀
- D: 贝那普利

答案：B

42. 既能抗室性心律失常，又能抗癫痫的药物是()

- A: 苯妥英钠
- B: 利多卡因
- C: 胺碘酮
- D: 地高辛

答案：A

43. 可阻断肺-胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射，适用于各种原因引起的刺激性干咳的药物是

- A: 苯丙哌林
- B: 福尔可定
- C: 右美沙芬
- D: 喷托维林

答案：A

44. 替尼泊昔作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗()

- A: 脑瘤
- B: 慢性淋巴细胞性白血病
- C: 纤维瘤
- D: 恶性淋巴瘤

答案：A

45. 钙通道阻滞剂的药理作用不包括

- A: 主要舒张静脉，对动脉影响较小
- B: 抗动脉粥样硬化作用
- C: 抑制血小板活化
- D: 松弛支气管平滑肌

答案：A

46. 须用专属性极强的解毒剂右雷佐生保护心肌的药物是

- A: 吉非替尼
- B: 曲妥珠单抗
- C: 环磷酰胺
- D: 多柔比星

答案：D

47. 以下属于第三代头孢菌素的是

- A: 头孢噻肟
- B: 头孢噻吩
- C: 头孢羟氨苄
- D: 头孢克洛

答案：A

48. (2016 年真题) 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药是

- A: 硝酸甘油
- B: 利多卡因
- C: 索他洛尔
- D: 美托洛尔

答案: B

49. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

- A: 左氧氟沙星与茶碱相互作用较小
- B: 依诺沙星可抑制茶碱代谢
- C: 可使用头孢类口服剂型，与氨茶碱无明显药物相互作用
- D: 可使用大环内酯类药物如红霉素

答案: D

50. 对耐氯喹的恶性疟虫株，首选

- A: 咯萘啶或甲氟喹
- B: 氯喹+伯氨喹
- C: 乙胺嘧啶+磺胺药
- D: 静脉滴注奎宁

答案: A

51. 阻止胞苷酸转化为脱氧胞苷酸

- A: 氟尿嘧啶
- B: 阿糖胞苷
- C: 羟基脲
- D: 甲氨蝶呤

答案：C

52. 慢性充血性心力衰竭宜

- A: 停用洋地黄
- B: 常规剂量的洋地黄
- C: 不宜使用洋地黄
- D: 快速洋地黄化

答案：B

53. (2016 年真题) 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的药品是

- A: 哌唑嗪
- B: 坦洛新 (坦索罗辛)
- C: 依那普利
- D: 替米沙坦

答案：D

54. 属于贝丁酸类的调节血脂药是()

- A: 烟酸
- B: 辛伐他汀
- C: 非诺贝特
- D: 依折麦布

答案：C

55. 容易引起球后神经炎的抗结核药物是

- A: 异烟肼
- B: 链霉素
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

答案：C

56. 高血压伴有肾功能不全者最好选用

- A: 氢氯噻嗪
- B: 胍乙啶
- C: 卡托普利
- D: 利血平

答案：C

57. 有抗胆碱作用和阻断 α 受体的抗心律失常药是

- A: 维拉帕米
- B: 利多卡因
- C: 普萘洛尔
- D: 奎尼丁

答案：D

58. 分泌盐皮质激素的是

- A: 球状带
- B: 束状带
- C: 束状带和网织带
- D: 网状带

答案：A

59. 用量过大可引起低血糖反应的药物是

- A: 胰岛素
- B: 依替膦酸二钠
- C: 甲状腺素
- D: 糖皮质激素

答案：A

60. 雷尼替丁在使用中应注意

- A: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗
- B: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用
- C: 对食管有刺激性，需整片吞服
- D: 糖尿病患者避免使用

答案：D

61. 多柔比星与可能致肝功损害的药物配伍使用，可能()

- A: 增加心脏毒性
- B: 易产生沉淀
- C: 导致坏死性结肠炎
- D: 增加肝毒性

答案：D

62. 对短动作电位时程的心房肌无效，仅用于室性心律失常的是()

- A: 普萘洛尔
- B: 奎尼丁
- C: 维拉帕米
- D: 利卡多因

答案：D

63. 作用于芳香化酶的抗肿瘤药物是

- A: 顺铂
- B: 依托泊苷
- C: 阿那曲唑
- D: 紫杉醇

答案：C

64. 阻断 H₂ 受体的药物是

- A: 雷尼替丁
- B: 奥美拉唑
- C: 氢氧化铝
- D: 哌仑西平

答案：A

65. 对高肾素型高血压病有特效的是

- A: 卡托普利
- B: 依那普利
- C: 尼群地平
- D: 肼屈嗪

答案：A

66. 人体所需要的热量主要来源于()

- A: 氨基酸
- B: 脂肪乳
- C: 果糖
- D: 葡萄糖

答案：D

67. 干扰敏感菌有丝分裂，对深部真菌无效的药物是

- A: 两性霉素 B
- B: 灰黄霉素
- C: 伏立康唑
- D: 氟胞嘧啶

答案：B

68. 儿童使用强效激素制剂，连续使用不应超过

A: 2 周

B: 3 周

C: 4 周

D: 1 周

答案：A

69. （2016 年真题）用于治疗低磷血症的药物是

A: 葡萄糖

B: 三磷酸腺苷

C: 二磷酸果糖

D: 碳酸钙

答案：C

70. 容易引起周围神经炎的抗结核药物是

A: 乙胺丁醇

B: 利福平

C: 链霉素

D: 异烟肼

答案：D

71. 治疗敏感菌所致成人伤寒、副伤寒的应选药物是()

A: 氯霉素

B: 磺胺嘧啶

C: 呋喃妥因

D: 左氧氟沙星

答案：D

72. 可导致视神经炎的抗结核药是

- A: 利福平
- B: 乙胺丁醇
- C: 吡嗪酰胺
- D: 利福喷丁

答案：B

73. 仅在体内有抗凝血作用的药物是

- A: 肝素
- B: 华法林
- C: 尿激酶
- D: 噻氯匹定

答案：B

74. 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是()

- A: B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原
- B: 血管内皮生长因子
- C: 表皮生长因子受体
- D: 人表皮生长因子受体-2

答案：D

75. 较常引起外周神经炎的抗癌药是

- A: 巯嘌呤
- B: 甲氨蝶呤
- C: 长春新碱

D: 氟尿嘧啶

答案: C

76. (2021 年真题) 通过直接抑制凝血因子 Xa 而发挥作用的抗凝血药物 ()

A: 利伐沙班

B: 氯吡格雷

C: 依诺肝素

D: 华法林

答案: A

77. 联合应用可使部分患者血压升高的药物是

A: 磷霉素氨丁三醇

B: 利奈唑胺+哌替啶

C: 利奈唑胺+苯丙醇胺

D: 磷霉素钠+万古霉素

答案: C

78. 氟替卡松吸入气雾剂用于中度哮喘时的用法和用量为

A: 一次 250~500 μg , 一日 2 次

B: 一次 100~250 μg , 一日 2 次

C: 一次 500~1000 μg , 一日 2 次

D: 一次 50~100 μg , 一日 2 次

答案: A

79. (2015 年真题) 辅助治疗不孕症的维生素是 ()。

A: 烟酸

B: 维生素 B5

C: 维生素 E

D: 维生素 B2

答案：C

80. 干扰核酸生物合成的抗恶性肿瘤药是

A: 吉非替尼

B: 多柔比星

C: 5-氟尿嘧啶

D: 环磷酰胺

答案：C

81. 可用于治疗厌氧菌及产 ESBL 的革兰阴性杆菌感染的药物是()

A: 头孢呋辛

B: 头孢他啶

C: 头孢唑林

D: 头孢米诺

答案：D

82. 轻症糖尿病患者宜选用

A: 珠蛋白锌胰岛素

B: 正规胰岛素

C: 格列喹酮

D: 二甲双胍

答案：D

83. 维生素 K 参与下列哪些凝血因子活化()

A: II、VIII、XI、IV 因子

B: VII、XI、VII、IX 因子

C: II、VII、IX、X 因子

D: II、VII 因子

答案: C

84. 术后复发的甲状腺功能亢进症选用

A: 放射性碘

B: 大剂量碘剂

C: 格列齐特

D: 丙硫氧嘧啶

答案: A

85. 可引起脊髓水平镇痛、镇静和轻度呼吸抑制的受体是

A: $\mu 2$ 受体

B: K 受体

C: δ 受体

D: $\mu 1$ 受体

答案: B

86. 监测他汀类药所致肌毒性的临床指标是()。

A: 肌酸激酶

B: 尿淀粉酶

C: 碱性磷酸酶

D: 乳酸脱氢酶

答案: A

87. 以下药物中，不属于抗胆碱能扩瞳药的是

A: 后马托品

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 阿托品

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/525203043141012040>