

胸外科考试题

第一篇：胸外科考试题

胸外科考试题

1.开放性气胸紧急现场处理为

- A. 胸腔闭式引流术
- B. 气管内插管，呼吸机呼气末正压通气
- C. 迅速封闭胸壁创口
- D. 吸氧
- E. 剖胸探查术

本题正确答案：C

2.关于张力性气胸的叙述不正确的是

- A. 最严重的气胸类型
- B. 胸腔内压进行性增高
- C. 有纵隔扑动
- D. 有皮下气肿
- E. 急救须立即在锁骨中线第2肋间用粗针穿刺减压

本题正确答案：C

3.关于肋骨骨折的叙述不正确的是

- A. 为最多见的胸部损伤
- B. 多发生于长而固定的4~7肋
- C. 反常呼吸存在是诊断连枷胸的唯一依据
- D. 胸部X线片多能明确诊断，也是最可靠的依据
- E. 单根肋骨骨折一般需完全复位矫正

本题正确答案：E

4.关于闭合性气胸的叙述不正确的是

- A. 伤侧胸膜腔内压力升高，但仍低于大气压
- B. 进气少、肺萎陷在50%以下者，常无明显症状，可自行吸收，不需特殊治疗
- C. 大量进气则由纵隔推向健侧，患者胸闷、气促，伤侧叩诊鼓音，

听诊呼吸音减弱或消失

D. X 线检查显示伤侧肺萎陷和胸膜腔积气，纵隔向健侧移位

E. 重者需于伤侧锁骨中线第 2 肋间穿刺抽尽积气，或行胸腔闭式引流

本题正确答案：B

5. 诊断进行性血胸，错误的是

A. Hb 反复测定呈进行性下降

B. 经输血补液后，血压不回升，或暂时升高很快又降低

C. 脉快、血压持续下降

D. 胸膜腔穿刺抽不出血，但 X 线检查显示胸膜腔阴影越来越大

E. 胸膜腔闭式引流血量连续 3 小时总量达 200ml

本题正确答案：E

6. 食管癌的早期临床表现不包括

A. 食管内异物感

B. 胸骨后针刺样疼痛

C. 咽下食物时梗噎感

D. 进行性吞咽困难

E. 上腹部烧灼感

本题正确答案：D

7. 进行性血胸特点不包括

A. 反常呼吸运动

B. 胸腔内压进行性增高

C. 静脉压升高，心搏微弱、动脉压降低

D. 呼吸时的纵隔扑动

E. 胸腔引流血量 $>200\text{ml/h}$ ，连续 3h 本题正确答案：B

8. 胸外伤后，胸壁软化（浮动胸）的发病最主要的原因是？

A. 两侧肋骨骨折

B. 多根多处肋骨骨折

C. 胸骨骨折

D. 反常呼吸

E. 二氧化碳潴留 本题正确答案：B

9. 下列哪一项是诊断食管癌的最

主要依据？ A.进行性吞咽困难病史

B.食管脱落细胞检查 C.食管吞钡 X线摄片

D.胸部 X线摄片

E. CT 检查 本题正确答案：C 10.周围型肺癌的 X线表现下列哪一条是错的？ A.肺野内有类圆形阴影

B.常可见呈分叶状

C.边缘可见切迹或毛刺

D.圆形影，边缘较光滑，常可见钙化灶

E.可见到偏心性空洞 本题正确答案：D 简答

1、晚期肺癌的临床表现？

答：①压迫或侵犯膈神经，引起同侧膈肌麻痹；②压迫或侵犯喉返神经，引起声带麻痹，声音嘶哑；③压迫上腔静脉，引起上腔静脉综合征；④侵犯胸膜，可引起胸腔积液，往往为血性；大量积液，可引起气促；有时癌肿侵犯胸膜及胸壁，可引起持续性剧烈胸痛；⑤癌肿侵入纵隔，压迫食管，可引起吞咽困难；⑥上叶顶部肺癌，亦称Pancoast 肿瘤，可以侵入纵隔和压迫位于胸廓上口的器官或组织，产生剧烈胸肩痛、上肢静脉怒张、水肿、臂痛和上肢运动障碍，同侧上眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、面部无汗等颈交感神经综合征。

2、胸部损伤的急诊开胸探查手术指证？

答：①胸膜腔内进行性出血；②心脏大血管损伤；③严重肺裂伤或气管、支气管损伤；④食管破裂；⑤胸腹联合伤；⑥胸壁大块缺损；⑦胸内存留较大的异物。

第二篇：胸外科三基考试题

2011 年下半胸外科三基试题

一. 选择题（每题 2 分）

1.胸腔闭式引流后，拔出胸腔引流管时患者最好采用的呼吸方式是（）

A.平静呼吸

B.深吸气后屏气

C.深呼气后屏气

- D. 浅快呼吸
- 2.关于张力性气胸的叙述，下列哪项正确（）
- A. 伤肺严重萎缩，健肺代偿性扩张
- B. 下气肿少见
- C. 极度呼吸困难，甚至休克
- D. 伤侧胸部叩诊呈过清音
- 3.张力性气胸的急救原则中首先应是（）
- A. 输血、输液治疗休克
- B. 立即排气解除胸膜腔的高压状态
- C. 剖胸探查
- D. 气管切开
- 4.开放性气胸的急救处理首选（）
- A. 剖胸探查
- B. 清创术
- C. 迅速封闭胸壁伤口
- D. 即刻给养
- 5.肺癌手术疗效最好的类型是（）
- A. 腺癌
- B. 鳞癌
- C. 腺鳞癌
- D. 弥漫性肺泡癌
- 6.开放性气胸，需迅速封闭伤口，其最主要目的是（）
- A. 防止肺萎缩
- B. 变伤侧胸腔正压为负压
- C. 可使萎缩得肺有部分膨胀
- D. 制止纵膈摆动
- 7.开放性气胸产生纵膈摆动最主要是由于（）
- A. 呼吸和吸气时两侧胸腔压力不同
- B. 伤侧肺萎缩
- C. 健侧胸膜腔负压增加
- D. 部分空气在两侧肺内重复交换
- 8.周围型肺癌的 X 线表现错误的是（）
- A. 肺野内有类圆形阴影
- B. 常可见成分支叶状
- C. 边缘可见切迹或毛刺
- D. 圆形影，边缘光滑，常可见钙化灶

9.关于肺癌的叙述不正确的是（）

A.右肺多于左肺

B.上肺多于下肺

C.大细胞肺癌多起于支气管

D.小细胞癌多起于小支气管 10.肺癌的早期临床表现是（）

A.可无任何症状，胸部X线检查被发现

B.刺激性咳嗽、胸痛 C.咯血、咳嗽，发热

D.声音嘶哑

11.男，44岁，干咳、憋喘1个月余，拍胸片示右肺下叶不张，CT检查显示右肺门 $2.5\text{cm} \times 2.0\text{cm}$ 占位，进一步行纤维支气管镜检查，发现右下肺支气管开口处圆形肿物，活检病理证实为小细胞肺癌，进行化疗2周期后，CT复查发现肿物消失，下一步的治疗措施是（）

A.继续治疗

B.手术

C.放疗

D.无须进一步治疗 12.开放性气胸的现场急救为（）

A.给氧、补液 B.做胸穿抽气 C.清创术 D.立即用清洁物品填塞伤口 E.镇静、止痛

13.张力性气胸的主要诊断依据是（）

A.呼吸困难 B.皮下气肿 C.纵隔向健侧移位 D.肺萎缩 E.胸腔内压超过大气压 14.下列哪种情况需手术探查（）

A.损伤性窒息 B.皮下气肿 C.纵隔气肿 D.胸部爆震伤 E.胸腹联合伤 15.主动脉狭窄合并反复发作心绞痛的最好疗法为（）

A.减少体力活动及强心利尿疗法 B.进行低温下闭式主动脉瓣狭窄扩张术 C.积极准备进行主动脉瓣置换术 D.用药无控制心绞痛，3~5年后再进行手术治疗 E.体外循环下主动脉瓣成形术 16.对化疗较敏感的肺癌是（）

A.鳞状细胞癌

B.腺癌

C.小细胞癌

D.大细胞癌 17.女，60岁，因右胸剧烈疼痛，上眼睑下垂，瞳孔

缩小，经 X 线摄片见右上肺尖有一 3cmx2cm 叶状阴影，少量胸腔积液，胸腔积液涂片检到癌细胞，应首选（）

- A. 右上肺叶切除术
- B. 右上肺叶切除术+ 纵隔淋巴清扫术 C. 右侧全肺切除术
- D. 非手术的综合治疗

18. 男，60 岁，持续干咳 2 个月，偶有痰中带血丝，胸部正位 X 线片，显示右叶不张，除普通细胞学检查外，进一步检查应行（）

- A. 经皮肺穿刺活检
 - B. 纤维支气管镜检查
 - C. 射核素肺扫描检查
 - D. 剖胸肺活检
19. 下列各项不是肺癌手术治疗禁忌症的是（）

- A. 胸外淋巴结转移
- B. 对侧纵隔淋巴结转移
- C. 上腔静脉梗阻综合症
- D. 年龄大于 70 岁

20. 女，55 岁，健康查体时，胸片示左肺上叶近胸膜处直径 1.5cm 类圆形分叶状肿物，痰液涂片找到癌细胞，该患者诊断可能是（）

- A. 鳞癌
 - B. 细支气管肺泡癌
 - C. 腺癌
 - D. 大细胞癌
21. 闭式二尖瓣交界分离术最适用于（）

A. 二尖瓣合并关闭不全 B. 隔膜型二尖瓣狭窄，心功能 II ~ III 级 C. 二尖瓣狭窄合并房间隔缺损 D. 先天性二尖瓣狭窄 E. 二尖瓣狭窄扩张术后再狭窄

22. 多根多处肋骨骨折，因反常呼吸导致呼吸困难时，主要措施是（）
- A. 肋间神经阻滞及骨折处封闭
 - B. 胸腔闭式引流 C. 控制输液量
 - D. 固定胸壁消除反常呼吸
 - E. 使用呼吸兴奋剂
23. 心肌的血液来自（）

- A. 胸主动脉搏的分支

B. 主动脉弓的分支

C. 左右冠状动脉

D. 胸廓内动脉

E. 心包膈动脉 24.下列动脉中, 哪些没有分支到胃 ()

A. 腹腔干

B. 肠系膜上动脉

C. 肝固有动脉

D. 脾动脉

E. 胃十二指肠动脉 25.男 52 岁, 刺激性咳嗽、痰中带血 3 个月, 胸片见右肺上叶部分不张。多次痰查癌细胞阴性。问 1.为进一步明确诊断, 应做的检查是 () A. 再次痰查癌细胞

B. B超下肿块穿刺活检

C. 胸部CT

D. 纤维支气管镜检查 26.如支气管镜检查发现右上叶前段肿物, 活检病理为鳞癌, 全身情况良好, 无远处转移。应首先采用的治疗方法是 ()

A. 手术

B. 放射

C. 中医

D. 化疗 27.男, 58 岁, 吸烟史 30 年, 刺激性咳嗽并痰中带血 1 个月, X线检查示右肺上叶前段呈炎性征象, 痰细胞学检查找到腺癌细胞, 体检发现右锁骨上淋巴结肿大。问 1.未确定方案, 进一步的检查是 ()

A. 支气管镜检查

B. 痰细菌学检查

C. 右锁骨上淋巴结穿刺活检

D. 胸部核磁共振 28.右锁骨上穿刺活检发现癌细胞, 应采取的最佳方法是 ()

A. 手术

B. 中医

C. 免疫治疗

D. 化疗 B型题

A. 刺激性干咳

B. 血痰，轻度胸痛 C. 颈、颜面、上肢静脉怒张，皮下组织水肿

D. 关节痛，杵状指 29.肺癌的晚期症状是（）

30.肺癌的胸外非转移性表现是（）二. 问答题（每题10分）。

1.简述何为张力性气胸?及其病理生理改变。

2.简述法洛三联症的诊断?

3.简述支气管扩张手术的禁忌症?

4.试述肺癌的病理分型?

胸外 2011 年上半考试答案

选择题：1—5 BCBCA 6 —10DADDB 11 —15 B D E E C

16—20CDBDC 21 —25 B D C B D 26—30 A C D C D

简答题：医师分册 P：474

481

478

478

第三篇：外科胸外科练习题考试题

1、急性脓胸、胸穿抽取脓液 100ml，病情好转，二日后突然呼吸困难，胸透见液气胸，首选治疗措施是？ A、给氧 B、气管插管 C、再胸穿 D、胸腔闭式引流 E、胸腔开放引流

2、多根多处肋骨骨折，轻度反常呼吸运动，合并伤侧肺压缩 80%，首先采取的急救措施是？

外科学国家题库

医学考研网（ ）中国最大的医学考研专业
指导站

A、吸氧 B、人工呼吸机辅助呼吸 C、软化区加压包扎 D、胸腔穿刺、排气 E、剖胸探查

3、一男性 30 岁，右上胸被刺伤急诊入院，输血 400ml，观察 4

小时，血压由 90/60mmHg ，降至 75/45mmHg ，红细胞压积 30 %，脉搏 130 次每分，右胸后下呼吸音消失，最可能的诊断是？ A、张力性气胸 B、进行性血胸 C、胸壁软化，反常呼吸 D、创伤性休克 E、支气管近端断裂

4、女性 38 岁，农民，气短、心慌半年，查体：颈静脉怒张，心尖搏动减弱，肝肋下 4 指，腹移动性浊音 +，胸部 X 线检查示右胸少量积液，心包有钙化，病人临床诊断最可能是？

A、充血性心力衰竭 B、肝硬化腹水 C、结核性腹膜炎 D、心肌病晚期 E、慢性缩窄性心包炎

5、男性，50 岁，近 3 个月有刺激性咳嗽，有时痰中带血，不发热，胸片显示右肺上叶前段不张，最可能的诊断为？

A、肺炎 B、肺结核 C、肺门淋巴结结核并肺不张 D、中央型肺癌并发肺不张 E、肺脓肿

6、左侧胸部损伤的病人，出现极度呼吸困难，气管右移，左侧呼吸音消失及皮下气肿，首先考虑的诊断是？

A、血胸 B、血心包 C、脓胸 D、肋骨骨折 E、张力性气胸

7、胸腔闭式引流后，拔除胸腔引流管时病人最好应采用的呼吸方式是？

A、平静呼吸 B、深吸气后屏气 C、深呼气后屏气 D、浅、快呼吸 E、深慢呼吸

8、肺动脉瓣狭窄，哪一种检查手段可确诊？

A、心电图 B、拍心脏 X 线片 C、右心导管检查 D、心脏听诊 E、左心导管检查

9、胸部损伤后，随呼吸运动有气体进出胸壁伤口，下述哪项检查是最正确的？

A、进行性血胸 B、开放性气胸 C、肺泡性窒息 D、创伤性窒息 E、张力性气胸

10、二尖瓣狭窄时，最典型的体征是？ A、心尖收缩期杂音 D、心尖部舒张期杂音 B、左 2 肋间连续杂音 C、主动脉瓣区舒张期杂音 E、心尖部双期杂音

11、开放性气胸的急救处理首选？

A、剖胸探查 B、清创术 C、迅速封闭胸壁伤口 D、即刻给氧 E、气管插管辅助呼吸

12、张力性气胸，立即采取什么急救措施正确？

A、气管切开 B、加压给氧 C、输血 D、剖胸探查 E、胸穿排气

13、病人女性，30岁，一年多来心悸，乏力，腹胀，下皮浮肿，体检：颈静脉怒张，奇脉，心脏搏动增大，腹水征+，心电图示 QRS 波低电压，肘静脉压 250mmH₂O，临床诊断首选？

A、肝硬化，门脉高压征 B、风湿性心脏瓣膜病 C、心力衰竭 D、缩窄性心包炎 E、心肌病

14、肺癌病人出现声音嘶哑，声带麻痹，应首先考虑？

A、肿瘤压迫大支气管 B、有纵膈淋巴结转移 C、肿瘤压迫喉返神经 D、肿瘤侵及声带 E、肿瘤侵及喉返神经

15、患者，男性，56岁，进行性吞咽困难伴消瘦3月，现仅能进半流质，首选诊断是？ A、食管炎 B、食管良性狭窄 C、食管癌 D、食管憩室 E、贲门失弛缓症

外科学国家题库

医学考研网（<http://www.med126.com>）中国最大的医学考研专业指导站

16、一急性脓胸病人经过6周的治疗，仍有低热，消瘦，咯脓痰，应考虑以下哪一种是最常见的病因？ A、抗生素用量明显不足 B、急性脓胸处理不当 C、胸膜腔内有异物 D、支气管胸膜炎 E、肺部慢性感染

17、一男性20岁，自行车跌下右胸着地，右季肋部肿胀，皮下瘀血，局部压痛，胸廓挤压试验一，二肺呼吸音正常，应首先考虑？

A、单纯肋骨骨折 B、软组织挫伤 C、单根多处肋骨骨折 D、多根多处肋骨骨折 E、肋软骨骨折

18、风湿性心脏病二尖瓣狭窄，出现急性肺水肿的最可能的原因是？ A、肺泡与毛细血管之间组织增厚 B、肺毛细血管压力超过正常血浆渗透压（30mmHg） C、肺小动脉痉挛 D、肺血管阻力增高 E、

右心衰竭

20、病因明确的慢性缩窄性心包炎，哪一种感染最常见？

A、链球菌 B、葡萄球菌 C、结核杆菌 D、肺炎球菌 E、真菌

21、胸部开放性损伤，下述哪一项是正确的？

A、胸部创口裂开深达肋间肌 B、伤侧肋骨骨折折断端外露 C、损伤后气胸、伤侧肺压缩 60% D、伤侧皮下气肿并血气胸 E、壁层胸膜穿通，空气经伤口出入胸膜腔

22、下列各项是晚期食管癌的临床症状除了？

A、进行性吞咽困难 B、固定性胸背疼痛 C、声音嘶哑 D、恶液质

23、二尖瓣狭窄，产生肺水肿的最可能的原因是？

A、同压 B、肺毛细血管压力升高，超过血浆渗透压 C、左心室负担过重 D、肺血管痉挛、阻力增高 E、水盐潴留、多种脏器水肿

24、创伤性窒息的最典型特征是？

A、广泛皮下气肿 B、泡沫样血痰 C、头颈肩皮下出血点 D、颈静脉怒张 E、满肺充满湿性罗音

25、下列为缩窄性心包炎的临床表现除了？

A、肝大、腹水、胸水 B、颈静脉怒张 C、周围静脉压增高 D、X光片示心包钙化 E、周围血管搏动征阳性

26、下列哪条不符合慢性缩窄性心包炎的临床表现？ A、颈静脉怒张 B、肝大、腹水、下肢浮肿 D、心律正常、脉搏细速有奇脉 E、心浊音界增大

C、心搏动减弱或消失

27、食管癌的最早期症状是？

A、进行性吞咽困难 B、进食后呕吐 C、进食时胸骨后痛、烧灼感、异物感 D、体重减轻、衰弱 E、进食后呛咳

28、中度以上二尖瓣狭窄，心电图最主要表现是？

A、正常 B、电轴左偏，P波高尖 C、P波增宽且有切迹，右室大 D、P波倒置以，双室大 E、PR间期延长，左室大

29、胸外伤后，胸壁软化（浮动胸）的发病最主要的原因是？

外科学国家题库

医学考研网 () 中国最大的医学考研专业
指导站

A、两侧肋骨骨折 B、多根多处肋骨骨折 C、胸骨骨折 D、反常呼吸 E、二氧化碳潴留 30、二尖瓣狭窄下列哪一个是最常见症状?

A、二尖瓣面容 B、气促、心悸 C、咯血 D、肝大 E、下肢水肿

31、女，42岁，心慌气促2年，有风湿病史，体检发现心尖部舒张期隆隆样杂音，第一心音低闷，心脏超声学检查二尖瓣口面积是0.8cm²，两瓣叶同向运动，明显钙化，瓣下结构变形挛缩，其最佳治疗方案是? A、抗风湿治疗 B、抗结核治疗 C、闭式二尖瓣交界分离术 D、二尖瓣置换术 E、二尖瓣成形术

32、女性，30岁，活动后心悸气促5年，咯血2天，胸片示：肺纹理增粗，双侧散在粟粒形阴影，心影增大，左心房向后明显推压食管，肺动脉段隆出，最可能的诊断是?

A、支气管扩张 B、风湿性二尖瓣狭窄 C、支气管肺癌 D、支气管腺瘤 E、肺结核

33、哪种类型非常的肺癌手术疗效最好?

A、腺癌 B、鳞癌 C、小细胞癌 D、弥漫性肺泡癌 E、大细胞癌

34、伤员左胸前锁骨中线第四肋处一刀刺伤，来院检查发现伤口流血，血压80/60mmHg，脉搏115次每分，脉弱气促，心音减弱，颈静脉怒张，X线胸片示心界扩大，诊断最可能的是?

A、张力性气胸 B、血心包 C、血气胸 D、失血性休克 E、损伤性窒息

35、风湿性心脏病二尖瓣狭窄的临床症状轻重最主要取决于? A、风湿活动与否及程度 B、二尖瓣瓣口的狭窄程度 C、体力活动的程度 D、抗风湿药物的应用与否 E、有无心房纤颤的存在

36、缩窄性心包炎的临床治疗原则是?

A、抗结核药物治疗 B、强心利尿 C、尽早施行手术治疗 D、心包穿刺或胸腔穿刺 E、全身支持治疗，不需手术治疗

37、下列哪一项不是食管癌的早期症状?

A、吞咽困难 B、咽下食梗噎感 C、胸骨后外刺样疼痛感 D、食管

内异物感 E、胸骨后烧灼感

38、关于慢性缩窄性心包炎的病理和病理生理下列哪项描述最恰当？ A、仅限于心包壁层增厚、钙化 B、膈面心包增厚最厚 C、无心肌萎缩，但心包腔完全消失 D、心脏舒张期不能充分扩张 E、肺动脉压力降低

39、食管癌病人，X线食管吞钡照片，哪项不符合早期诊断？

A、食管充盈缺损伴明显狭窄 B、食管壁局限性活动受损 C、食管局限，小的充盈缺损 D、局限性粘膜增粗和断裂 E、食管粘膜小龛影

40、缩窄性心包炎不能出现下述哪一种体征？

A、脉搏细弱，快 B、静脉压升高 C、肝大、腹水 D、收缩压升高 E、心音减弱

41、胸外伤反常呼吸的最根本的病理生理紊乱是？

A、吸气时伤区下陷 B、呼气时伤区膨出 C、回心血量减少 D、缺氧和二氧化碳潴留 E、胸腔内高压

42、外伤性心包填塞最可靠最合理的诊断办法是？

A、胸部 X线片 B、心脏计波摄影 C、超声检查 D、静脉压测定 E、心包穿刺

外科学国家题库

医学考研网（ ）中国最大的医学考研专业指导站

43、下列哪一项是诊断食管癌的最主要依据？

A、进行性吞咽困难病史 B、食管脱落细胞检查 C、食管吞钡 X线摄片 D、胸部 X线摄片 E、CT 检查

44、早期食管癌最常见的症状是？

A、进行性吞咽困难 B、进食时食管内异物感 C、持续性胸背痛 D、声音嘶哑 E、进食时呛咳

45、下述表现说明食管癌已外侵，除了？ A、继发性左侧胸水 B、持续性胸背疼

C、大量呕血 D、吞咽阻挡感 E、食管气管瘘

46、男性，45岁，腹胀，下肢水肿，气急5年，检查：颈静脉怒

张，心音遥远，肝肋下 3 指，X 线：心影呈三角形，左肺有浸润性肺结核病灶，此病人最好的处理方法是？ A、抗结核治疗，待肺部病变痊愈后二年手术 B、抗结核治疗，待肺部病变稳定后尽早手术 C、加强营养，纠正低蛋白血症 D、利尿治疗 E、反复抽腹水，注入抗结核药

47、男性，31 岁，被马车压伤胸部，查体：P140 次每分，呼吸 40 次每分，血压：80/60mmHg，面色苍白，听诊患侧呼吸音消失，气管向健侧移位，此时应立即采取哪项检查？

A、行立位胸部 X 线摄片 B、行卧位胸部 X 线摄片 C、行胸部 B 超检查确诊有无胸腔积液 D、立刻行心血管造影明确有无胸腔内大血管损伤 E、患侧胸膜腔穿刺

48、下列为肺动脉瓣狭窄临床表现除了？ A、胸骨左缘第二肋间可扪及的收缩期震颤

B、心电图右室大

C、胸骨左缘第 2 肋间可听到 3—4 级的收缩期杂音 D、X 线示左室大 E、活动后心跳气短

49、关于开放性胸外伤的概念下述哪项正确？ A、脏层胸膜损伤，胸膜腔经脏层胸膜与外界相通 B、胸壁有开放创口，深达肌层 C、壁层胸膜有创口，皮肤完整 D、壁层胸膜损伤，胸膜腔经胸壁与外界相通 E、肺有裂口

50、男，60 岁，持续干咳二个月，偶有痰中带血丝，胸部正侧位 X 光片，显示右上叶不张，除普通细胞学检查外，还应首选哪项检查？

A、经皮肺穿刺活检 B、纤维支气管镜检查 E、纵膈镜检，探查

C、放射核素肺扫描检查 D、剖胸肺活检

52、下列哪种肺癌最常见

A、小细胞肺癌 B、大细胞肺癌 C、鳞癌 D、腺癌 E、混合癌

53、早期食管癌的最常见的临床表现是？

A、消瘦 B、进行性吞咽困难 C、持续胸背疼痛 D、声音嘶哑 E、食管内异物感

54、开放性气胸产生纵膈摆动最主要是由于？

A、部分空气在两侧肺内重复交换 B、伤侧肺萎缩 C、健侧胸膜腔

负压增加 D、呼气与吸气时两侧胸腔压力不同 E、健侧胸膜膨胀不全

55、闭合性胸外伤后出现产生皮下气肿和极度呼吸困难，首先应考虑为？ A、肋骨骨折 B、肺挫伤 C、创伤性窒息 D、张力性气胸 E、血胸

外科学国家题库

医学考研网（<http://www.med126.com>）中国最大的医学考研专业指导站

56、食管癌多见于？

A、颈段食管 B、下段食管 C、中段食管 D、上段食管 E、膈下食管

57、进行性胸腔内出血最可靠的诊断依据是？

A、伤后 6 小时置胸腔闭式引流放出血量 500ml B、伤后 24 小时共引出 1200ml 陈旧性积血

C、观察 3 小时胸腔引流量均为 200ml/ 小时以上 D、胸穿抽出不凝血液 E 受伤即刻血压 83/64mmHg

58、男患儿，9 岁，活动后心悸 3 年，胸骨左缘第二肋间扪及收缩期震颤，并于此部位听到 4 级粗糙的喷射性收缩期杂音，肺动脉瓣第二心音减弱，X 线胸片显示肺血管影减少，心电图右室大，临床诊断最可能是？

A、房间隔缺损 B、室间隔缺损 C、主动脉瓣狭窄 D、动脉导管未闭 E、肺动脉口狭窄

59、肺癌的病理分型中，下列哪一型恶性程度最高，转移最早？

A、鳞癌 B、腺癌 C、未分化小细胞癌 D、瘢痕癌 E、肺泡细胞癌

60、周围型肺癌的 X 线表现下列哪一条是错的？

A、肺野内有类圆形阴影 B、常可见呈分叶状 C、边缘可见切迹或毛刺 D、圆形影，边缘较光滑，常可见钙化灶 E、可见到偏心上空洞

62、45 岁男性教师，进食后滞留感二月，X 线食管吞钡检查正常，对此病人首先检查方法是？ A、放射性同位素扫描 B、食管拉网细胞学检查 C、纵膈镜活检 D、CT E、淋巴结活检

63、男，18 岁工人，被刀刺伤左前胸，感心慌气短，查体：面色

苍白，颈静脉怒张，血压 60/45mmHg ，心率 120 次每分，心音弱，为确诊，下列哪种措施最佳？

A、输血、输氧、抗休克 B、心包穿刺 C、吸氧，保持呼吸道通畅
D、用升血压药物 E、急诊胸透和心电图

64、开放气胸产生纵膈扑动最主要是由于？

A、伤侧胸膜腔负压消失 B、伤侧肺萎陷 C、健侧胸膜腔负压增加
D、呼吸时两侧胸膜压力不等 E、健侧肺膨胀代偿性增加

65、对中央型肺癌诊断下列哪一项最为适用？

A、X 线胸片 B、电子计算机体层扫描 C、放射核素肺扫描检查 D、
经皮穿刺肺活检 E、支气管镜检、取活检

66、下列哪一项可确立肺动脉口狭窄？

A、颈静脉怒张 B、肺动脉瓣区听到收缩期杂音 C、X 线上显示右
室扩大 D、右室与肺动脉收缩期压力阶差 20mmHg E、心电图 P 波高
尖

67、在肺动脉口狭窄的诊断中最具确诊价值的是？

A、听到收缩期粗糙杂音 B、心电图呈现右室肥厚 C、X 线检查示
右心扩大 D、右心阻力负荷增加 E、肺动脉和右心室间的压力阶差
10mmHg

68、男性，52 岁，刺激性咳嗽、痰中带血三个月，胸片见
右肺上叶部分不张，多次痰查癌细胞阴性，为确诊，应首选下列哪项
检查？

A、再次痰查找癌细胞 B、B 超下肿块穿刺活检 C、胸部 CT 检查
D、纤维支气管镜活检

外科学国家题库

医学考研网（ ）中国最大的医学考研专业
指导站

E、抗炎，治疗 3 个月后复查胸片 69、急性脓胸最多继发于？

A、肺部炎症 B、膈下感染 C、败血症或脓毒血症 D、纵膈炎症 E、
胸壁感染 70、钡餐 X 线检查示食管腔外压性狭窄，粘膜光滑完整最可
能的是？

A、食管癌 B、食管良性狭窄 C、贲门失弛缓症 D、食管平滑肌瘤

E、贲门癌 71、先天性心脏病肺动脉口狭窄，造成的病理生理改变主要是？

A、肺动脉压力升高 B、左向右分流 C、左室肥大 D、右室压力升高 E、肺淤血 72、下列各项是张力性气胸的临床特点除了？

A、呼吸困难 B、紫绀 C、伤侧肺萎缩 D、纵膈向患侧移位 E、对侧肺膨胀不全 73、中心型肺癌最常见的早期症状是？

A、呼吸困难 B、胸痛 C、声嘶 D、发热 E、刺激性咳嗽 74、下列为慢性缩窄性心包炎的 X 线特征除了？

A、心影大小接近正常 B、心影明显增大 C、心影呈三角形 D、心脏搏动减弱 E、有时可见心包钙化

75、中央型肺癌中最常见的症状是？

A、反复大咯血 B、发烧 C、刺激性咳嗽 D、气短 E、胸痛 76、风湿性心脏病二尖瓣狭窄时，心脏听诊的最典型杂音是？ A、胸骨左缘第三、四肋间 IV级以上收缩期杂音

B、胸骨左缘第二肋间 I-II级吹风样杂音 C、胸骨左缘第二肋间连续性的机器样杂音 D、心尖区舒张中期隆隆样杂音

E、心尖区全收缩期杂音

77、下述哪个项不是急性脓胸感染原因？

A、结核 B、肺部感染 C、血性感染 D、膈下脓肿 E、支气管胸膜瘘 78、小儿急性脓胸最常见的致病菌是？ A、结核杆菌 B、大肠杆菌

C、放线菌 D、金黄色葡萄球菌 E、链球菌

79、肺动脉口狭窄最确切的确诊方法是？

A、右心导管 B、心脏听诊 C、心电图 D、胸部 X 线 E、彩色多普勒 80、肋骨骨折时，下列哪项最能说明肯定有肺或支气管损伤？

A、局部压痛 B、扪及皮下气肿 C、骨折断端磨擦感 D、闻及肺罗音 E、扪及骨折断端 81、慢性缩窄性心包炎，确诊后首选治疗原则是？

A、抗结核治疗 B、使用抗生素 C、尽早手术 D、少量输血 E、使用强心利尿药

82、男，60 岁，刺激性咳嗽 2 个月，偶有咳血，经抗炎抗结核治疗无好转，胸部 X 线摄片示右上肺叶部分不张，进一步明确诊断应首

选?

A、胸部断层 X 线摄片 B、支气管镜检查 C、纵膈镜检查 D、放射性核素肺扫描检查 E、健侧肺扩张不全

84、男、55 岁，既往体健，近 3 个月来咳嗽，痰中带血丝，胸部平片及 CT 显示左上肺块影，3 * 3cm，肺门淋巴结不大，锁骨上淋巴结未扪及，无肺结核史，首选的处理方法是？

外科学国家题库

医学考研网（[http://www.med126.com](#)）中国最大的医学考研专业指导站

A、手术切除 B、放疗 C、化疗 D、化疗后手术切除 E、观察 2 个月
85、肺癌病理组织学分类中，细支气管肺泡癌被划归在？

A、鳞癌 B、腺癌 C、小细胞未分化癌 D、大细胞未分化癌 E、温和型肺癌
86、以下哪项不是早期食管的 X 线表现？

A、局限性管壁僵硬 B、癌限，小的充盈缺损 C、管腔狭窄梗阻 D、小龛影 E、局限性粘膜皱襞增粗和断裂

87、男，40 岁，左前胸第 4 肋间刀伤后被送进急诊室，呼吸浅弱，血压 60/45mmHg，颈静脉怒张，胸腔穿刺未抽出血和气，首选治疗是？

A、紧急手术 B、快速输血输液 C、大流量氧吸入 D、胸腔闭式引流 E、继续观察
88、男性患者，右胸外伤，无明显呼吸困难，胸片示右 3、4 肋骨单处骨折，无移位，肺压缩 30%，治疗方案首选？

A、胸腔穿刺抽气 B、输液输血 C、给氧 D、胸腔闭式引流 E、镇静止痛、保守疗法
89、慢性脓胸合并支气管胸膜瘘的患者，何种手术方式最正确？

A、支气管瘘口缝合术 B、胸膜纤维板剥脱术 C、胸腔闭式引流术 D、胸廓改形术 E、胸廓改形术和病肺切除术

90、胸膜纤维板剥脱术，最适应于？

A、急性脓胸 B、慢性脓胸早期 C、慢性脓胸晚期 D、慢性脓胸伴支气管胸膜瘘 E、慢性脓胸伴肺内有广泛性破坏病变时

91、胸部损伤致胸内进行性出血，下列与其不符合？ A、脉

搏逐渐增快，血压持续下降 B、输血补液后，血压不回升或升高后又迅速下降 C、血红蛋白和红细胞压积重复测定，无明显降低 D、X 线检查示胸膜腔阴影继续增大 E、胸腔闭式引流后引流量 250ml/小时，持续 3 小时

92、不属早期食管癌的症状是？

A、下咽时梗噎感 B、胸骨后针刺感 C、食管内异物感 D、进食时呛咳 E、胸骨后烧灼感

93、早期周围性肺癌的最常见的表现是？

A、胸痛 B、无症状 C、咳血丝痰 D、干咳 E、发热

94、正常成年人，二尖瓣口面积为 4—5cm²，血流在舒张期和右心房通过二尖瓣的口流入左心室，当风湿性二尖瓣狭窄病变时，在何种病理情况下最可能产生急性肺水肿？

A、瓣口面积<4cm² B、瓣口面积<3cm² C、瓣口面积<2cm²

D、瓣口面积<1.5cm² E、瓣口面积缩小到 1cm² 以下时

95、开放性气胸，需迅速封闭伤口，其最主要目的是？

A、防止肺萎陷 B、变伤侧胸腔正压为负压 C、可使萎缩的肺有部分膨胀 D、制止纵膈摆动 E、防止二氧化碳潴留

96、单纯性胸膜纤维板剥除术，最适应于？ A、急性脓胸渗出期 B、慢性脓胸早期

C、慢性脓胸的后期 D、慢性脓胸伴有肺病变

外科学国家题库

医学考研网（ ）中国最大的医学考研专业指导站

E、脓胸并支气管胸膜摩擦音

97、中段食管癌完全不能进食 10 天，患者消瘦、脱水，左锁骨上有多淋巴结，质硬，不活动治疗应首选？

A、争取手术切除 B、放射治疗 C、化学疗法 D、免疫疗法 E、食管、胃转流术或胃造瘘术

98、男性，58 岁工人，吸烟史 30 年，刺激性咳嗽并痰中带血一个月，X 线检查示右肺上叶前段呈炎性征象，下述哪一项发现最具有确诊意义？

A、痰细胸学检查找到癌细胞 B、痰细胸有肺炎球菌生长 C、痰抗酸染色检菌阳性 D、右颈外侧扪及淋巴结 E、支气管镜活检粘膜呈炎性改变

99、一男性，18岁中学生，一小时前被人用锐器刺伤左胸部，入胸外科病房时血压 62/50mmHg，脉搏 140 次每分，心前区搏动减弱，颈静脉怒张，治疗的关键是？

A、UCG 检查 B、胸腔闭式引流 C、心包穿刺 D、拍胸部 X 线片 E、左胸探查 100、开放性气胸的病理生理改变，哪项是错误的？

A、伤侧胸腔负压消失 B、伤侧肺萎缩 C、纵膈移向健侧 D、呼气时纵膈偏向患侧 E、肺内部分气体对流

101、患者左锁骨中线第四肋间刀刺伤，伤口溢血不止，血压 80/60mmHg，脉搏 128 次每分，呼吸 40 次每分，心前区搏动减弱，颈静脉怒张，治疗的关键是？

A、立即剖胸手术 B、气管插管辅助呼吸 C、胸腔闭式引流 D、胸壁伤口清创缝合 E、输血输液纠正休克

102、男性 60 岁，血丝痰 2 个月，X 线示右上肺大片状阴影，右上肺体积缩小，OT 试验阴性，痰查结核菌 阴性，首选的检查方法是？

A、肺核素扫描 B、纵膈镜检 C、肺 CT D、行纤维支气管镜检查 E、经皮穿刺肺活检 103、初诊病人，胸透发现右肺下叶炎性改变，为排除肺癌，首先用哪种方法检查？ A、支气管造影检查 B、纤维支气管镜检查 E、痰脱落细胞检查

104、某 10 岁男孩，活动后心悸气促 6 年，近 1 年来出现活动时昏厥 4 次，查体：愚型面容，胸骨左缘第二肋间 II 级全收缩期喷射性杂音，第二心音减弱，为确诊应首选？

C、摄肺部断层片 D、剖胸肺活检

A、颅脑 CT B、彩色超声心动图 C、心电图 D、心向量 E、X 线胸片 105、男性，55 岁，食管癌病人进食时呛咳，为明确诊断应首选？

A、胸部 X 线摄片 B、胸部 CT 检查（电子计算机体层 X 线扫描） C、食管吞钡 X 线检查 D、食管超声波检查 E、胸部断层 X 线摄片

106、肺动脉口狭窄，由于以下因素出现周围性紫绀除了？

A、肺小动脉阻力增高 B、静脉回心血流受阻 C、右房压力增高 D、右心室压力增高 E、右心排血障碍

107、左胸腹前被砸伤、疼痛，不敢咳嗽挤压前后胸部，伤处疼痛加重，首先考虑的诊断是？ A、胸壁软组织挫伤 B、损伤性液气胸 C、肋骨骨折 D、肺挫裂伤 E、肋间神经损伤

108、男，18岁，半小时前被刀刺在胸骨左缘第四肋间，急诊室检查患者神志清楚，血压低，脉搏快，弱，外科学国家题库

医学考研网（ ）中国最大的医学考研专业指导站

听诊双肺呼吸音清晰，心音低远，最可能的诊断是？

A、心脏挫伤 B、胸主动脉破裂 C、心包填塞 D、血胸 E、气胸

109、单纯二尖瓣狭窄的早期最常见的 X线改变是？

A、右侧胸腔积液 B、右房区域的双房影 C、心内钙化影 D、肺动脉段突出 E、Kerlry线

110、下列哪项为肺癌手术禁忌症？

A、合并重症肌无力 B、合并多发性肌肉神经痛 C、曾行过放疗 D、出现广泛肺门纵膈淋巴结转移 111、哪种肺癌对化疗较敏感？

A、鳞状细胞癌 B、腺癌 C、小细胞癌 D、大细胞癌 E、鳞腺混合癌 112、肺癌中最早即可发生远处转移的是？

A、鳞癌 B、腺癌 C、肺泡细胞癌 D、未分化大细胞癌 E、未分化小细胞癌 113、慢性缩窄性心包炎，手术指征最强的临床表现是？

A、胸部 X线检查显示心包钙化 B、心电图显示 QRS 波低电压 C、超声心动图显示心包腔内积液 D、心导管检查显示右房右室舒张压升高 E、周围静脉压明显升高

114、男性患者，33岁，劳力性心慌气促 10 年，心尖区可听到舒张期隆隆样杂音，胸部 X线检查见心影增大呈梨形，并见双心房阴影，该患者二维或切面超声心动图检查可发现？ A、二尖瓣瓣口狭小 B、左心房变小 E、肺动脉瓣瓣口狭小

115、一患者，在心尖部听到第一心音亢进，舒张期隆隆样杂音，可闻及开放拍击音，病人心功能 I级，由此，首先考虑？

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/525330233332012004>