

# 2024 河南省沁阳市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题真题题库附答案

## 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 阿托品与小活络丹合用

- A: 合用后增加毒性，出现药物中毒
- B: 合用抑制呼吸，易致呼吸衰竭
- C: 两者合用作用相反，互相降低药效
- D: 合用后抑制后者吸收，降低疗效

**答案：A**

2. 治疗窗窄以及代谢存在较大的个体差异的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 顺铂
- C: 茶碱
- D: 地高辛

**答案：C**

3. 下面属于消化性溃疡发病机制中胃、十二指肠黏膜的攻击因素的是

- A:  $\text{HCO}_3^-$  的分泌
- B: 胃黏膜屏障
- C: 非甾体抗炎药
- D: 胃黏液

**答案：C**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

4. 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病，引起药源性疾病的因素主要为

- A: 基础疾病因素
- B: 性别因素
- C: 年龄因素
- D: 遗传因素

**答案：A**

5. 用 10%氯化钠注射液 9ml 加适量注射用水稀释成 90ml 的溶液，其氯化钠浓度是（）

- A: 0.01
- B: 0.009
- C: 0.1
- D: 0.1

**答案：A**

6. 蒽环类抗肿瘤药可引起

- A: 末梢神经炎
- B: 心脏毒性
- C: 溶血性尿毒症
- D: 出血性膀胱炎

**答案：B**

7. 治疗发热，成人服对乙酰氨基酚，每隔 4~6 小时重复用药 1 次；1 日用量不得超过

- A: 2.5g
- B: 4.0g
- C: 3.0g

D: 4.5g

**答案：B**

8. 以高 TC 为主血症首选

A: 依折麦布

B: 非诺贝特

C: 氟伐他汀

D: 阿昔莫司

**答案：C**

9. 弥漫性青铜色色素沉着

A: 博来霉素

B: 白消安

C: 柔红霉素

D: 氟尿嘧啶

**答案：B**

10. 中度药品不良反应是指

A: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

B: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

C: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无须治疗

D: 没有临床症状，无须治疗

**答案：B**

11. 因胰腺功能不全引起的消化不良性腹泻适宜选用

A: 碳酸氢钠

B: 胰酶

C: 胃蛋白酶

D: 双八面体蒙脱石

**答案: B**

12. 冠状动脉粥样硬化心脏病患者，如没有用药禁忌症，欲服用阿司匹林作为一线预防，最佳剂量范围是

A: 150~300mg/d?

B: 75~150mg/d?

C: 25~50mg/d?

D: 25~75mg/d?

**答案: B**

13. 患者，女，52岁，近年来发现手关节肿痛，且呈对称性，并有畸形，晨起时有僵硬现象持续1小时，疼痛难忍。经实验室检测示血沉28mm / 1h，指尖关节的X线片显示受累关节有骨侵蚀特征。

A: 骨质疏松症

B: 类风湿关节炎

C: 软骨病

D: 骨性关节炎

**答案: B**

14. 一般情况下，以洗胃方式解救毒物中毒为首要措施，洗胃液每次的用量为

A: 最多不超过 400ml

B: 最多不超过 300ml

C: 最多不超过 200ml

D: 最多不超过 500ml

**答案: D**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

15. 用于治疗溃疡性结肠炎，应晨起服用，达到症状完全缓解后开始减量，减药速度不宜太快的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 西格列汀
- C: 格列吡嗪
- D: 阿卡波糖

**答案：A**

16. 配制 10% 葡萄糖注射液 500ml，现用 50% 和 50A 两种浓度葡萄糖注射液混合配制，分别需要

- A: 94ml 和 406ml
- B: 56ml 和 444ml
- C: 85ml 和 415ml
- D: 72ml 和 428ml

**答案：B**

17. 可能导致癫痫发作的药物是

- A: 利血平
- B: 白消安
- C: 氟哌啶醇
- D: 麻黄碱

**答案：D**

18. 主要药物代谢酶系活性接近成人，对多数药物具有足够的代谢能力，即

- A: 药物排泄
- B: 药物分布
- C: 药物代谢

D: 药物吸收

**答案：C**

19. 下列药物中服用后可在乳汁中分泌较多的是

A: 头孢呋辛

B: 华法林

C: 地西洋

D: 青霉素 G

**答案：C**

20. 患者，男，64 岁，因“右足肿痛”就诊。查体：右足第一跖趾关节红肿、触痛明显。化验结果：血尿酸  $588.1 \mu\text{mol/L}$ 。诊断为“急性痛风性关节炎”。患者既往有高血压、高胆固醇血症、冠心病病史，目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释片 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

A: 美托洛尔和赖诺普利

B: 美托洛尔和辛伐他汀

C: 氢氯噻嗪和辛伐他汀

D: 氢氯噻嗪和阿司匹林

**答案：D**

21. (引起药源性肾病的药物)含马兜铃酸的中药可导致

A: 肾小管阻塞

B: 不可逆性肾小管坏死

C: 肾间质纤维化

D: 直接肾毒性

**答案：C**

22. 关于癌症疼痛患者止痛药使用原则的说法，错误的是()

- A: 按阶梯给药
- B: 疼痛时用药，不痛时不需用药
- C: 提倡无创给药方式，尽量口服
- D: 应个体化用药

**答案：B**

23. 痉挛性便秘

- A: 乳果糖
- B: 羧甲基纤维素钠
- C: 比沙可啶
- D: 开塞露

**答案：B**

24. 为使铁剂更好的被人体吸收，宜同时应用

- A: 硫酸亚铁
- B: 亚叶酸钙
- C: 叶酸+维生素 B12
- D: 维生素 C

**答案：D**

25. 口服避孕药中雌激素对机体代谢的影响，正确的为

- A: 低密度脂蛋白胆固醇升高
- B: 甘油三酯降低
- C: 高密度脂蛋白胆固醇降低
- D: 糖耐量异常

**答案：D**

26. 患者，女，85 岁，既往有高血压病史，慢性心力衰竭，给予地高辛每日维持量治疗，近 Et 频发室性心动过速，检测血钾值在正常范围。如果患者出现严重的室性心动过速、室颤，需采用

- A: 阿托品
- B: 苯海拉明
- C: 电复律
- D: 胺碘酮

**答案：D**

27. 某男性患者，57 岁，既往高血压病史 10 年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清，查体：BP220/120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激，左侧肢体不活动，左侧巴宾斯基征阳性。

- A: 止血
- B: 脱水
- C: 降血压
- D: 扩容

**答案：B**

28. 大多数慢性汞中毒患者中毒的主要原因是（）

- A: 环境污染
- B: 饮食
- C: 长期吸入汞蒸气
- D: 被投毒

**答案：C**

29. 静滴、静注等给药途径的不良反应发生率较高，说明药源性疾病的药物因素是

- A: 药物的使用
- B: 药物制剂因素
- C: 不良生活方式
- D: 生理因素

**答案：A**

30. 目前唯一被批准用于治疗类风湿关节炎的 IL-1 拮抗剂类生物制剂为

- A: 阿那白滞素
- B: 阿达木单抗
- C: 阿巴西普
- D: 英夫利昔单抗

**答案：A**

31. 患者，男，65 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次，阿卡波糖 0.1g. 一日 3 次。罗格列酮 4mg，一日一次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级，轻度肾功能不全，长期服用贝那普利、阿司匹林。

- A: 蔗糖
- B: 葡萄糖
- C: 无糖饼干
- D: 馒头

**答案：B**

32. 长期的高磷血症会导致心脏、血管钙化，腹膜透析患者必须在进食的同时服用的药物是

- A: 磷化物
- B: 钙结合剂

C: 铁剂

D: 磷结合剂

**答案: D**

33. (2019 年真题) 合并闭角型青光眼的前列腺增生患者，不宜选用的药物是

A: 非那雄胺

B: 托特罗定

C: 坦索罗辛

D: 多沙唑嗪

**答案: B**

34. 以下注射给药途径中，最常用于新生儿的是

A: 动脉注射

B: 静脉注射

C: 腹腔注射

D: 肌肉注射

**答案: B**

35. 具有肝毒性和性功能障碍不良反应，与其他药物同服时容易影响后者的血药浓度，不应成为该类药物首选的是

A: 埃索美拉唑

B: 莫沙必利

C: 西咪替丁

D: 硫糖铝

**答案: C**

36. 氨苄西林可能引起

- A: 尿肌酐
- B: 尿沉渣结晶
- C: 尿酮体
- D: 尿血红蛋白

**答案：B**

37. 患者李某，男，45 岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为 160 / 100mmHg。

- A:  $\beta$  受体阻断剂
- B: ACEI
- C: 利尿剂
- D: AR

**答案：B**

38. 对沙眼衣原体有强大抗菌作用的药品是

- A: 磺胺醋酰钠滴眼液
- B: 红霉素眼膏
- C: 硫酸锌滴眼液
- D: 酞丁安滴眼液

**答案：B**

39. 以下维生素类药物中，可能导致尿液酸碱度降低的是

- A: 维生素 C
- B: 维生素 D
- C: 维生素 E
- D: 维生素 B

**答案：A**

40. (体内贮铁量与血浆铁的运转率的关系)，铁缺乏时铁剂的吸收率可达

- A: 10%~20%
- B: 15%~20%
- C: 20%~40%
- D: 20%~60%

**答案：D**

41. 通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是

- A: 呋塞米
- B: 赖诺普利
- C: 硝苯地平
- D: 缬沙坦

**答案：C**

42. (镇静催眠药中毒症状)，巴比妥类重度中毒时出现的中枢神经系统症状为

- A: 呼吸减慢、变浅不规则，或呈潮式呼吸
- B: 昏迷、血压降低、呼吸抑制、心动缓慢和晕厥
- C: 可引起狂躁发作
- D: 可见心律失常、心脏骤停

**答案：C**

43. 根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别属于妊娠毒性 B 级的药物是

- A: 葡萄糖
- B: 阿莫西林
- C: 万古霉素

D: 沙利度胺

**答案: B**

44. 急性胰腺炎发病几小时，血清淀粉酶开始升高

A: 12~72

B: 48~72

C: 1

D: 2~12

**答案: D**

45. 糖皮质激素所致的骨质疏松治疗

A: 用甲状旁腺激素

B: 单独用双膦酸盐

C: 长期口服维生素 D

D: 钙制剂+维生素 D+双膦酸盐

**答案: D**

46. 腔道疾病时宜选用

A: 片剂

B: 栓剂

C: 注射剂

D: 软膏剂

**答案: B**

47. 下列药品中，归属妊娠毒性药物 A 级的是

A: 氯化钾

B: 美托洛尔

C: 青霉素

D: 环丙沙星

**答案：A**

48. 会干扰乙醇代谢过程导致双硫仑样反应, 用药期间不宜饮酒的药物是()

A: 阿司匹林

B: 甲硝唑

C: 阿奇霉素

D: 对乙酰氨基酚

**答案：B**

49. WHO 推荐 12 岁以下儿童碘的摄入范围是

A: 30~100  $\mu\text{g}/\text{d}$

B: 30~120  $\mu\text{g}/\text{d}$

C: 50~100  $\mu\text{g}/\text{d}$

D: 50~120  $\mu\text{g}/\text{d}$

**答案：D**

50. 长期服用苯妥英钠, 可能导致

A: A/G 值低于 1

B: 血清碱性磷酸酶升高

C: 丙氨酸氨基转移酶升高

D:  $\gamma$ -谷氨酰转移酶升高

**答案：D**

51. 能改善眼部干燥症状, 缓解视疲劳的药物是()

A: 聚乙烯醇滴眼

B: 可的松滴眼液

C: 山莨菪碱滴眼液

D: 硫酸锌滴眼液

**答案: A**

52. 患者，男，57 岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊。经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为 H1N1 甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是

A: 利巴韦林

B: 金刚乙胺

C: 奥司他韦

D: 金刚烷胺

**答案: C**

53. 一些药品吸收二氧化碳发生碳酸化

A: 空气

B: 日光

C: 温度

D: 湿度

**答案: A**

54. 已知 "1%(g/ml) 盐酸麻黄碱溶液的冰点降低值为 0.16"，1g 盐酸麻黄碱氯化钠的等渗当量为 0.28，欲配制 2%(g/ml) 盐酸麻黄碱滴鼻剂 500ml，需要氯化钠的量是

A: 1.83g

B: 1.78g

C: 1.7g

D: 1.88g

**答案: C**

55. 不宜与中成药虎骨酒、人参酒、舒筋活络酒同服的药品是

- A: 氨茶碱
- B: 氯苯那敏
- C: 地高辛
- D: 可待因

**答案：B**

56. 根据循证医学证据分级，同质 RCT 的系统评价结果属于

- A: II b 类证据
- B: I b 类证据
- C: II a 类证据
- D: I a 类证据

**答案：D**

57. 高胆固醇血症，首选的治疗药物是

- A: 他汀类
- B: 贝特类
- C: 烟酸
- D:  $\omega$ -3 脂肪酸

**答案：A**

58. 关于头痛、偏头痛、紧张性头痛、三叉神经痛的药物治疗(对症治疗),长期精神紧张、紧张性头痛者

- A: 乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林等
- B: 一般可首选对乙酰氨基酚，推荐合并应用谷维素、维生素 B1
- C: 服用麦角胺咖啡因片、罗通定片、天麻素、苯噻啶、舒马曲坦、佐米曲坦

D: 推荐应用地西洋(安定)片

**答案：D**

59. 治疗咳嗽应依据咳嗽的频率和程度选药，剧咳者宜首选的非处方止咳药是

A: 吗啡

B: 苯丙哌林

C: 右美沙芬

D: 可待因

**答案：B**

60. 高血压伴痛风的患者慎用的药物是()

A: 普萘洛尔

B: 氢氯噻嗪

C: 卡托普利

D: 硝苯地平

**答案：B**

61. 羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂(他汀类)所导致的药源性损害是

A: 胃肠道

B: 肺

C: 肾脏

D: 肝脏

**答案：D**

62. 药物相互作用是双向的，既可能产生对患者有益的结果，使疗效协同或毒性降低；也可能产生对患者有害的结果，使疗效降低和毒性增强，有时会带来严重后果，甚至危及生命。

- A: 敏感化作用
- B: 减少不良反应
- C: 协同作用
- D: 竞争性拮抗作用

**答案：D**

63. 根除幽门螺杆菌治疗的首选抗菌药是

- A: 左氧氟沙星
- B: 呋喃唑酮
- C: 阿莫西林
- D: 四环素

**答案：C**

64. 患者,男,72岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂 200  $\mu$ g bid 吸入沙丁胺醇气雾剂 100  $\mu$ g prn 吸入,氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg prn 舌下含服治疗。

- A: 摇匀呼气→深吸气同时按压阀门→屏气约 10s→漱口
- B: 漱口→摇匀→呼气→按压阀门并深吸气→屏气约 10s
- C: 呼气→摇匀→按压阀门并深吸气→屏气约 10s→漱口
- D: 呼气→按压阀门并深吸气→屏气约 10s→漱口

**答案：A**

65. 患者,女,27岁,妊娠4个月,因肺结核给予异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇联合治疗。为避免胎儿神经毒性,患者应补充

- A: 维生素 D
- B: 维生素 B6
- C: 维生素 K1

D: 维生素 C

**答案：B**

66. ADR 报告表应填写具体；如患卵巢囊肿合并肺部感染。因注射头孢曲松引起不良反应，应填写“肺部感染”；所对应的项目是

A: 用药原因

B: 用药起止时间

C: ADR / ADE 过程描述

D: 不良反应 / 事件的结果

**答案：A**

67. 患者,男 58 岁,高血压病史 5 年,吸烟史 40 年,日均 40 支,6 小时前出现左侧肢体无力,并逐渐加重,不能站立,家属发现其说话迟钝含混,右侧嘴唇变浅,意识清楚,到某院急诊 BP190/120mmHg,血常规基本正常,行头部 MRI 检查后,诊断为急性脑梗死。

A: 尼莫地平注射液 20mgqdiv

B: 胞二磷胆碱注射液 200mgqdiv

C: 甘露醇注射液 250mlq6hiv

D: 呋塞米片 200mgqdp0

**答案：C**

68. (2018 年真题) 某口服避孕药复方制剂,其成分为: 每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下,请回答问题。

A: 不再继续服用此周期药物,经过一个 7 天的停药期,再开始继续服用下一周期的药物

B: 尽快同时服用两片药,然后在常规时间继续服药,不需要使用额外的避孕措施

C: 在常规时间 20:00 服用 4 月 25 日的药片,不用补服 4 月 24 日的药片

D: 尽快同时服用两片药,然后在常规时间继续服药,在以后的 7 天内要加用屏障避孕法

**答案: B**

69. 适用于已切除子宫的妇女()

A: 雌孕激素序贯用药

B: 单纯孕激素补充治疗

C: 雌孕激素连续联合用药

D: 单纯雌激素补充治疗

**答案: D**

70. 下列影响老年人血药浓度的因素中,叙述错误的是

A: 对药物的代谢、排泄减慢,血浆半衰期延长

B: 心肝肾及胃肠等主要器官功能在不断下降

C: 与血浆蛋白结合率增加,使游离型药物减少

D: 常规剂量连续给药就有可能引起蓄积性中毒

**答案: C**

71. 药品不良事件简写为

A: ADR

B: AE

C: ADE

D: DUI

**答案: C**

72. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$  (参考值  $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$ )，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液
- B: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止
- C: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星
- D: 应给予少量、多次、清淡饮食

**答案：C**

73. 慢性非特异性结肠炎患者服用美沙拉秦期间应定期监测

- A: 肝功能
- B: 脾功能
- C: 呼吸功能
- D: 肾功能

**答案：D**

74. 依药品采购-验收-入库-出库-调配-使用过程，从发现问题的环节开始追踪即

- A: 对可疑药品进行封存
- B: 反向追踪
- C: 查找供货方
- D: 药品召回

**答案：B**

75. 单纯餐后血糖高，而空腹和餐前血糖不高的 2 型糖尿病患者首选

- A: 二甲双胍
- B: 比格列酮
- C: 阿卡波糖
- D: 格列喹酮

**答案：C**

76. 常用抗消化性溃疡药的合理应用应于早餐前 30 分钟服用的是（）

- A: 吉法酯
- B: 瑞巴派特
- C: 质子泵抑制剂
- D: 替普瑞酮

**答案：C**

77. (在乳汁中排泄的药物)青霉素较难在乳汁中出现的机制是青霉素

- A: 呈弱碱性
- B: 呈弱酸性
- C: 在脂肪与水中都有一定的溶解度
- D: 脂溶性高

**答案：B**

78. 适宜餐前服用的助消化药是

- A: 乳酸菌素
- B: 硫糖铝
- C: 铝碳酸镁
- D: 法莫替丁

**答案：A**

79. (2016 年真题) 因绝经期激素替代治疗应禁用的人群是 ( )。

- A: 合并高胆固醇血症的患者
- B: 合并轻度高血压的患者
- C: 甲状腺切除后的患者
- D: 6 个月内有静脉血栓栓塞史的患者

**答案: D**

80. 稳定型心绞痛缓解期的治疗选用

- A: 阿司匹林
- B: 氯贝丁酯
- C: 低分子肝素
- D: 硝酸甘油

**答案: A**

81. 糖尿病患者尿常规检查可发现

- A: 尿淀粉酶增高
- B: 尿葡萄糖阳性
- C: 尿血红蛋白阳性
- D: 尿胆红素阳性

**答案: B**

82. 治疗水疱型脚癣宜选用 ( )

- A: 氢化可的松软膏
- B: 维 A 酸乳膏
- C: 复方苯甲酸酊
- D: 阿昔洛韦软膏

**答案: C**

83. (2019 年真题) 患者，女，27 岁，确诊慢性乙型肝炎 3 年，近日化验结果：HBV-DNA $2 \times 10^5$ opies/ml，ALT122U/L。予以抗病毒治疗首选的药物是

- A: 利巴韦林
- B: 恩替卡韦
- C: 泛昔洛韦
- D: 阿糖腺苷

**答案：B**

84. 患尿路感染，在无病原学结果前，一般首选

- A: 针对革兰阴性杆菌有效的抗菌药物
- B: 针对革兰阳性杆菌有效的抗菌药物
- C: 针对革兰阴性球菌有效的抗菌药物
- D: 针对革兰阳性球菌有效的抗菌药物

**答案：A**

85. 患者，男，56 岁，诊断为病毒性乙型肝炎。实验室检查：HbeAg (+)，HBV-DNA $\geq 20000$ IU/ml。ALT200U/L。现需要启动抗病毒治疗，采用干扰素  $\alpha$  和核苷（酸）类抗病毒药物。

- A: 阿德福韦
- B: 替比夫定
- C: 拉米夫定
- D: 恩替卡韦

**答案：D**

86. 下列治疗蛔虫病的药物中，以对肠道寄生虫具有神经-肌肉阻滞作用而显效的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式  
可自由下载编辑，附完整答案！

---

A: 甲苯咪唑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/526153040054011030>