

# 2022年-2023年护师类之外科护理主管护师通关提分题库及完整答案

## 单选题（共50题）

1、刘某，因交通事故致伤昏迷，3小时后入院，患者处于昏迷状态，呼之不应，但按压眶上神经有反应，左侧瞳孔散大，对光反射迟钝。入院第2天，血压150/100mmHg，脉搏缓慢有力，呼吸深而慢，时而躁动，呕吐，按压眶上神经无反应，左侧瞳孔散大，对光反射消失，右侧肢体瘫痪，病理反射阳性。对该患者的护理措施欠妥的是

- A. 密切观察生命体征，瞳孔等变化
- B. 取平卧位头偏向一侧以防止误吸
- C. 持续留置导尿
- D. 保持大便通畅以防用力排便导致颅内压增高
- E. 配备吸痰器，气管切开等抢救用物

【答案】 C

2、患者男性，45岁。行“全麻下胃大部切除术”后被送回病房。监测患者意识清醒，T37.8℃，P95次/分钟，R24次/分钟，BP140/90mmHg。患者出现呼吸困难，呼吸有鼾声，继而出现鼻翼扇动，三凹征。可能导致此并发症的原因是

- A. 舌后坠
- B. 气管导管扭折
- C. 严重感染
- D. 麻醉药导致呼吸抑制
- E. 气管导管过长紧贴气管壁

【答案】 A

3、刘某，因交通事故致伤昏迷，3小时后入院，患者处于昏迷状态，呼之不应，但按压眶上神经有反应，左侧瞳孔散大，对光反射迟钝。入院第2天，血

压 150 / 100mmHg，脉搏缓慢有力，呼吸深而慢，时而躁动，呕吐，按压眶上神经无反应，左侧瞳孔散大，对光反射消失，右侧肢体瘫痪，病理反射阳性。对该患者的护理措施欠妥的是

- A. 密切观察生命体征，瞳孔等变化
- B. 取平卧位头偏向一侧以防止误吸
- C. 持续留置导尿
- D. 保持大便通畅以防用力排便导致颅内压增高
- E. 配备吸痰器，气管切开等抢救用物

【答案】 C

4、王女士在回家路上看见一人躺在路上，询问得知，此人骨折。骨折的急救下列错误的是

- A. 镇痛、止血、包扎伤口
- B. 有休克的立即送医院
- C. 妥善固定伤肢
- D. 要严密观察病情变化
- E. 搬运、护送要平稳

【答案】 B

5、患者，女性，35岁，高血压1年，血压165/105mmHg，血钾3.3mmol/L，血钠148mmol/L， $\text{HCO}_3^-$ 35mmol/L，肝肾功能正常，尿液pH7.5，静脉尿路造影（一）为确定治疗方案，还应做的必要检查是

- A. 肝功能
- B. 肾功能
- C. 尿比重
- D. CT

E. 腹部平片

【答案】 D

6、患者，男性，77岁，不慎跌倒时以手掌撑地，造成Colles骨折。造成该患者骨折的原因为

A. 间接暴力

B. 直接暴力

C. 肌肉牵拉

D. 骨骼劳损

E. 病理性骨折

【答案】 A

7、患者，男性，26岁。偶尔发现尿血来院就诊。泌尿系肿瘤多数为恶性肿瘤，根据此患者情况，考虑可能性最小的是

A. 肾癌

B. 膀胱癌

C. 肾盂癌

D. 肾母细胞瘤

E. 输尿管肿瘤

【答案】 D

8、一男性，68岁，午餐时进食鲜肉水饺约半斤，不久即感上腹不适，胸闷，大汗，心前区压迫样疼痛，来院急诊。下列哪项不属于急性心肌梗死的临床表现

A. 舌下含化硝酸甘油后疼痛消失

- B. 面色苍白，烦躁不安
- C. BP10.7/6.8kPa(81/45mmHg)
- D. 端坐呼吸，发绀
- E. 上腹胀，呃逆

【答案】 A

9、马某，男性，32岁。尿频、尿急、尿痛1年余。间歇性血尿，多种抗生素治疗无效，且有加重趋势，最后诊断为右肾结核，辅助检查示右肾破坏严重，但左肾功能尚好。决定采取手术治疗，行右肾切除术。术后对该患者护理观察最关键的一点是( )

- A. 引流液的量
- B. 左侧肾能否完成代谢的需要
- C. 引流液的颜色、性状
- D. 病人的体温
- E. 病人血白细胞计数变化情况

【答案】 B

10、某病房总人数是50人，一级护理10人，二级护理20人，三级护理20人。经测定，各级护理的病人在一日内需要的平均护理时数是一级护理5.5小时，二级护理3.5小时，三级护理2.5小时。每位病人一日内得到的间接护理时数是30分钟。若床位使用率按照100%计算，每位护士每个工作班次是8小时，机动编制数按20%计算，那么本病房应编护士数是

- A. 30人
- B. 26人
- C. 24人
- D. 18人
- E. 16人

【答案】 A

11、4岁患儿，3天前突发高热，体温39.5℃，伴寒战，述右侧膝上部疼痛，患肢屈曲，拒绝主动活动和任何检查，发病后每天只进少量饮食。现患儿膝上部皮肤发红发热，肿胀和疼痛逐渐明显，膝关节浮髌试验可疑阳性，血白细胞计数 $20.5 \times 10^9/L$

- A. X线检查
- B. 血常规检查
- C. 关节腔穿刺
- D. 血癌胚抗原检查
- E. 血清类风湿因子检查

【答案】 C

12、患者，男性，32岁，轻度膀胱刺激症状1个月就诊，尿常规检查：白细胞4~5个/HP，红细胞2~3个/HP；尿结核菌培养阳性。此时可以诊断为

- A. 慢性肾盂肾炎
- B. 肾结核
- C. 慢性膀胱炎
- D. 尿道炎
- E. 前列腺炎

【答案】 B

13、女性，60岁，不慎跌倒，右肩部着地，感局部疼痛，不能活动，即送骨科急诊，检查发现：右肩畸形呈方肩，右手不能搭于对侧肩部。病人复位后采取的治疗是

- A. 三角巾固定3周

- B. 贴胸石膏固定 3 周
- C. 手法复位三角巾固定 2 周
- D. 可在局麻下施行手法复位，石膏固定 2 周
- E. 可在臂丛麻醉下施行手法复位，贴胸石膏固定 3 周

【答案】 A

14、患者，男性，40 岁。因车祸发生脾破裂，就诊时血压 8.0/4.0kPa (60/30mmHg)，脉率 120 次/分，患者烦躁不安，皮肤苍白，四肢湿冷。在等待配血期间，静脉输液宜首选

- A. 生理盐水
- B. 平衡盐溶液
- C. 5%葡萄糖液
- D. 5%碳酸氢钠
- E. 5%葡萄糖盐水

【答案】 B

15、某病房患者总数为 40 人，其中一级护理 9 人，二级护理 16 人，三级护理 15 人。经测定各级护理中每名患者在 24 小时内所需的平均护理时数分别为 5.5 小时，3 小时，1 小时。按一个病房 40 张床测算一日间接护理所需时间为 20 小时。病房各级患者总护理时数和约为

- A. 495 小时
- B. 380 小时
- C. 150 小时
- D. 132.5 小时
- E. 100 小时

【答案】 D

16、患者，男性，35岁。尺骨骨折，小夹板固定。夹板固定适当的扎带松紧度是

- A. 活动范围 1cm
- B. 活动范围 1.5cm
- C. 活动范围 2cm
- D. 活动范围 3cm
- E. 扎带后不能活动

【答案】 A

17、患者，男性，40岁。因车祸发生脾破裂，就诊时血压 8.0/4.0kPa (60/30mmHg)，脉率 120 次/分，患者烦躁不安，皮肤苍白，四肢湿冷。医嘱为患者补充以下液体，能够降低血液黏滞度且疏通微循环的液体

- A. 全血
- B. 5%葡萄糖溶液
- C. 10%葡萄糖溶液
- D. 低分子右旋糖酐
- E. 平衡盐溶液

【答案】 D

18、患者，男性，26岁。偶尔发现尿血来院就诊。泌尿系肿瘤多数为恶性肿瘤，根据此患者情况，考虑可能性最小的是

- A. 肾癌
- B. 膀胱癌
- C. 肾盂癌

D. 肾母细胞瘤

E. 输尿管肿瘤

【答案】 D

19、患者刘某，男，63岁，入院诊断为：2型糖尿病，护士在对其进行健康教育需求评估后计划对其进行“糖尿病对机体的危害”和“如何进行血糖自我监测”两方面的教育。护士对患者进行“糖尿病对机体的危害”方面的教育是想改善患者的

A. 知识

B. 态度

C. 情感

D. 技能

E. 能力

【答案】 A

20、患者，男性，32岁，轻度膀胱刺激症状1个月就诊，尿常规检查：白细胞4~5个/HP，红细胞2~3个/HP；尿结核菌培养阳性。此时可以诊断为

A. 慢性肾盂肾炎

B. 肾结核

C. 慢性膀胱炎

D. 尿道炎

E. 前列腺炎

【答案】 B

21、患者，男性，77岁，不慎跌倒时以手掌撑地，造成Colles骨折。造成该患者骨折的原因为



- A. 间接暴力
- B. 直接暴力
- C. 肌肉牵拉
- D. 骨骼劳损
- E. 病理性骨折

【答案】 A

22、女性，68岁，因右腿外展型股骨颈骨折入院，拟行保守治疗。牵引期间，护士可以指导病人进行右侧患肢

- A. 膝关节伸屈活动
- B. 髋关节伸屈活动
- C. 股四头肌等长运动
- D. 助力运动
- E. 手法治疗

【答案】 C

23、张女士，70岁，独居。双手腕、掌指、肘关节疼痛、肿胀，时轻时重，病程约25年，诊断为“类风湿性关节炎”。护理体检发现，患者双手呈天鹅颈样畸形，饮食起居困难。评估该患者致病因素可不考虑的是

- A. 遗传因素
- B. 自身免疫反应
- C. 寒冷、潮湿环境
- D. 疲劳、精神创伤
- E. 细菌感染

【答案】 D

24、患者，男性，35岁。尺骨骨折，小夹板固定。下列护理措施哪项正确

- A. 固定患肢应平放
- B. 主诉疼痛、麻木者给止痛药
- C. 复位后3~4日内严密观察血液循环情况和调整绷带松紧度
- D. 若调整布带，要全部一次解开，重绑扎
- E. 夹板固定后，禁止肢体活动，以免错位

【答案】 C

25、男性，55岁，主诉间断性腹痛2月余，疼痛为阵发性绞痛，可自行缓解，或用热水袋热敷后缓解，有时可见到腹部“起包”腹胀。大便有时不正常。在外院以胃肠炎治疗，无明显效果。查体：腹平坦，右上腹轻压痛，似可触及包块，质地中度硬，可活动，肝区叩痛(+)，Murphy征阴性，肠鸣音稍活跃。化验WBC $5.7 \times 10^9$

- A. 胆绞痛
- B. 胃肠道痉挛
- C. 慢性不全性肠梗阻
- D. 饥饿痛
- E. 腹腔神经丛刺激

【答案】 C

26、患者，男性，36岁。3小时前髌部被汽车撞伤，伤后不能自行排尿。查体：血压110/75mmHg，体温37.8℃。下腹膨隆，会阴部肿胀，紫红色瘀斑，直肠指诊：直肠前方软感，前列腺尖部浮动，导尿管不能插入膀胱。骨盆X线检查示有耻骨骨折。因条件限制，目前无法安排急诊手术，当前最恰当的处理措施是

- A. 输注利尿剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/527015135046006041>