

产房业务学习知识考核

一、选择题

1. 电子胎心监护一般监护多长时间 () [单选题] *

A 10 分钟

B 20 分钟✓

C 30 分钟

D 40 分钟

2. NST 反应型是指监护时间内出现 () 次或以上的胎心加速[单选题] *

A 1

B 2✓

C 3

D 4

3. 妊娠 32 周前，加速在基线水平上 > () 次/分钟，持续时间 > () 秒已证明对胎儿正常宫内状态有足够的预测价值[单选题] *

A 10 10✓

B 5 10

C 10 20

D 20 20

4. 晚期减速的最低点通常 () 于宫缩峰值[单选题] *

A 延迟✓

B 同步

C 提前

D 伴随

5. CST 图形结果判读主要基于是否出现 () 减速[单选题] *

A 早期

B 晚期✓

C 变异

D 中期

6. 电子胎心监护图形的完整描述不包括下列 () [单选题] *

A 基线

B 基线变异

C 胎动✓

D 宫缩

依赖于第 2 题第 1;3;4 个选项

7. 胎儿预后的最好预测指标为 () [单选题] *

A 变异✓

B 宫缩

C 胎心

D 减速

8. 早期减速常发生的时间和临床意义 () [单选题] *

A 第一产程末期, 宫缩时脐带受压引起

B 第二产程末期, 抬头受压引起

C 第一产程末其，抬头受压引起✓

D 第一产程潜伏期，宫缩是脐带受压引起

9. 胎儿心动过速指胎心基线 () [单选题] *

A 大于 140 次/分

B 大于 160 次/分✓

C 大于 180 次/分

D 大于 200 次/分

10. 胎儿生物物理评分结果判定为 9 分，以下结论正确的是 () [单选题] *

A 正常✓

B 不确定

C 异常

D 视为异常，需进一步评估

11. 关于胎儿生长受限正确的是 () [单选题] *

A. 足月胎儿出生体重 < 2000g

B. 胎儿体重低于同孕龄平均体重的 3 个标准差

C. 胎儿体重低于同孕龄体重第 5 百分位数

D. 胎儿发育指数正常值为 > +3

E. 宫高、腹围连续 3 周测量在第 10 百分位数以下为筛选 FGP 的指标✓

12. 胎儿生长受限的治疗原则是 () [多选题] *

A、积极寻找病因✓

B、补充营养✓

C、改善胎盘循环✓

D、加强胎儿监测✓

E、适时终止妊娠✓

13. FGR 胎儿宫内监护常用方法 () [多选题] *

A.胎动计数✓

B.胎心监护✓

C.超声多普勒血流✓

D.BBP

14. 低出生体重儿被定义为足月胎儿分娩时的体重小于 () [单选题] *

A. 2000g

B. 2800g

C. 2500g✓

D. 2300g

15. 胎儿生长受限的病因中最常见的是 () [单选题] *

A、孕妇因素✓

B、胎儿因素

C、脐带因素

D、胎盘因素

16. 下列关于胎儿生长受限的处理哪项不正确 () [单选题] *

A、治疗越早效果越好

B、分娩方式应选择阴道分娩✓

C、胎儿未足月，促胎肺成熟后再终止妊娠。

D、孕期补充营养物质

依赖于第 2 题第 4 个选项

17. 胎儿生长受限最常见的病因是 () [单选题] *

- A、臀先露
- B、高龄初产
- C、妊娠期高血压疾病✓
- D、胎盘早剥
- E、宫内感染

依赖于第 2 题第 4 个选项

18. 胎儿生长受限的分类有 () [多选题] *

- A、内因性匀称型 FGR✓
- B、外因性不匀称型 FGR✓
- C、完全性 FGR
- D、外因性匀称型 FGR✓
- E、部分性 FGR

依赖于第 2 题第 4 个选项

19. 胎儿生长受限的治疗原则是 () [多选题] *

- A、积极寻找病因✓
- B、补充营养✓
- C、改善胎盘循环✓
- D、加强胎儿监测✓
- E、适时终止妊娠✓

依赖于第 2 题第 4 个选项

20. 关于胎儿生长受限的治疗下列说法错误的是 () [单选题] *

- A、卧床休息、吸氧
- B、母体静脉营养
- C、使用硫酸镁治疗
- D、一经确诊，马上终止妊娠✓
- E、使用丹参

依赖于第 2 题第 4 个选项

21. 职业暴露处置要求？ () [多选题] *

- A、患者没有传染病可以不用报
- B、现场处置一挤二冲三消毒✓
- C、24 小时上报院感科✓
- D、护士工作站进行网络上报✓

22. 助产士职业暴露因素：() [多选题] *

- A、物理因素✓
- B、化学因素✓
- C、生物因素✓
- D、社会心理因素✓

23. 职业暴露后应检查内容：() [多选题] *

- A、乙肝两对半梅毒✓
- B、HIV✓
- C、血常规
- D、凝血

E、HCV✓

24. 职业暴露应该在___内网络直报？（ ）[单选题] *

A . 12 小时

B . 6 小时

C . 24 小时✓

D. 48 小时

E . 72 小时

依赖于第 2 题第 1;2;3;4 个选项

25. 发生针刺伤时应了解当事人哪些情况？（ ）[多选题] *

A . 相关的传染病史✓

B.免疫接种情况、✓

C.针头和锐器损伤部位✓

D.体液血液暴露情况✓

E.现场处理情况✓

依赖于第 2 题第 1;2;3;4 个选项

26. 皮肤黏膜一旦不慎被针头等锐器刺伤，应立即：（ ）[单选题] *

A、伤口旁端轻轻挤压，尽可能挤出损伤处的血液✓

B、止血

C、立即涂消毒液

D、反复用生理盐水冲洗干净

依赖于第 2 题第 1;3;4 个选项

27. 节假日发生职业暴露时，急诊应向___汇报（ ）[单选题] *

A、护士长

B、总值班✓

C、院感科

D、检验科

依赖于第 2 题第 1;3;4 个选项

28. 安全注射要素正确的是？（ ） [多选题] *

A 可口服不注射，可注射不输液✓

B 强化疫苗接种如乙肝疫苗、新冠疫苗✓

C 严格无菌操作，一人一针一管✓

D 回套针帽是常规操作

依赖于第 2 题第 1;3;4 个选项

29. 有关产后出血的定义，正确的是（ ） [单选题] *

A.分娩过程中出血量达 500ml 以上

B.胎盘娩出后阴道流血达 500ml 以上

C.胎儿娩出后 12 小时内，阴道流血达 500ml 以上

D.胎儿娩出后 24 小时内，阴道流血达 500ml 以上✓

30. 休克指数=（ ） [单选题] *

A.收缩压/脉率

B.脉率/收缩压✓

C.脉率/舒张压

D.舒张压/脉率

31. 宫缩乏力所致产后出血，最简便有效的措施是（ ） [单选题] *

A.按揉子宫✓

B.注射宫缩剂

C.填塞子宫

D.子宫切除

32. 肺栓塞不包括 () [单选题] *

A 羊水栓塞

B 空气栓塞

C 脂肪栓塞综合征

D 深部静脉血栓形成✓

33. 引起肺栓塞的血栓几乎不来自 () [单选题] *

A 左心腔✓

B 右心腔

C 下肢深静脉

D 上腔静脉径路

34. 孕 34 周，因间有下肢浮肿来诊，血压 140/90mmHg 浮肿 (+)，余正常。诊断为 () [单选题]

*

A.妊娠期高血压疾病

B.子痫前期✓

C.正常妊娠

D.妊娠蛋白尿

依赖于第 2 题第 1;3;4 个选项

35. 重度子痫前期孕妇产于孕晚期出现腹痛及阴道流血，最可能的疾病为 () [单选题] *

A、Ⅲ度胎盘早剥✓

B、边缘性前置胎盘

C、宫颈癌

D、脐带帆状附着前置血管破裂

36. 重度子痫前期孕妇应用硫酸镁治疗时，尿量每小时不应少于（ ）[单选题] *

A.20ml

B.25ml✓

C.30ml

D.35ml

37. 羊水栓塞最早出现的症状是（ ）[单选题] *

A 急性肾衰

B 急性呼吸衰竭✓

C 急性左心衰

D 急性 DIC

38. 羊水栓塞的前驱症状不包括（ ）[单选题] *

A 产妇突然寒战、呛咳

B 气急、烦躁不安

C 恶心、呕吐

D 腹痛✓

B

1. 危重患者是指（ ）[单选题] *

A、大手术后出现并发症的患者

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/527051165132006036>