专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

陕西省米脂县2024年《执业药师之西药学专业二》考试及答案【有一套】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.（2020年真题）可用于治疗乙型肝炎病毒感染的药物是

A：金刚烷胺

B：更昔洛韦

C：阿昔洛韦

D：恩替卡韦

答案：D

2.胺碘酮抗心律失常的作用机制是

A：阻滞多种钾通道，延长动作电位的时程和有效不应期

B：加快浦肯野纤维和窦房结的传导速度

C：提高窦房结和浦肯野纤维的自律性

D：缩短心房和浦肯野纤维的动作电位时程、有效不应期

答案：A

3.（2020年真题）患者，女，72岁。持续性心房颤动，为预防脑卒中，宜选用的药物是

A：氯吡格雷

B：华法林

C：奥美拉唑

D：双氯芬酸

答案：B

4.属于M胆碱受体阻断剂的平喘药是()

A：孟鲁司特

B：沙美特罗

C：茶碱

D：噻托溴铵

答案：D

5.对于急性红斑、水疱可选择的剂型不包括

A：洗剂

B：乳膏剂

C：粉剂

D：油剂

答案：B

6.（2018年真题）肾病综合征患者长期使用泼尼松时，用法为隔日清晨给药一次，这种给药方法的原理是（）

A：利用人体糖皮质激素分泌的昼夜节律性原理

B：利用糖皮质激素与盐皮质激素互为补充的原理

C：利用糖皮质激素的脉冲式分泌原理

D：利用外源性糖皮质激素的生物等效原理

答案：A

7.对甲硝唑无效或禁忌的肠外阿米巴病患者可选用

A：替硝唑

B：依米丁

C：喹碘仿

D：氯喹

答案：D

8.氟尿嘧啶、卡培他滨属于()

A：二氢叶酸还原酶抑制剂

B：胸腺核苷合成酶抑制剂

C：核苷酸还原酶抑制剂

D：DNA多聚酶抑制剂

答案：B

9.（2017年真题）应用维生素B12治疗巨幼红细胞性贫血48小时内，应监测的电解质是（）

A：锂

B：钙

C：钠

D：钾

答案：D

10.血浆半衰期最长的强心苷类药物是

A：多巴酚丁胺

B：地高辛

C：洋地黄毒苷

D：米力农

答案：C

11.属于植物制剂，用于治疗前列腺增生的药物是

A：哌唑嗪

B：普适泰

C：非那雄胺

D：十一酸睾酮

答案：B

12.常引起体位性低血压的是

A：普适泰

B：十一酸睾酮

C：非那雄胺

D：哌唑嗪

答案：D

13.对于急性白血病在一线耐药时使用，但作为二线用药的药物是

A：多柔比星

B：柔红霉素

C：表柔比星

D：吡柔比星

答案：A

14.与体内过氧化物和自由基结合,保护细胞中含疏基的蛋白质和酶,参与多种有毒物质解毒反应的药物是

A：多烯磷脂酸胆碱

B：葡醛内酯

C：还原型谷胱甘肽

D：甘草酸二铵

答案：C

15.（2021年真题）由于氧吡格置部分经CYP2C19转化为活性代谢物，合用控制此酶活性的药物会降低氯吡格雷的疗效，故不推荐与氯吡格雷合用的质子泵抑制剂是（）

A：兰索拉唑

B: 奥美拉唑

C: 泮托拉唑

D: 雷贝拉唑

答案：B

16.抑制胸腺核苷酸合成酶

A: 甲氨蝶呤

B: 羟基脲

C: 氟尿嘧啶

D: 阿糖胞苷

答案：C

17.可使吲达帕胺利尿作用增强的是

A: 考来烯胺

B: 多巴胺

C: 胺碘酮

D: 拟交感药

答案：B

18.多日化疗所致恶心及呕吐的药物预防方案是

A: 建议用单一药物，如地塞米松、5-HT3 受体阻断剂或多巴胺受体阻断剂(如甲氧氯普胺)预防呕吐

B: 推荐第 1 天采用 5-HT3 受体阻断剂联合地塞米松，第 2 和第 3 天继续使用地塞米松

C: 推荐化疗前用三药方案，包括单剂量 5-HT3 受体阻断剂、地塞米松和 NK-1 受体阻断剂

D: 在化疗期间每日使用 HT3 受体阻断剂，地塞米松应连续使用至化疗结束后 2～3 天，必要时可以考虑加入阿瑞匹坦

答案：D

19.适用于Ⅱa、Ⅱb型及家族性杂合子的高脂蛋白血症，但有特殊臭味和刺激性的是

A: 洛伐他汀

B: 考来烯胺

C: 考普罗布

D: 烟酸

答案：B

20.在肠内吸收水分后膨胀形成胶体，使肠内容物变软，体积增大，反射性增加肠蠕动而刺激排便的是

A: 甘油

B: 聚乙二醇4000

C: 乳果糖

D: 酚酞

答案：B

21.雷尼替丁在使用中应注意

A: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗

B: 对食管有刺激性，需整片吞服

C: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用

D: 糖尿病患者避免使用

答案：D

22.与细菌核蛋白体的30s亚基结合，抑制细菌蛋白质合成的是

A: 青霉素

B: 万古霉素

C: 林可霉素

D: 四环素

答案：D

23.与阿托品比较，东莨菪碱的特点是

A: 对眼的作用强

B: 对有机磷中毒解救作用强

C: 中枢镇静作用较强

D: 对胃肠道平滑肌作用强

答案：C

24.患者，女，42 岁。双掌指关节、腕关节肿痛伴晨僵 1 月，诊断为类风湿关节炎，给予抗风湿药治疗，下列不属于该类药物的是

A: 依那西普

B: 司来吉兰

C: 糖皮质激素

D: 萘普生

答案：B

25.抗真菌药与糖皮质激素合用于皮肤病，感染症状消失后，应

A: 再持续使用 48h

B: 再持续 1～2 周

C: 立即停药，不得再用

D: 再持续使用 1 个月

答案：B

26.入睡困难患者首选哪种催眠药物

A: 艾司唑仑

B: 谷维素

C: 氯硝西泮

D: 劳拉西泮

答案：A

27.关于乙酰半胱氨酸的说法,错误的是()

A: 乙酰半胱氨酸能减弱青霉素类、头孢菌素类四环素类药物的抗菌活性

B: 乙酰半胱氨酸能裂解脓痰中糖蛋白多肽链中的二硫键,使浓痰易于咳出

C: 对痰液较多的患者,乙酰半胱氨酸可与中枢性镇咳药合用增强疗效

D: 乙酰半胱氨酸可用于对乙酰氨基酚中毒解救

答案：C

28.可使维生素B

A: 糖皮质激素

B: 雌激素

C: 丙磺舒

D: 异烟肼

答案：B

29.头孢克洛不宜用于

A: 脑膜炎

B: 中耳炎

C: 呼吸道感染

D: 泌尿系统感染

答案：A

30.抑制 H+，K+-ATP 酶活性的药物是

A：奥美拉唑

B：雷尼替丁

C：哌仑西平

D：氢氧化铝

答案：A

31.血管紧张素转化酶 I 抑制剂是()

A：地高辛

B：米力农

C：多巴酚丁胺

D：依那普利

答案：D

32.顺铂

A：干扰 RNA 转录

B：干扰核酸生物合成

C：影响蛋白质合成和功能

D：直接破坏 DNA 结构和功能

答案：D

33.骨化三醇可引起高钙血症，在服药后应监测血钙和血肌酐浓度，首次监测的时间建议是

A：服药后第 6 个月

B：服药后第 3 个月

C：服药后第 4 周

D：服药后第 2 周

答案：C

34.抑制碳酸酐酶的药物是

A：氢氯噻嗪

B：呋塞米

C：氨苯蝶啶

D：乙酰唑胺

答案：D

35.有机磷酸酯中毒的解救宜选用

A：多潘立酮

B：纳洛酮

C：阿托品

D：鱼精蛋白

答案：C

36.（2020年真题）餐后1~2小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

A：枸橼酸铋钾

B：兰索拉唑

C：米索前列醇

D：铝碳酸镁

答案：D

37.患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结1/18，免疫组化：ER（-），PR（-），Her(+)。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多柔比星的说法中错误的是

A：属于蒽环类抗肿瘤药物

B：典型不良反应是骨髓抑制和心脏毒性

C: 曾用过表柔比星的患者可更换多柔比星

D: 对增殖和非增殖细胞均有杀伤作用

答案：C

38.患者，女，49岁。身高164cm，体重55kg，因更年期月经不调，经药物治疗效果不佳，而行“子宫切除术”。无药物过敏史。

A: 阿奇霉素

B: 左氧氟沙星

C: 克林霉素

D: 头孢西丁

答案：D

39.关于他汀类药物降脂特点的描述，错误的是

A: 降低血总胆固醇(TC)

B: 降低血低密度脂蛋白固醇(LDL-ch)

C: 较弱的降低三酰甘油(TG)的作用

D: 降低高密度脂蛋白固醇(HDL-ch)

答案：D

40.伐昔洛韦口服后在肝脏水解为

A: 阿昔洛韦

B: 西多福韦

C: 喷昔洛韦

D: 更昔洛韦

答案：A

41.（2015年真题）通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品是（）。

A：氯喹

B：噻嘧啶

C：哌嗪

D：青蒿素

答案：C

42.头孢唑林

A：脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

B：用于非典型病原体感染

C：与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

D：肾毒性较大

答案：D

43.噻嗪类利尿药中，属于水溶性的药物是()

A：苄噻嗪

B：氯噻嗪

C：氢氯噻嗪

D：氢氟噻嗪

答案：B

44.可诱发哮喘且变异型心绞痛不宜选用的药物是

A：普萘洛尔

B：硝苯地平

C：硝酸甘油

D：洛伐他汀

答案：A

45.不属于中枢性镇咳药典型不良反应的是

A: 成瘾性
B: 腹泻
C: 心率增快
D: 情绪激动
答案：B

46.可使尿酸浓度升高，引起关节痛的药物是
A: 吡嗪酰胺
B: 异烟肼
C: 红霉素
D: 乙胺丁醇
答案：A

47.维生素C可使其代谢降低，作用增加的是
A: 糖皮质激素
B: 异烟肼
C: 雌激素
D: 丙磺舒
答案：A

48.在血液中几乎不与血浆蛋白结合的口服降糖药是
A: 二甲双胍
B: 达格列净
C: 罗格列酮
D: 吡格列酮
答案：A

49.可导致新生儿的戒断症状和呼吸抑制的是

A: 沙丁胺醇

B: 氨茶碱

C: 可待因

D: 布地奈德

答案：C

50.治疗支原体肺炎、军团菌病、百日咳和白喉带菌者首选

A: 氯霉素

B: 链霉素

C: 红霉素

D: 庆大霉素

答案：C

51.下列药物组合有协同作用的是

A: 青霉素+四环素

B: 青霉素+庆大霉素

C: 青霉素+螺旋霉素

D: 青霉素+氯霉素

答案：B

52.对痉挛性和功能性便秘者，可选用

A: 双歧杆菌

B: 酪酸菌

C: 双歧三联活菌胶囊

D: 地芬诺酯

答案：A

53.β-内酰胺类抗生素的主作用靶位是()

A: DNA 螺旋酶

B: 细菌细胞膜上特殊蛋白 PBPs

C: 细菌核糖体 50S 亚基

D: 二氢叶酸合成酶

答案：B

54.可促进子宫颈成熟的药物有松弛子宫颈管，促进宫颈成熟，使宫口开大，缩短分娩时间，提高引产成功率等作用的药物是

A: 地诺前列酮

B: 麦角新碱

C: 普拉睾酮

D: 缩宫素

答案：C

55.属于多巴胺受体阻断剂的止吐药是

A: 维生素 B6

B: 阿瑞吡坦

C: 托烷司琼

D: 甲氧氯普胺

答案：D

56.（2015 年真题）使用螺内酯的心力衰竭患者，不宜选用的药品是（）。

A: 硫酸镁

B: 果糖

C: 氯化钾

D: 氯化钙

答案：C

57.（2016 年真题）用于治疗低磷血症的药物是

A：葡萄糖

B：碳酸钙

C：二磷酸果糖

D：三磷酸腺苷

答案：C

58.高浓度使细胞膜的渗透性增加，钾离子和其他内容物漏出，细胞死亡的是

A：环吡酮胺

B：制霉菌素

C：阿莫罗芬

D：特比萘芬

答案：A

59.（2017 年真题）属于芳香酶制剂抗肿瘤药是（）

A：炔雌醇

B：他莫昔芬

C：阿那曲唑

D：氟他胺

答案：C

60.可与奎尼丁发生与 P 糖蛋白有关的相互作用的药物是()

A：华法林

B：达比加群酯

C：低分子肝素

D：肝素钠

答案：B

61.利尿作用极弱，具有降低眼压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

A: 氢氯噻嗪

B: 螺内酯

C: 呋塞米

D: 乙酰唑胺

答案：D

62.以下哪种心律失常禁用强心苷

A: 室上性心动过速

B: 心房颤动

C: 心房扑动

D: 室性心动过速

答案：D

63.男性，70岁，进食后饱胀不适伴反酸5年余，黑便1天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1期）伴出血。

A: 胶体果胶铋胶囊

B: 埃索美拉唑

C: 克拉霉素

D: 阿莫西林

答案：A

64.厌氧菌引起的肺炎宜选用()

A: 氟康唑

B: 阿奇霉素

C: 克林霉素

D: 万古霉素

答案：C

65.可抑制呼吸、胃肠道运动、引起心动过缓、恶心呕吐的受体是

A: δ 受体

B: μ2 受体

C: μ1 受体

D: K 受体

答案：B

66.青霉素治疗何种疾病时可引起吉海反应

A: 大叶性肺炎

B: 破伤风

C: 回归热

D: 梅毒和钩端螺旋体病

答案：D

67.属于碳酸酐酶抑制剂的药物是

A: 布林佐胺

B: 奥布卡因

C: 阿托品

D: 拉坦前列素

答案：A

68.患者，男性 35 岁，大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是

A: 林可霉素

B: 哌拉西林

C：庆大霉素

D：氯霉素

答案：B

69.通过分解产生新生态氧而发挥杀菌除臭作用用于治疗痤疮的药物是()

A：维A酸

B：过氧苯甲酰

C：阿达帕林

D：壬二酸

答案：B

70.抑制骨髓造血功能的是

A：四环素

B：氯霉素

C：左氧氟沙星

D：青霉素

答案：B

71.外用糖皮质激素作用强度的比较，正确的是()。

A：地塞米松>卤米松>氯轻松

B：卤米松>地塞米松>氟轻松

C：卤米松>氟轻松>地塞米松

D：地塞米松>氟轻松>卤米松

答案：C

72.下述不能用于治疗痤疮的药物是

A：阿达帕林

B: 过氧苯甲酰

C: 克霉唑

D: 壬二酸

答案：C

73.可致肌痛、骨关节病损、跟腱断裂的药物

A: 氨基糖苷类

B: 大环内酯类

C: 氟喹诺酮类

D: 四环素类

答案：C

74.能与胰岛素竞争血浆蛋白，升高胰岛素血浆浓度的是

A: 普萘洛尔

B: 甲状腺素

C: 磺胺甲唑

D: 格列喹酮

答案：C

75.复方地芬诺酯是

A: 抗分泌药

B: 抗动力药

C: 微生态制剂

D: 吸附剂

答案：B

76.呋塞米的适应证不包括

A: 高钠血症

B: 高钾血症

C: 充血性心力衰竭

D: 高血压危象

答案：A

77.双香豆素与苯巴比妥合用可

A: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱

B: 产生协同作用

C: 竞争性对抗

D: 与其竞争结合血浆蛋白

答案：A

78.具有预防和逆转血管平滑肌增厚及左心室肥厚的抗高血压药物是

A: 呋塞米

B: 氨氯地平

C: 卡托普利

D: 阿利克伦

答案：C

79.糖皮质激素隔日疗法药量变化的为

A: 药量减少二分之一

B: 药量减少三分之一

C: 药量减少至三分之一

D: 维持原来的药量

答案：D

80.中枢性或肾性尿崩症可选用

A: 氢氯噻嗪

B: 乙酰唑胺

C: 呋塞米

D: 螺内酯

答案：A

81.可用于肝性脑病的治疗的是

A: 复方氨基酸注射液（18AA）

B: 复方氨基酸注射液（3AA）

C: 赖氨酸

D: 精氨酸

答案：D

82.头孢曲松

A: 用于非典型病原体感染

B: 肾毒性较大

C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案：C

83.患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

A: 心肝肾功能严重障碍者

B: 骨髓功能抑制者

C: 妊娠期妇女

D: 慢性胃炎

答案：D

84.属于第二代 CCB 的是

A: 氨氯地平

B: 左旋氨氯地平

C: 乐卡地平

D: 硝苯地平控释片

答案：D

85.治疗立克次体感染选用

A: 多西环素

B: 红霉素

C: 庆大霉素

D: 磺胺嘧啶

答案：A

86.治疗普通型奈瑟球菌脑膜炎是()

A: 柳氮磺吡啶

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 磺胺嘧啶

D: 磺胺米隆

答案：C

87.可使人体对维生素 B2 的需求增加的是

A: 丙磺舒

B: 雌激素

C: 异烟肼

D: 糖皮质激素

答案：A

88. 茶碱浓度 20μg/ml 时会出现

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/527131166064010026