

2024 贵州省黔西县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试完整版含答案（轻巧夺冠）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于 C 级高危药品的是

- A: 全胃肠外营养液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 血液透析液
- D: 5%葡萄糖注射液

答案：C

2. 服用地西泮等苯二氮

- A: 浓茶
- B: 烟
- C: 酒
- D: 咖啡

答案：B

3. 提供的药物信息和建议是否均来自受过专门药学培训的合格人员，是衡量互联网信息的

- A: 合理性
- B: 归因性
- C: 新颖性
- D: 权威性

答案：D

4. 患者，男，65 岁。因“不稳定型心绞痛急性发作”入院治疗。医生建议服用阿司匹林，正确的用量与用法是

A: 25~50mgqd，长期维持

B: 100-150mgqd，长期维持

C: 首次口服非肠溶制剂或嚼服肠溶制剂 300mg；随后 75~100mgqd，长期维持

D: 75~100mgbid，长期维持

答案：C

5. 老年患者对低血糖的耐受能力差，不建议使用的降糖药是

A: α -葡萄糖苷酶抑制剂

B: 磺酰脲类促胰岛素分泌剂

C: 胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 类似物

D: 二肽基肽酶-4 (DPP-4) 抑制剂

答案：B

6. 及时发现重大药害事件，即可防止药害事件的蔓延和扩大；说明 ADR 监测的意义是

A: 促进临床合理用药

B: 促进新药的研制开发

C: 减少 ADR 的危害

D: 为“药品召回”提供依据

答案：C

7. 氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是

A: 神经系统疾病

B: 肌病

C: 血液系统疾病

D: 胃肠道疾病

答案：A

8. 有幻觉副作用，不宜与右美沙芬合用的药物是

A: 匹伐他汀

B: 铝碳酸镁

C: 多奈哌齐

D: 美金刚

答案：D

9. 正常成人血清尿素氮(BUN)的正常参考区间为():

A: 3.8~6.1mmol/L

B: 3.2~7.1mmol/L

C: 2.2~5.1mmol/L

D: 1.8~6.5mmol/L

答案：B

10. (2017 年真题) 高蛋白饮食在肠内产生氨基酸会影响其吸收、降低疗效的药物是()

A: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊

B: 非洛地平片

C: 维 A 酸片

D: 左旋多巴片

答案：D

11. 万络(罗非昔布)撤市是发现大剂量服用万络者患心肌梗死和心脏猝死的危险增加了 3 倍; 此例体现了药物警戒的作用包括

- A: 发现药品说明书问题
- B: 药品上市前风险评估
- C: 发现与规避假、劣药流入市场
- D: 药品上市后风险评估

答案：D

12. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

- A: 阿嗝米特肠溶片
- B: 奥美拉唑
- C: 乳酶生
- D: 多潘立酮片

答案：C

13. 睡前服用，可使抑制肝脏合成胆固醇效果更好的药品是

- A: 瑞舒伐他汀片
- B: 二甲双胍片
- C: 复方铝酸铋片
- D: 甲氧氯普胺片

答案：A

14. 食入何种物质对抗高血压药有影响

- A: 食盐
- B: 蛋白质
- C: 食醋
- D: 脂肪

答案：A

15. 不能解除病因，不宜长期服用的；但对慢性钝痛如牙痛、头痛、关节痛等有较好的镇痛效果药物是

- A: 地西泮
- B: 谷维素
- C: 罗通定
- D: 阿司匹林

答案：D

16. 除胰岛素分泌过多外，主要引起血糖低于正常参考区间低限的疾患是

- A: 颅内压增高、颅脑外伤
- B: 肝功能亢进
- C: 激素分泌功能衰退
- D: 激素分泌功能亢进

答案：C

17. 针对该患者的现有症状,应选用的药物是 ()

- A: 奥美拉唑肠溶胶囊
- B: 布地奈德吸入剂
- C: 单硝酸异山梨酯缓释片
- D: 多潘立酮片

答案：A

18. 服药时进食高脂肪食物可促进药物吸收的是

- A: 维生素 A
- B: 西咪替丁
- C: 硫酸亚铁

D: 格列本脲

答案：A

19. 有关药学服务的“基本要素”，以下说法最正确的是

A: 提供药学专业知识

B: 为公众服务

C: 提供药物信息和知识

D: “与药物有关”的服务

答案：D

20. 长期大量应用容易导致体重明显增加的是

A: 酮替芬

B: 色甘酸钠

C: 氯雷他定

D: 盐酸异丙嗪

答案：A

21. 癫痫持续状态的好发年龄段为（）

A: 6 岁以内

B: 1 岁以内及 65 岁以上

C: 65 岁以上

D: 55 岁以上

答案：B

22. （2018 年真题）使用肝素静脉滴注期间需监测的指标是（）

A: APTT

B: ALT

C: INR

D: RBC

答案：A

23. 结核病化学治疗成功的关键措施是

A: 避免与克服细菌耐药

B: 采用短程疗法

C: 采用大剂量

D: 采用间歇疗法

答案：A

24. 以下所列药物中，推荐用于治疗三叉神经痛的首选处方药是

A: 苯噻啶

B: 卡马西平

C: 舒马曲坦

D: 地西泮

答案：B

25. 成人静脉血白细胞计数的正常范围值

A: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9/L$

B: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$

C: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

D: $(10.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$

答案：B

26. 应用铁剂的影响因素正常人对铁剂的吸收率为

A: 0.4

B: 10%~20%

C: 10%~30%

D: 0.3

答案：B

27. 关于丁螺环酮治疗焦虑症的优点，下列说法不正确的为

- A: 无呼吸抑制
- B: 镇静作用轻
- C: 起效快
- D: 较少引起运动障碍

答案：C

28. 可卡因属于兴奋剂中的

- A: 麻醉药品
- B: 利尿剂
- C: β 受体阻断剂
- D: 精神刺激剂

答案：D

29. 容易水解的药物是

- A: 阿扑吗啡
- B: 牛痘菌苗
- C: 胃蛋白酶
- D: 青霉素类

答案：D

30. 导致血糖异常、糖尿病的是

- A: 阿托伐他汀
- B: 己烯雌酚
- C: 加替沙星

D: 罗非昔布

答案: C

31. 根据药物对胎儿的危害,美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别,正常剂量维生素 D 的妊娠毒性分级是()

A: C 级

B: D 级

C: X 级

D: A 级

答案: D

32. 下列关于乙型肝炎病毒“大三阳”的表述,正确的是

A: 乙型肝炎血清免疫学检查表现为 HBsAg、HBeAb 和 HBcAb 阳性

B: 不具有传染性

C: 如果肝功能正常,可定期监测,不需要抗病毒治疗

D: 提示乙肝病毒在体内复制活跃,具有传染性,需要隔离

答案: D

33. 患者,女,64 岁,患 2 型糖尿病、高脂血症,给予二甲双胍肠溶片 0.59tidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用

B: 一旦出现低血糖症状,应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等

C: 瑞格列奈片应于餐前服用

D: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何固定时间给药

答案: A

34. 服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良,最佳用药时间是

- A: 餐后 1h
- B: 餐前
- C: 餐前 0.5~1h
- D: 餐后

答案：C

35. (2017 年真题) 患者女 45 岁, 既往有心律失常 (Q-T 间期延长)、低钾血症近日因发热、咳嗽、咳痰就诊, 诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是 ()

- A: 莫西沙星
- B: 氨溴索
- C: 阿莫西林
- D: 头孢呋辛酯

答案：A

36. 季节性过敏性鼻炎主要的诱因是

- A: 季节
- B: 尘埃
- C: 花粉
- D: 真菌

答案：C

37. 治疗过敏性结膜炎可选用的药物是 ()

- A: 色甘酸钠滴眼液
- B: 氧氟沙星滴眼液
- C: 羟甲基纤维素钠滴眼液
- D: 酞丁安滴眼液

答案：A

38. 药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

- A: 查阅时需要利用所提供参考文献去验证
- B: 提供的信息最新
- C: 内容广泛、使用方便
- D: 很方便地对所需要的信息资料进行筛选

答案：B

39. 以下所列病症中，依据"血淀粉酶超过正常值"可以诊断的是

- A: 肾病综合征
- B: 高血压
- C: 高脂血症
- D: 急性胰腺炎

答案：D

40. 心衰导致药物经肾排泄减少

- A: 肾小管分泌减少
- B: 肾小球滤过减少
- C: 肾小管重吸收增加
- D: 肾血流量减少

答案：D

41. (2018 年真题) 患者,男,59 岁,高血压病史 5 年,因头痛伴有恶心、呕吐就诊,MRI 检查结果显示蛛网膜下腔出血。为防治脑血管痉挛,早期宜选用的药物 ()

- A: 尼莫地平

B: 硝苯地平

C: 缬沙坦

D: 氨氯地平

答案：A

42. 患者，男，46 岁。胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝、肾功能正常，化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

A: 在葡萄糖溶液中稳定

B: 与氯化钠存在配伍禁忌

C: 遇冷可加重其神经毒性

D: 其神经毒性与剂量大小无关

答案：D

43. 卡托普利主要通过下列哪项而起抗慢性心功能不全的作用

A: 抑制血管紧张素转化酶

B: 拮抗钙

C: 扩张血管

D: 利尿降压

答案：A

44. 贮存温度在 2℃ 以上时，温度越低，对多数药品保管越有利。降钙素鼻喷雾剂说明书标明“冷处”贮存，其贮存条件是指

A: 温度在 10℃～30℃ 之间

B: 温度不超过 20℃

C: 温度在 2℃～10℃ 之间

D: 避光，温度不超过 -5℃

答案：C

45. (2017 年真题) 配制青霉素输液的适宜溶媒是 ()

- A: 复方氯化钠注射液
- B: 0.9%氯化钠注射液
- C: 50%葡萄糖注射液
- D: 低分子右旋糖酐注射液

答案: B

46. 乙醇+呋喃唑酮

- A: 产生有利的药物相互作用
- B: 抑制乙醛脱氢酶
- C: 造成听神经和肾功能不可逆性损害
- D: 抑制氧化代谢反应

答案: B

47. 癫痫患者禁用下列哪种抗焦虑药物 ()

- A: 艾司唑仑
- B: 舍曲林
- C: 氯米帕明
- D: 曲唑酮

答案: C

48. 患者，男，35 岁，近日出现足趾间皮肤瘙痒、水泡样皮疹，宜选用的药物是 ()

- A: 甲硝唑栓
- B: 雌三醇乳膏
- C: 酮康唑乳膏
- D: 硝酸咪康唑栓

答案: C

49. 在有关与药物使用的内容中，属于医师用药咨询的主要内容是

- A: 首次剂量、维持剂量以及每日用药次数、间隔与疗效
- B: 用药后预计起效时间、维持时间及疗效
- C: 注射剂配制溶媒、浓度
- D: 合理用药信息

答案：D

50. 患者，男，58岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

- A: 美托洛尔会影响阿司匹林的抗血小板活性，应停用
- B: 如大便次数规律（如每日1次），聚乙二醇4000散可按需使用
- C: 阿托伐他汀钙用于冠心病的治疗，需长期规律用药
- D: 同时使用双氯芬酸钠与阿司匹林会增加消化道出血风险，两药不宜合用

答案：A

51. 患者，男，60岁。因面部出现慢性湿疹到药店购药，药师应推荐的药品是

- A: 10%樟脑软膏
- B: 他克莫司软膏
- C: 利巴韦林软膏
- D: 特比萘芬乳膏

答案：B

52. 含有解热镇痛药的抗感冒药应慎用或禁用于

- A: 妊娠初期及哺乳期妇女

B: 患有心脏病、高血压、甲状腺功能亢进、青光眼、前列腺增生的患者

C: 疲劳和生活规律紊乱者

D: 有血小板减少症、有出血倾向者、上消化道出血和(或)穿孔病史者

答案：D

53. 黏液水肿性昏迷的治疗，首选药物为

A: T

B: T

C: L-T

D: L-T

答案：B

54. 防心绞痛药物

A: 硝酸甘油

B: 去氨加压素

C: 甘草合剂

D: 胃黏膜保护剂

答案：A

55. (2015 年真题) 格列齐特片的适宜服药时间是 ()。

A: 餐中

B: 清晨

C: 餐前

D: 餐后

答案：C

56. 对由营养不良、婴儿期所致的恶性贫血者应选用

- A: 甲磺酸去铁胺
- B: 叶酸+维生素 B
- C: 维生素 K
- D: 富马酸亚铁

答案：B

57. 一些权威性较高的二次文献中，记载做皮肤敏感试验的药品是

- A: 链霉素注射剂
- B: 鱼肝油酸钠注射剂
- C: 玻璃酸酶注射剂
- D: 青霉素钠注射剂

答案：A

58. 属于 B 级的药物是

- A: 沙利度胺
- B: 万古霉素
- C: 葡萄糖
- D: 阿莫西林

答案：D

59. 患者，男，16 岁，因急性细菌性扁桃体炎使用青霉素钠治疗，用药前进行青霉素皮试。关于青霉素皮试液浓度和给药方法的说法正确的是()

- A: 浓度 500U/ml，皮内注射 0.1ml
- B: 浓度 5000U/ml，皮内注射 0.1ml
- C: 浓度 5000U/ml，肌肉注射 0.1ml
- D: 浓度 500U/ml，肌肉注射 0.1ml

答案：A

60. 下列复方制剂中，不具有联合增效意义的是

- A: 磺胺甲噁唑-甲氧苄啶
- B: 左旋多巴-苄丝肼
- C: 口服左氧氟沙星和硫酸亚铁
- D: 头孢哌酮-舒巴坦

答案：C

61. 患者，女，55 岁，因“反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸、胃灼热、间断积食”来诊，食管测压提示食管下段括约肌压力小于 6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑 20mgbid 强化抑酸治疗。

- A: 适宜餐前 30 分钟服用
- B: 长期服用可能会出现维生素 K 缺乏
- C: 用药后可能出现口干、便秘等不良反应
- D: 不宜咀嚼

答案：B

62. 老年人使用可导致甲状腺功能异常、肺毒性或 Q-T 间期延长，不宜作为心房颤动一线用药的是：

- A: 美托洛尔
- B: 福辛普利
- C: 胺碘酮
- D: 地高辛

答案：C

63. 关于头痛、偏头痛、紧张性头痛、三叉神经痛的药物治疗(对症治疗),对钝痛如牙痛、头痛、神经痛等有较好的镇痛效果的是

- A: 乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林等

B: 一般可首选对乙酰氨基酚，推荐合并应用谷维素、维生素 B1

C: 推荐应用地西泮(安定)片

D: 服用麦角胺咖啡因片、罗通定片、天麻素、苯噻啶、舒马曲坦、佐米曲坦

答案：A

64. 为使药物作用与胆固醇合成高峰期同步，普伐他汀等适宜

A: 清晨服用

B: 睡前服用

C: 餐后服用

D: 餐前服用

答案：B

65. 并不存在风险，目前不需采取措施；评判为

A: 确认

B: 验证

C: 待验证

D: 驳倒

答案：D

66. 对抗胆碱阻断的解毒剂是()。

A: 卡马西平

B: 毒扁豆碱

C: 乙酰胺

D: 阿托品

答案：B

67. 治疗严重先兆子痫的首选药物为

- A: 依那普利
- B: 美托洛尔
- C: 硫酸镁
- D: 氢氯噻嗪

答案：B

68. 洗胃液 1：5000～1：10000 高锰酸钾溶液可用于解救哪类药物中毒

- A: 巴比妥类中毒
- B: 3911 中毒
- C: 乐果中毒
- D: 1605 中毒

答案：A

69. 适用于高血压伴前列腺增生症的高血压患者服用的药物是

- A: 阿利吉仑
- B: 多沙唑嗪
- C: 氢氯噻嗪
- D: 阿替洛尔

答案：B

70. 多柔比星的通用名是

- A: 克毒星
- B: 无环鸟苷片
- C: 阿霉素
- D: 病毒唑

答案：C

71. 以下的论述哪项是错误的

- A: 硝普钠可用于高血压危象和慢性心功能不全
- B: 普萘洛尔不可抑制肾素的分泌
- C: 氢氯噻嗪作为基础降压药可单用于轻度高血压，也可与其他降压药合用，提高疗效，减少不良反应
- D: 氢氯噻嗪不可与普萘洛尔合用于治疗高血压

答案：D

72. 主要用于降低三酰甘油的药物是

- A: 普罗布考
- B: 贝丁酸类
- C: 他汀类
- D: 考来烯胺

答案：B

73. 再感染

- A: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同
- B: 宜选用毒性小的抗菌药物
- C: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再次出现菌尿，菌种与上次相同
- D: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次（同一菌株），尿细菌数 $>10^5\text{cfu/ml}$

答案：A

74. 有助于提高医、护、药专业人员对 ADR 的警惕性和识别能力

- A: 促进新药的研制开发
- B: 减少 ADR 的危害
- C: 促进临床合理用药

D: 为临床药物评价提供依据

答案: C

75. 能显示药师的文献评价能力和技巧的是

A: 形成答案并以口头形式提供给询问者

B: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

C: 对问题进行确定并归类

D: 随访了解效果，并建立档案

答案: B

76. 引起视网膜变性而致失明，服药半年左右应查眼底 DMARDs 是

A: 硫唑嘌呤

B: 氯喹

C: 环孢素

D: 利妥昔单抗

答案: B

77. 与对氨基苯甲酸 (PAPB) 化学结构相似，可与 PAPB 竞争二氢叶酸合成酶的药物是

A: 四环素

B: 链霉素

C: 青霉素

D: 磺胺嘧啶

答案: D

78. PDR 是由美国医学经济公司和 ThomsonHealthcare 公司编辑出版的药品集，每年综合汇编 1 册，主要介绍

A: 美国市场上的药品

- B: 美国市场上的常用处方药
- C: 各国市场上的常用处方药
- D: 美国临床常用的药品

答案：B

79. 下列关于肾功能不全患者给药方案调整的方法，错误的是

- A: 肾功能不全而肝功能正常者，可选用经双通道（肝、肾）消除的药物
- B: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以同时服用碳酸氢钠以碱化尿液，促进药物排泄。防止药源性疾
- C: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以延长给药间隔或减少给药剂量
- D: 肾功能不全者首选经肝胆代谢和排泄的药物

答案：B

80. 服用降压避风片、脉君安片、珍菊降压片等降压中成药的患者，必须慎用的化学药品是

- A: 缬沙坦
- B: 螺内酯
- C: 硝苯地平
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

81. 处方的法律性是指

- A: 因开具处方或调配处方所造成的医疗差错或事故，医师和药师分别担负有相应的责任
- B: 处方由前记、正文与后记三部分组成
- C: 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件

D: 处方是药品消耗及药品经济收入结账、患者用药报销的凭证和原始依据

答案：A

82. 对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

A: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片

B: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片

C: 17 β -雌二醇

D: 雌二醇-屈螺酮片

答案：C

83. (致畸药物的种类与危害)可能导致胎儿肢体、耳、内脏畸形的是

A: 孕激素

B: 雄激素

C: 沙利度胺

D: 氮芥类

答案：C

84. 属于抗过敏非处方药的是

A: 氯雷他定

B: 息斯敏

C: 依巴斯汀

D: 异丙嗪

答案：D

85. 脂溶性最高，作用快而短的是

A: 巴比妥

B: 戊巴比妥

C: 硫喷妥

D: 苯巴比妥

答案: C

86. 冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如无用药禁忌证，欲服用阿司匹林进行治疗，最佳剂量范围是（）

A: 25~75mg / d

B: 150~300mg / d

C: 75~150mg / d

D: 25~50mg / d

答案: C

87. 有较强刺激性服药时不可嚼碎的泻药是（）

A: 比沙可啶

B: 硫酸镁

C: 双歧杆菌

D: 干酵母

答案: A

88. 静脉给药用于重度及危重度哮喘治疗的药品是

A: 孟鲁司特

B: 氨茶碱

C: 噻托溴铵

D: 异丙托溴铵

答案: B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/528024076042007022>