

蚌埠医学院2014/2015学年第二学期专业临 床医学

《妇产科试题》试卷

试卷类别:A卷

考试时间:100分钟

系别_____

年级_____

学号_____

姓名_____

说明:该试卷均为选择题,学生将学号,正确答案用2 B铅笔填涂于答题卡上,否则以零分计,考试结束后将试卷和答题卡一并交于监考老师。

单相选择题(在下列各小题的备选答案中,请把你认为正确答案的题号,填入题干的括号内,少选、多选不给分。)

第一章

1、有关女性生殖系统解剖,下列哪项错误:

A. 阴道壁粘膜为复层鳞状上皮,无腺体 B、阴道壁粘膜为
单层鳞状上皮,有

腺体 ;c卵巢表面无腹膜,为一层生发上皮 D、成年妇女宫
颈与宫体比例为1: 2

E、子宫峡部上端为解剖学内口,下端为组织学内口

答案: B

2. 女性生殖器的邻近器官,下列哪项应除外:

A. 膀胱 B、输尿管 C、阑尾 D、乙状结肠 E、
直肠

答案: D

3、保持子宫前倾位置的主要韧带是: ()

A、圆韧带 B、阔韧带 C、卵巢固有韧带 D、主韧
带 E、骨盆漏斗韧带

答案: A

4、有关子宫,哪些描述错误:

- A、成人子宫长约7-8cm, 宽4-5cm, 厚2-3cm
- B、子宫体与子宫颈之间形成最狭窄的部分是子宫狭部
- C、子宫体与子宫颈的比率: 婴儿期1: 2, 成人期2: 1
- D、子宫内膜分基层和海绵层**
- E、成年妇女子宫颈长约3cm

答案: D

第二章

1. 关于月经周期中激素的变化, 下列叙述哪项不正确?

- A. 排卵前24小时左右, FSH出现高峰
- B. 排卵前24小时左右, LH出现陡峰
- C. LH骤降后发生排卵
- D. 雌激素在排卵前后各出现一个高峰

E. 孕激素在排卵前后各出现一高峰

答案: E

2. 行子宫全切及左附件切除时应离断哪些韧带?

- A、双圆韧带、双阔韧带, 左卵巢固有韧带
- B、双圆韧带、双阔韧带、双主韧带、左卵巢固有韧带
- C、双圆韧带、双阔韧带、双主韧带、双子宫骶骨韧带、右卵巢悬韧带、左卵巢固有韧带

D、双圆韧带、双阔韧带、双主韧带、双子宫骶骨韧带、左骨盆漏斗韧带、右卵巢固有韧带

E、双圆韧带、双阔韧带、双子宫骶骨韧带

答案: D

3. 在子宫内膜的腺上皮内出现核下空泡时, 生理上相当于内膜周期的哪一期?

- A、增生早期
- B、增生晚期
- C、排卵期
- D、分泌早期**
- E、分泌晚期

答案: D

4. 患者, 女, 30岁, 月经一直正常, 现在是月经干净后第7天, 宫颈粘液涂片检查结果是典型羊齿状结晶, 表明:

答案: D

- A、月经期
- B、月经前
- C、排卵后
- D、接**

近排卵

E、已妊娠

第三章

1. 胚胎着床的条件错误的是1. A、透明带消失 B、囊胚的细胞滋养细胞分化出合体滋养细胞 C、囊胚和子宫内膜同步发育且功能协调 D、**输卵管通畅** E、孕妇体内分泌足量的孕酮
2. 胎盘的功能包括: A、物质交换 B、防御: 胎盘屏障 C、合成 D、免疫 E、**以上都正确**

答案: E

3、关于妊娠期子宫变化, 错误的是:

- A、妊娠中期开始, 子宫峡部伸展变长, 逐渐形成子宫下段
B、妊娠后期大多数子宫向右旋 C、子宫的血流量在妊娠后期受体位影响
D、**妊娠10周子宫底出盆腔** E、妊娠12-14周后子宫有不规则的无痛

答案: D

4. 下列哪项不属胎儿附属物

- A、胎盘 B、胎膜 C、羊水 D、**蜕膜**
E、脐带

答案: D

第四章

1. 下列哪种方法不能用来诊断早孕:

- A、基础体温为双相, 且高温曲线连续3周不降
B、妊娠免疫试验 C、超声检查 D、**尿雌三醇测定**

E. 肌注黄体酮停药10天无阴道流血

答案: D

3. 孕卵着床最适宜的部位: A、子宫下段 B、子宫腔前后壁 C、子宫侧壁

D、**子宫角** E、子宫颈管

答案: D

3、关于妊娠诊断下列哪项是错误的：

- A、孕早期妇查有黑加氏征 B、黄体酮试验可协助早孕诊断
C、双相型体温的妇女，高温相超过2周时，妊娠的可能性很大
D、孕7周时多普勒可闻及胎心 E、妊娠18—20周时孕妇感觉胎动

答案：D

4.胎儿在宫内的姿势（简称胎势）为：A、胎头俯屈，B、颈部贴近胸壁 C、脊柱略前弯 D、四肢屈曲交叉于胸腹前 E、以上都是

答案：E

第五章

1.输卵管妊娠发病部位最多见于：

- A、输卵管峡部 B、输卵管壶腹部 C、输卵管伞端
D、输卵管间质部 E、输卵管峡部和壶腹部交界处

答案：B

2. 30岁女性，停经42天，右下腹疼痛伴不规则阴道流血10+天，刮出物送病检为子宫内膜蜕膜样改变，最大可能诊断是：

- A、功血 B、流产 C、子宫内膜炎 D、异位妊娠
E、月经期

答案：D

3. 诊断异位妊娠破裂，最简单可靠的方法是：

- A、病史、腹部检查及阴道检查 B、后穹窿穿刺
C、尿妊娠试验 D、B超 E、诊断性诊刮

答案：B

4. 停经50天，有早孕反应，尿妊免（-），3天前开始少量阴道流血，今

早流血增多，并腹痛加剧，随时排出一块组织后流血减少，妇

查：阴

道内少量血液，宫口未开，子宫前位，稍大，双附件（-），其处理方

案应首选：（ ）

A、立即清宫 B、催产素注射 C、观察无特殊处理

D、HCG测定 E、大量抗生素消炎

答案：C

5. 不全流产有活动性出血伴休克, 应如何处理:

A. 立即刮宫 B. 输液输血纠正休克 C. 一边纠正休克一边刮宫

D. 纠正输液及抗感染后刮宫 E. 肌注催产素, 促残留胚胎组织排出

答案：C

第六章

1. 妊娠高血压疾病的基本病理变化:

A、水钠潴留 B、血液浓缩 C、血管脆性及通透性增高

D、全身小血管痉挛 E、低血容量

答案：D

2. 孕38周，子痫前期(重度)的妇女，入院查血压150/100 mmHg，尿蛋白（++），比重1.024，红细胞压积0.36，宫底剑突下2横指，LOA，半固定，胎心和骨盆正常，宫口未开，此时选用下列哪项处理最恰当:

A、剖宫产 B、硫酸镁解痉加扩容治疗

C、大量利尿剂 D、缩宫素静滴引产 E、大量降压药

答案:B

3. 24小时内尿蛋白定量为多少属于子痫前期(重度)患者:

A. 超过300mg B超过500mg C. 超过1000mg D. 超过3g
E超过5g

答案：E

4. 子痫前期(重度)病人已近足月,较好的处理是:

- A. 立即引产, 尽快终止妊娠
- B. 立即剖宫产以终止妊娠
- C. 积极治疗好转24-48小时后, 引产终止妊娠
- D. 积极治疗恢复正常后引产终止妊娠
- E. 积极治疗好转1周后引产终止妊娠

答案：C

异常分娩

1.病理性缩复环最常见于:

- A. 头盆不称
- B. 女型骨盆
- C. 枕横位
- D. 高张性宫缩乏力
- E. 枕后位

2.产妇在产程中出现宫缩乏力, 不恰当的处理是:

- A. 静点缩宫素
- B. 静脉推注地西洋
- C. 按摩子宫
- D. 人工破膜
- E. 肌肉注射哌替啶
- E. 重度妊娠期高血压疾病

3. 下列产程描述错误的是:

- A. 滞产: 总产程超过24小时
- B. 潜伏期延长: 超过16小时
- C. 胎头下降延缓: 活跃期晚期或第二产程, 胎头下降速度, 初产妇 < 1cm/h, 经产妇 < 2cm/h
- D. 活跃期停滞: 活跃期宫口不再扩张达2小时
- E. 第二产程停滞: 第二产程一小时胎头下降无进展

4. 异常分娩的原因不包括:

- A. 宫缩乏力
- B. 产妇感染
- C. 产道狭窄
- D. 胎位异常
- E. 精神因素

5. 关于持续性枕后位, 正确的是

- A. 多见于漏斗骨盆
 - B. 凡枕后位均需剖宫产
 - C. 阴道检查大囟门位于骨盆右后方,矢状缝在右斜径上,示枕后位
 - D. 产妇向下屏气,示宫口开全
 - E. 如胎儿不大,宫缩较强,枕后位可旋转成枕前位
7. 初产妇,妊娠39周,骨盆各径线为:对角径12.5cm,坐骨棘间径24cm,坐骨结节间径7cm,耻骨弓角度80度,本例的骨盆诊断是
- A. 扁平骨盆
 - B. 中骨盆狭窄
 - C. 漏斗骨盆
 - D. 均小骨盆
 - E. 畸形骨盆
8. G4P1,孕40周,人工流产3次,产程进展顺利,胎儿娩出后30分钟,胎盘未娩出,亦无剥离征象,阴道无出血。最可能的原因是
- A. 胎盘剥离后滞留
 - B. 胎盘剥离不全
 - C. 胎盘部分性植入
 - D. 胎盘完全粘连
 - E. 胎盘嵌顿
9. 女性,25岁,孕1产0,骨盆外测量正常,临产10小时,肛查:宫口开大9cm,胎先露S+2,宫缩时出现胎心下降达100次/分,宫缩后不能恢复。哪项处理正确:
- A. 不予干涉,等待正常分娩
 - B. 给予产妇吸氧,左侧卧位
 - C. 立即产钳助娩
 - D. 立即剖宫产
 - E. 给予温肥皂水灌肠,刺激宫缩

分娩期并发症

1. 在我国,最常引起产妇死亡的原因是
- A. 脐带异常
 - B. 子宫破裂
 - C. 羊水栓塞

- D. 胎膜早破
- E. 产后出血

2. 一产妇急产分娩一活婴，分娩后即出现烦躁不安，呛咳，呼吸困难，寒战，发绀，首先应考虑哪种疾病？

- A. 羊水栓塞
- B. 急性宫内感染
- C. 急性肾衰竭
- D. 癫痫
- E. 子痫前期重度

3. 下列哪项不是先兆子宫破裂的临床表现

- A. 烦躁不安，呼吸脉搏加快
- B. 胎心改变，听不清
- C. 腹壁下清楚扪及胎体
- D. 病理缩复环
- E. 排尿困难

4. 下列哪项不是影响产后出血的原因

- A. 羊水过多
- B. 胎儿巨大
- C. 宫缩乏力
- D. 早产
- E. 前置胎盘

产褥期并发症

1. 下列哪项产褥期临床表现是错误的

- A. 产后24小时内体温略升高但不超过 38°C
- B. 产后3~4日可能会出现“泌乳热”
- C. 产后第2日开始宫底每日下降1~2 cm
- D. 产后子宫收缩引起宫缩痛
- E. 恶露持续一周

2. 产褥期是指产后

- A. 2周
- B. 4周
- C. 6周
- D. 8周

E. 12周

外阴及阴道炎症

1.不属于滴虫性阴道炎临床表现的是:

- A. 外阴部瘙痒
- B. 经后自觉症状加重
- C. 稀薄泡沫状白带
- D. 草莓样宫颈
- E. 小阴唇内侧附着白色膜状物

2.常引起外阴瘙痒的是:

- A.长期阴道分泌物的刺激
- B.药物过敏
- C.蛲虫病
- D.尿液及粪便浸渍
- E.外阴发育差

宫颈炎

1下列关于宫颈炎描述错误的是:

- A.不及时治疗容易癌变
- B.临床可见分泌物增多,呈脓性
- C.病原体主要是淋病耐瑟菌和沙眼衣原体
- D.临床多见宫颈管炎症,由于宫颈管黏膜皱襞多,感染后病原体不易清除,久而导致慢性宫颈炎
- E.宫颈充血水肿,宫颈触痛,触之易出血是急性宫颈炎常见症状

2.下述哪项不属宫颈慢性炎症:

- A.宫颈腺囊肿
- B.宫颈黏膜炎
- C.宫颈肥大
- D.宫颈息肉

E.宫颈旧裂

1关于子宫肌瘤的变性,下列哪项错误:

- A、红色变性
- B、囊性变
- C、玻璃变性
- D、肉瘤变

E、葡萄样变

2. 绝经后妇女，子宫肌瘤迅速增大，应考虑：

- A、感染
- B、囊性变
- C、红色变性
- D、脂肪样变
- E、肉瘤变

3. 子宫肌瘤的手术指征哪项错误：

- A、粘膜下肌瘤
- B、子宫增大如孕3月大小
- C、肌瘤影响生育
- D、症状明显导致贫血
- E、围绝经期肌瘤小，无症状

4. 下列哪种性激素对子宫内膜癌治疗有效：

- A. 雌激素
- B.孕激素
- C.雄激素
- D.肾上腺皮质激素
- E.甲状腺激素

5. 有关内膜癌, 下述哪项错误：

- A. 绝大多数为腺癌
- B. 其发生与子宫内膜腺瘤型增生关系不大
- C. 病灶位于子宫体上段或宫底部时转移至腹主动脉旁淋巴结
- D. 晚期子宫内膜癌及复发癌可用高效孕激素治疗
- E. 子宫内膜癌发展较缓慢

6. 子宫内膜癌Ia期, 最好的治疗方法是：

- A. 放射治疗, 盆腔外照射
- B. 全子宫切除术, 保留卵巢
- C. 全子宫切除及双输卵管卵巢切除术
- D. 广泛性子宫切除术
- E. 广泛性子宫切除及盆腔淋巴清扫

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528125072121006111>