

2024 年河南省北关区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题真题题库有答案解析

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 服用抗帕金森病药恩他卡朋的患者，其尿液可变成

- A: 淡绿色
- B: 深蓝色
- C: 蓝绿色
- D: 红棕色

答案：D

2. （2018 年真题）普通感冒患者，有打喷嚏、流鼻涕的症状，宜选用的药物是（）

- A: 氯苯那敏片
- B: 右美沙芬片
- C: 对乙酰氨基酚滴剂
- D: 茶碱缓释片

答案：A

3. 属于磷酸二酯酶抑制剂的平喘药是

- A: 布地奈德
- B: 沙美特罗
- C: 多索茶碱
- D: 孟鲁司特

答案：C

4. 可用于烧伤及伤后感染的是()

- A: 柳氮磺吡啶
- B: 磺胺甲噁唑
- C: 磺胺嘧啶
- D: 磺胺米隆

答案: C

5. 下列药物中属于缩瞳药的是

- A: 托吡卡胺
- B: 氢溴酸后马托品
- C: 毛果芸香碱
- D: 硫酸阿托品

答案: C

6. 下列药物中，能促进食物消化的是()

- A: 雷尼替丁
- B: 乳酶生
- C: 兰索拉唑
- D: 胶体果胶铋

答案: B

7. 长期合用下列哪个药物能使口服避孕药的主要成分炔诺酮和炔雌醇的代谢加快，血液中的药物浓度降低而导致避孕失败()

- A: 四环素
- B: 氨苄西林
- C: 复方磺胺甲噁唑
- D: 利福平

答案：D

8. 属于阴道杀精药的是

- A: 壬苯醇醚
- B: 米非司酮
- C: 左炔诺孕酮
- D: 氯地孕酮

答案：A

9. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

- A: β 受体激动剂
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: 白三烯受体阻断剂
- D: M 受体阻断剂

答案：C

10. 主要用于经他莫昔芬辅助治疗 2~3 年后，绝经后雌激素受体阳性的妇女的早期浸润性乳腺癌的辅助治疗，直至完成总共 5 年的辅助内分泌治疗，以及经他莫昔芬治疗后，其病情仍有进展的自然或人工绝经后妇女的晚期乳腺癌，该药物是

- A: 氟维司群
- B: 来曲唑
- C: 他莫昔芬
- D: 依西美坦

答案：D

11. 患者，女，12 岁，身高 140cm，体重 32kg，因"脊柱侧弯"入院。入院后完善相关检查，拟行"脊柱侧弯截骨矫形檀骨融合内固定术"。既往有头孢类过敏史。

- A: 左氧氟沙星
- B: 克林霉素
- C: 万古霉素
- D: 替考拉宁

答案：C

12. 关于生长抑素的描述中，错误的是

- A: 可抑制胃泌素、胃酸及胃蛋白酶的分泌
- B: 治疗食管静脉曲张出血方面有一定的临床价值
- C: 用葡萄糖溶液稀释，静脉滴注给药
- D: 用于预防和治疗胰腺外科手术后并发症

答案：C

13. 用药后可使尿液呈橘红色的药物是

- A: 异烟肼
- B: 链霉素
- C: 利福平
- D: 乙胺丁醇

答案：C

14. 对 G

- A: 第二代头孢菌素
- B: 第一代头孢菌素
- C: 第四代头孢菌素
- D: 第三代头孢菌素

答案：C

15. 关于地西泮的作用特点，叙述错误的是

- A: 有良好的抗癫痫作用
- B: 剂量加大可引起麻醉
- C: 小于镇静剂量时即有抗焦虑作用
- D: 可增强其他中枢抑制药的作用

答案：B

16. 患者，男性，45 岁。有支气管哮喘病史 20 余年。因阵发性室上性心动过速入院治疗，出院后又多次发作，应选用预防反复发作的治疗药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 维拉帕米
- C: 利多卡因
- D: 美西律

答案：B

17. 对鞭虫无效的药物是()。

- A: 噻嘧啶
- B: 吡喹酮
- C: 甲硝唑
- D: 阿苯达唑

答案：A

18. 对贝特类（苯氧芳酸类）的叙述正确的是

- A: 可升高 T
- B: LDL-CC 主要用于原发性高胆固醇血症

C: 能明显降低血浆 TG

D: 可降低 HDL-C

答案: C

19. 分子中含有强碱性基团，可与肝素分子中的硫酸根迅速结合，形成无活性的稳定复合物，使肝素失去抗凝活性的是

A: 维生素 K1

B: 鱼精蛋白

C: 酚磺乙胺

D: 氨甲环酸

答案: B

20. 可用于中、重度细菌性感染，半衰期长，可以一日 1 次给药的是

A: 厄他培南

B: 美罗培南

C: 亚胺培南

D: 西司他丁

答案: A

21. 婴儿和哺乳期妇女禁用()作为泻药。

A: 聚乙二醇 4000

B: 硫酸镁

C: 乳果糖

D: 酚酞

答案: D

22. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

- A: 左氧氟沙星与茶碱相互作用较小
- B: 可使用大环内酯类药物如红霉素
- C: 依诺沙星可抑制茶碱代谢
- D: 可使用头孢类口服剂型，与氨茶碱无明显药物相互作用

答案：B

23. 与多柔比星呈现交叉耐药性的是

- A: 放线菌素
- B: 肝素
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 氧烯洛尔

答案：A

24. 头孢哌酮的主要清除途径是

- A: 主要经肝脏清除
- B: 经肝、肾双途径清除
- C: 主要经肾脏排泄
- D: 主要经呼吸道排泄

答案：B

25. 金刚烷胺与阿托品合用

- A: 增加肾毒性
- B: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)
- C: 可增加抗胆碱不良反应的危险
- D: 增加锥体外系不良反应的风险

答案：C

26. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 应用前应询问药物过敏史，对磺胺药过敏者不宜使用
- B: 静脉用药剂量为口服的 1 / 2 时即可达到同样疗效
- C: 静脉注射时宜用葡萄糖注射液稀释
- D: 肠道外用药宜静脉给药，不主张肌肉注射

答案：C

27. （2018 年真题）对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是（）

- A: 布美他尼
- B: 依他尼酸
- C: 乙酰唑胺
- D: 依托塞米

答案：B

28. 体内缺乏维生素 E 会导致

- A: 不孕症
- B: 脚气病
- C: 佝偻病
- D: 夜盲症

答案：A

29. 主要通过增强靶组织对胰岛素的敏感性，减轻胰岛素抵抗发挥疗效的药物是

- A: 氢氧化镁
- B: 胰岛素

C: 二甲双胍

D: 罗格列酮

答案: D

30. 下列哪项是避免奥沙利铂的剂量依赖性神经系统毒性，避免出现咽喉痉挛等严重后果的措施

A: 用生理盐水做溶剂

B: 禁止接触塑料制品

C: 禁食热饮热水

D: 禁食冷饮冷水、接触凉物

答案: D

31. 治疗酮症酸中毒及糖尿病昏迷的药物是

A: 罗格列酮

B: 二甲双胍

C: 氢氧化镁

D: 胰岛素

答案: D

32. 内分泌平衡障碍及精神神经失调所致的失眠

A: 谷维素

B: 氯美扎酮

C: 氟西泮

D: 夸西泮

答案: A

33. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 高检出率的医疗机构, 进行人工瓣膜置换术时, 为预防 MRSA 感染, 可选用 ()

- A: 万古霉素
- B: 头孢唑林
- C: 青霉素 G
- D: 氨曲南

答案：A

34. 下列哪种药物长期使用将引起药物性鼻炎()

- A: 抗组胺药
- B: 糖皮质激素
- C: 减鼻充血药
- D: 肥大细胞膜稳定剂

答案：C

35. (2017 年真题) 应用维生素 B12 治疗巨幼红细胞性贫血 48 小时内，应监测的电解质是()

- A: 锂
- B: 钠
- C: 钙
- D: 钾

答案：D

36. 患者，男性 35 岁，大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 哌拉西林
- C: 氯霉素
- D: 林可霉素

答案：B

37. 患儿，男，7 岁。长期偏食。近 1 个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下 4cm，脾肋下 1cm。血常规：Hb70g / L，RBC 3.0×10^{12} / L，Ret2. 0%，WBC、Plt 均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

- A: 网织红细胞计数
- B: 血红蛋白测定
- C: 血清铁蛋白
- D: 血小板数量

答案：D

38. 对伴有同型半胱氨酸升高的高血压患者在降压的同时应注意补充

- A: 叶酸+维生素 B12
- B: 维生素 C+维生素
- C: 维生素 B2+维生素 C
- D: 维生素 K+维生素 B

答案：A

39. 使用氢化可的松大剂量冲击治疗时，用药时间一般不超过

- A: 3 日
- B: 1 日
- C: 7 日
- D: 5 日

答案：A

40. 流行性脑脊髓膜炎首选药是

- A: 柳氮磺吡啶
- B: 磺胺嘧啶

C: 磺胺米隆

D: 磺胺甲

答案: B

41. 为防止中毒，不宜与铋剂联用的是

A: 米索前列醇

B: 枸橼酸铋钾

C: 甲硝唑

D: 硫糖铝

答案: B

42. (2018 年真题) 适应症仅应用于治疗失眠的药物是 ()

A: 苯巴比妥

B: 氟西汀

C: 地西泮

D: 佐匹克隆

答案: D

43. 双炔失碳酯 ()

A: 抑制排卵作用

B: 促进蛋白质合成

C: 抗着床

D: 减少精子数目

答案: C

44. 属于抑制疟原虫的二氢叶酸还原酶，阻碍核酸合成的抗疟药物是

A: 奎宁

B: 青蒿素

C: 乙胺嘧啶

D: 吡喹酮

答案：C

45. 对多巴胺描述正确的是()

A: 可用于充血性心力衰竭等引起的休克综合征

B: 对洋地黄和利尿药无效的心功能不全，多巴胺也无效

C: 对其他拟交感胺类药物高度敏感的患者应该使用多巴胺

D: 是磷酸二酯酶抑制剂

答案：A

46. 唑来膦酸静脉给药输注的时间应在

A: 30 分钟以上

B: 5 分钟以上

C: 15 分钟以上

D: 60 分钟以上

答案：C

47. (2019 年真题) 患者，女，55 岁，诊断为“甲癣”，宜使用的药物是()

A: 氟康唑

B: 卡泊芬净

C: 氟胞嘧啶

D: 特比萘芬

答案：D

48. 重症肌无力、癫痫患者避免使用的抗菌药是

A: 甲硝唑

- B: 哌拉西林
- C: 米诺环素
- D: 左氧氟沙星

答案：D

49. 某患儿高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。关于奥司他韦预防用药的说法，正确的建（）

- A: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 75mg
- B: 应于密切接触流感患的 2 天以内预防服用，每急日两次，每次 75mg
- C: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 150mg
- D: 应于密切接触流感患儿的 3 天以内预防服用，每日两次，每次 150mg

答案：A

50. 属于促凝血因子活性药的是

- A: 氨甲环酸
- B: 酚磺乙胺
- C: 鱼精蛋白
- D: 甲萘氢醌

答案：B

51. 铁剂用药期间需定期做下列检查，以观察治疗效果，不包括

- A: 血红蛋白
- B: 血清铁蛋白
- C: 巨核细胞计数
- D: 网织红细胞计数

答案：C

52.（2021 年真题）影响熊去氧胆酸的吸收，不宜同时服用的药物（）

- A: 氢氧化铝
- B: 利那洛肽
- C: 昂丹司琼
- D: 双歧杆菌三联活菌

答案：A

53. 患儿，5 岁。有咽痛、肌肉酸痛、咳嗽，实验室检查为支原体感染；医师处方红霉素治疗。

- A: 静脉滴注速度过快可发生心脏毒性
- B: 红霉素广泛分布于各种组织和体液中
- C: 常见用药后 10 日出现转氨酶升高
- D: 易被胃酸破坏，临床常用其肠衣片或酯化物

答案：B

54. 下列不属于肽类抗生素的是

- A: 去甲万古霉素
- B: 利奈唑胺
- C: 万古霉素
- D: 多黏菌素 B

答案：B

55. 患者，男，66 岁。BMI24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次 1 分。临床诊断为：（1）心绞痛急性发作；（2）心功能不全、心功能 III 级；（3）高血压病 3 级；（4）高脂血症。

- A: 硝酸甘油片单次剂量不足，次数不足
- B: 硝酸甘油片已经过期
- C: 贝那普利、阿托伐他汀等拮抗硝酸甘油的疗效
- D: 硝酸甘油片被吞服，而不是舌下含服

答案：C

56. 属于治疗固醇性胆囊结石的是

- A: 山莨菪碱
- B: 胶体果胶铋
- C: 多潘立酮
- D: 熊去氧胆酸

答案：D

57. （2017 年真题）影响毛细血管通透性的促凝血药是（）

- A: 鱼精蛋白
- B: 血凝酶
- C: 卡巴克络
- D: 维生素 K1

答案：C

58. 小细胞肺癌化疗首选药是

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 替尼泊苷
- B: 博来霉素
- C: 依托泊苷
- D: 羟喜树碱

答案：C

59.（2015 年真题）属于延长动作电位时程药（第Ⅲ类）的抗心律失常药的是（）。

- A: 维拉帕米
- B: 美西律
- C: 拉贝洛尔
- D: 胺碘酮

答案：D

60. 主要作用于远曲小管和集合管、直接阻止 Na^+ 通道而抑制 Na^+-K^+ 交换，伴有血钾升高的药物是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 甘露醇
- C: 乙酰唑胺
- D: 螺内酯

答案：A

61. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

- A: 选择短期口服给药
- B: 选择注射给药
- C: 选择长期口服给药
- D: 选择注射与口服并用

答案：A

62.（2017 年真题）导致视神经炎的抗结核药的是（）

- A: 乙胺丁醇
- B: 利福喷丁
- C: 吡嗪酰胺
- D: 利福平

答案：A

63. 广泛用于各种吸虫药的治疗，还能用于绦虫病的药物是

- A: 吡喹酮
- B: 三苯双脒
- C: 甲硝唑
- D: 乙胺嘧啶

答案：A

64. 可与甲巯咪唑发生药物相互作用的是

- A: 噻嗪类利尿剂
- B: 抗凝药
- C: 阿司匹林
- D: 头孢类抗生素

答案：B

65. 卡泊芬净属于()

- A: 丙烯胺类抗真菌药
- B: 多烯类抗真菌药
- C: 棘白菌素类抗真菌药
- D: 唑类抗真菌药

答案：C

66. 下列雌激素中，可用作复方口服避孕药的成分之一的是()

- A: 炔雌醇
- B: 雌二醇
- C: 炔诺酮
- D: 尼尔雌醇

答案：A

67. 有关质子泵抑制剂说法错误的是

- A: 局部止血作用
- B: 可以中和胃酸
- C: 主要是抑制 H^+, K^+-ATP 酶
- D: 抑制胃酸分泌作用

答案：B

68. 属于头霉素类抗菌药物的是

- A: 头孢美唑
- B: 头孢噻肟
- C: 氨曲南
- D: 头孢他啶

答案：A

69. 以下哪个药物不属于肝胆疾病辅助药

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 多潘立酮
- C: 还原型谷胱甘肽
- D: 甘草酸二铵

答案：B

70. (2019 年真题) 服用阿司匹林可增加患者消化道黏膜损伤和胃溃疡的风险，为降低此风险，应采取的措施是 ()

- A: 不推荐 65 岁以上老年患者使用阿司匹林进行冠心病二级预防
- B: 使用阿司匹林前宜先根治幽门螺杆菌感染
- C: 阿司匹林不应与其他抗血小板药物合用
- D: 应长期合用质子泵抑制剂

答案：B

71. 与奥美拉唑、甲硝唑三联治疗幽门螺杆菌感染的是

- A: 罗红霉素
- B: 红霉素
- C: 克拉霉素
- D: 万古霉素

答案：C

72. (2020 年真题) 关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

- A: 小剂量可促进头发生长，用于治疗源性脱发
- B: 易引起直立性低血压
- C: 能降低血清前列腺特异性抗原 (PSA) 水平
- D: 可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮

答案：B

73. 关于利伐沙班注意事项的描述，不正确的是 ()

- A: 用药期间需定期测定血红蛋白
- B: 如伤口已止血，首次用药应于术后立即给药
- C: 用药过量可导致出血并发症
- D: 对于不同的手术选择的疗程不同

答案：B

74. 下列药物中属于抗纤维蛋白溶解药的是

- A: 卡巴克络
- B: 氨甲环酸
- C: 酚磺乙胺
- D: 维生素 K1

答案: B

75. (2016 年真题) 可用于治疗甲癣、足癣、体癣和股癣等浅表性真菌感染的药品是

- A: 两性霉素 B
- B: 伏立康唑
- C: 特比萘芬
- D: 氟胞嘧啶

答案: C

76. 属于多巴胺 D2 受体阻断剂的是

- A: 法莫替丁
- B: 氯苯那敏
- C: 多潘立酮
- D: 奥美拉唑

答案: C

77. 作用于芳香化酶的抗肿瘤药物是

- A: 依托泊苷
- B: 来曲唑
- C: 紫杉醇
- D: 顺铂

答案：B

78. 螺内酯临床常用于()

- A: 脑水肿
- B: 醛固酮升高引起的水肿
- C: 急性肾衰竭
- D: 尿崩症

答案：B

79. 用于抗结核杆菌的药物是

- A: 异烟肼
- B: 庆大霉素
- C: 新霉素
- D: 妥布霉素

答案：A

80. 风湿性心脏病重度二尖瓣狭窄宜

- A: 常规剂量的洋地黄
- B: 快速洋地黄化
- C: 不宜使用洋地黄
- D: 停用洋地黄

答案：C

81. 属于碳酸酐酶抑制剂的药物是

- A: 阿托品
- B: 奥布卡因
- C: 乙酰唑胺
- D: 拉坦前列素

答案：C

82. 双膦酸盐类药物的作用机制不包括

- A: 直接改变破骨细胞的形态学
- B: 与骨基质理化结合，干扰骨吸收
- C: 增加小肠和肾小管对钙的重吸收
- D: 抑制骨吸收性

答案：C

83. 按作用时间分类，属于超长效的胰岛素 / 胰岛素类似物的是

- A: 精蛋白锌胰岛素
- B: 普通胰岛素
- C: 地特胰岛素
- D: 预混胰岛素

答案：C

84. 使用呋塞米时，较少发生耳毒性的情况是

- A: 同时使用氨基糖苷类药物
- B: 口服方式给药
- C: 快速静脉输注给药
- D: 频繁静脉输注给药

答案：B

85. 下列属于吗氯贝胺作用机制的表述是

- A: 选择性抑制 5-HT 的再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度
- B: 抑制突触前膜 5-HT、去甲肾上腺素的再摄取
- C: 抑制突触前膜去甲肾上腺素的再摄取

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 抑制 A 型单胺氧化酶，减少 5-HT、去甲肾上腺素的降解

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/535121211121012033>