

2021 院前急救护士理论考试试题及答案

一 A1 型题（即最佳回答题。它由一个叙述主体和五个备选答案组成，选项中只有一个是最恰当的，其余四个为干扰答案。）

1.重度哮喘患者，痰黏稠咳不出，首选的祛痰的方法是：（ ）

- A 抽吸痰液
- B 应用抗生素
- C 应用氯化铵
- D 输液纠正失水(正确答案)
- E 纠正酸中毒

2 头部外伤患者，深度昏迷，呼吸基本停止，医生应首先采取的措施是（ ）

- A 脑 CT 检查
- B 缝合头皮裂伤减少出血
- C 畅通气道，进行呼吸支持(正确答案)
- D 系统进行检查
- E 与家属谈话，并发病危通知

3.不属于糖尿病慢性并发症的是：（ ）

- A 动脉粥样硬化
- B 肾脏病变
- C 视网膜病变
- D 角膜溃疡(正确答案)
- E 心肌病

4 原发性高血压心功能不全患者的脉搏特征是：（ ）

A 奇脉

B 水冲脉

C 脉搏短绌

D 交替脉(正确答案)

E 重脉

5 纵膈不偏向健侧的疾病是：（ ）

A 血胸

B 开放性气胸

C 张力性气胸

D 慢性脓胸(正确答案)

E 急性脓胸

6.不符合电复律并发症的是：（ ）

A 皮肤灼伤

B 心律失常

C 心肌损伤

D 动脉栓塞

E 心室壁穿孔(正确答案)

7 不符合阿托品治疗有机磷农药中毒作用机制的是（ ）

A 恢复胆碱酯酶的活力(正确答案)

B 对抗中枢性呼吸抑制

C 拮抗乙酰胆碱对副交感神经的作用

D 拮抗乙酰胆碱对中枢神经系统的作用

E 对毒蕈(Xun)碱样症状有效

8.不属于周围血管征的是（ ）

- A.水冲脉
- B.点头运动
- C.毛细血管搏动
- D.脉搏短绌(正确答案)
- E.射枪音

9.消化性溃疡病临床表现的最主要特征（ ）

- A.恶心 呕吐
- B.腹胀 暖气
- C.明显反酸
- D.节律性上腹痛(正确答案)
- E.出汗 心悸

10.代谢性酸中毒常见于（ ）

- A 长期静脉滴注葡萄糖
- B 幽门梗阻
- C 急性阑尾炎
- D 食管梗阻
- E 弥漫性腹膜炎(正确答案)

11.中毒伴肾功能不全或昏迷者不宜使用的治疗方法是：（ ）

- A 吸氧
- B 硫酸镁导泻(正确答案)
- C 硫酸钠导泻
- D 输液

E 洗胃

12.肝功能差的患者，食管胃底静脉曲张破裂大出血的急救措施：（ ）

A 胃大部切除术

B 三腔二囊管压迫止血(正确答案)

C 贲门周围血管离断术+脾切除

D 肝叶切除术

E 肝总动脉结扎术

13 气管切开术后出现广泛皮下气肿，最简单的处理方法是（ ）

A 抽吸气体

B 松解伤口缝线(正确答案)

C 更换气管套管

D 让其自行吸收

E 以上都不是

14.跨阈步态一般见于：（ ）

A 小脑病变

B 不完全性截瘫

C 肌营养不良

D 脑血管意外后遗症

E 腓神经麻痹(正确答案)

15 高压氧治疗一氧化碳中毒的主要机制是：（ ）

A 血液中物理溶解氧量增加(正确答案)

B 氧和血红蛋白的亲合力增加

C 血液中血红蛋白增加

- D 血液中结合氧量增加
- E 机体的摄氧能力增强

16 提示子宫即将破裂的表现是 ()

- A 听不到胎心音
- B 宫底迅速上升
- C 子宫强直性收缩, 并出现病理性缩复环(正确答案)
- D 持续大量阴道出血
- E 胎儿先露部于内诊是触不到

17 不符合高血压脑病特征的是 ()

- A 以颅内压增高为主要表现
- B 大多数伴有急性水肿表现(正确答案)
- C 可发生于嗜铬细胞瘤
- D 发作时先有血压突然升高
- E 可发生于急进性高血压

18.不能用于治疗误服强碱性溶液的是: ()

- A 牛奶
- B 蛋清
- C 冷生理盐水
- D 弱酸性溶液
- E 弱碱性溶液(正确答案)

19.老年人的脉压比年轻人大的主要原因是: ()

- A 心输出量较小
- B 循环血量较少

- C 血液粘性增高
- D 小动脉硬化
- E 主动脉和大动脉弹性降低(正确答案)

20.符合浅昏迷临床表现是：（ ）

- A 对疼痛刺激有反应(正确答案)
- B 可以唤醒
- C 无意识的自主运动消失
- D 四肢腱反射消失
- E 定向力障碍

21 心肌微循环灌注的决定因素是：（ ）

- A 心肌收缩力
- B 心排出量
- C 心排血指数
- D 动脉收缩压
- E 动脉舒张压(正确答案)

22 急性肾衰竭最常见的诱发因素是：（ ）

- A 劳累
- B 感染
- C 饮食中蛋白质过量
- D 有效循环血量减少(正确答案)
- E 应用肾毒性药物

23 微循环衰竭期的微循环特点是：（ ）

- A 毛细血管前括约肌、微动脉、微静脉均保持收缩

B 毛细血管前括约肌、微动脉、微静脉松弛(正确答案)

C 毛细血管前括约肌、微动脉松弛、微静脉收缩

D 毛细血管前括约肌和微动脉收缩，微静脉松弛

E 微循环血管对儿茶酚胺的反应性不变

24 各型休克的共同特点是：（ ）

A 有效循环血容量不足(正确答案)

B 尿少

C 低血压

D 代谢性酸中毒

E 昏迷

25 体温每升高 1℃，脑代谢率增加的是：（ ）

A 1%

B 8%(正确答案)

C 6%

D 4%

E 2%

26 不符合淡水淹溺临床表现的是：（ ）

A 溶血

B 高钾血症

C 高钠血症(正确答案)

D 血红蛋白尿

E 肺水肿

27 区别腹部肿块来自腹腔或腹腔的最简易检查方法是：（ ）

- A 超声检查
- B 胃肠钡餐检查
- C 腹部体格检查(正确答案)
- D 腹部 X 线平片
- E 放射性核素检查

28 不符合左心衰时呼吸困难特点的是：（ ）

- A 活动时加重
- B 休息时减轻
- C 仰卧时加重
- D 常伴淤血性肝大(正确答案)
- E 常采取端坐呼吸体位

3 患者，女性，36 岁。因急性一氧化碳中毒入院，治疗 1 周后症状消失出院。2 月后突然出现意识障碍。既往无高血压及脑血管病史。最可能的诊断是：（ ）

- A、脑出血
- B、脑梗塞
- C、肝性脑病
- D、中毒迟发性脑病(正确答案)
- E、中间期综合征

4 患者，男性，50 岁。不明原因晕厥 15 分钟，心电图示宽 QRS 波型心动过速，心室率 150 次/分，血压 60/45mmHg。首选的治疗方法是：（ ）

- A、临时心脏起搏器植入
- B、肾上腺素
- C、直流电复律(正确答案)
- D、毛花苷丙

E、阿托品

5 患者，男性，43 岁。突发呕血 2 小时入院。既往有消化性溃疡病史 5 年。体查：四肢湿冷，脉搏 118 次/分，呼吸浅促，血压 80/40mmHG，估计其出血量：（ ）

A、400-500ml

B、500-600ml

C、600-700ml

D、700-800ml

E、> 800ml(正确答案)

6 患者，男性，67 岁。胸痛 10 小时，伴冷汗淋漓。既往有高血压和主动脉夹层病史。体查：口唇发绀，脉搏细速，P110 次/分，BP70/50mmHg，ECG 示心肌缺血，血清淀粉酶正常，血糖正常。最正确的诊断是：（ ）

A 急性出血性坏死性胰腺炎

B 肾上腺危象

C 糖尿病酮症酸中毒

D 脓毒性休克

E 心源性休克(正确答案)

7 患者，女性，28 岁。被家人发现呕吐，昏迷呼 120 出车。体查：昏迷，四肢抽搐，瞳孔直径 1.5mm，皮肤湿冷，流涎，两肺可闻及湿啰音。最可能的诊断是：（ ）

A、CO 中毒

B、巴比妥药物中毒

C、酒精中毒

D、有机磷农药中毒(正确答案)

E、苯胺中毒

8 患者，女性，46 岁。风湿性心脏病患者，因房颤和心功能不全，近 2 周来服用地高辛和奎尼丁，突然出现意识丧失，瞳孔散大，ECG 示一直线。在心肺复苏期间，为恢复自主动脉循环，首选的药物是：（ ）

- A、利多卡因
- B、肾上腺素(正确答案)
- C、多巴胺
- D、碳酸氢钠
- E、阿托品

9 患者，男性，70 岁。胸痛、心悸伴晕厥 1 次。体查：BP140/80mmHg，HR72 次/分，早搏 2~3 次/分，急诊室观察期间心电监护见室颤，应用双向波电击除颤的首次能量是：（ ）

- A、50J
- B、100J
- C、150J
- D、200J(正确答案)
- E、360J

10 患者，女性，22 岁。约 3 个月前起眼睑下垂，视物成双，一个月前劳动时四肢易疲劳，吞咽困难。体查：双侧眼睑轻度下垂，眼球各项活动均受限，无椎体束征及感觉障碍。最可能的诊断是：（ ）

- A、进行性肌营养不良
- B、重症肌无力(正确答案)
- C、急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病
- D、锥-基底动脉系统短暂脑缺血发作
- E、低钾血症

11 患者，男性，56 岁。活动后出现呼吸困难伴左胸痛，咳嗽频繁，咳出粉红色泡沫样血痰。既往高血压病 12 年。最可能诊断是：（ ）

- A、大叶性肺炎
- B、急性左心衰(正确答案)
- C、急性右心衰竭
- D、支气管扩张
- E、自发性气胸

12 患者，女性，16 岁。因进食过多橘子造成血中胡萝卜素增高，导致患者出现皮肤黏膜黄染。首先出现黄染的常见部位是：（ ）

- A、手掌足底(正确答案)
- B、巩膜
- C、口腔黏膜
- D、躯干
- E、耳后

13 患者，女性，14 岁。上学途中被自行车撞倒，右颞部着地，当时昏迷达 20 分钟，醒后轻微头痛，四肢活动自如，次日感头痛加重，呕吐数次，伴嗜睡，来院就诊。首选的辅助检查是：（ ）

- A、头颅 CT(正确答案)
- B、头颅 MRI
- C、脑血管造影
- D、脑池造影
- E、腰穿检查

14 患者，男性，46 岁。因地震现场导致左腰及下肢被倒塌之砖墙压住，6 小时后被救出，救出后 4 小时送抵医院。诉口渴，尿少，呈暗红色。体查：HR120 次

/min, BP88/65mmHg, 左下肢明显肿胀, 皮肤有散在淤血斑及水泡, 足背动脉搏动较对侧弱, 趾端凉, 无骨折征。最可能的诊断是: ()

- A、左下肢挫伤
- B、左下肢血栓形成
- C、肾挫伤
- D、挤压综合征(正确答案)
- E、足背动脉挫伤

15 患者, 女性, 21 岁。夜间排尿后突感右下腹剧痛, 随后恶心呕吐。平时月经规律, 末次月经为 10 天前。妇科检查: 子宫右侧可触及手拳大小囊实性包块, 触痛, 推移后疼痛加剧。最可能的诊断是: ()

- A、输卵管妊娠破裂
- B、急性阑尾炎
- C、急性附件炎
- D、卵巢囊肿蒂扭转(正确答案)
- E、卵巢黄体破裂

16 患者, 女性, 53 岁。外伤后患肢呈垂腕畸形, 各指间, 掌指关节不能伸直, 拇指不能伸直, 手背桡侧皮肤感觉麻木。损伤的神经是: ()

- A、尺神经
- B、桡神经(正确答案)
- C、正中神经
- D、腋神经
- E、肌皮神经

17 患者, 男性, 66 岁。持续性呼吸困难 10 小时来诊。3 个月前曾发生股骨颈骨折。既往有高血压病 8 年。体查 36.5℃, BP90/60mmHg, 颈静脉充盈, P2 亢进,

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/536020212054010045>