

2024 年河北省孟村回族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试内部题库 含答案【B 卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 高血压治疗药物选择时,ACEI 类药物禁用于()

- A: 双侧肾动脉狭窄患者
- B: 痛风患者
- C: 胃溃疡患者
- D: 心力衰竭患者

答案: A

2. 下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法, 错误的是:

- A: 服用过量可能出现甲状腺激素功能亢进症状
- B: 妊娠期妇女必须联合使用丙硫氧嘧啶
- C: 左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用
- D: 需要终身服药

答案: B

3. 如万络（罗非昔布）撤市时发现大剂量服用万络者患心肌梗死和心脏猝死的危险增加了 3 倍

- A: 药品上市前风险评估
- B: 发现药品质量问题
- C: 发现与规避假、劣药流入市场
- D: 药品上市后风险评估

答案: D

4. 下列关于三环类抗抑郁药中毒表现不正确的是

- A: 血压升高或下降
- B: 嗜睡、昏迷
- C: 心律减慢
- D: 激惹、躁动

答案：C

5. 药师在指导合理用药时应正确交代给药途径和给药方法，下列交代的内容中错误的是

- A: 肠溶片需整片吞服，不宜嚼碎服用
- B: 栓剂是外用制剂，不可口服
- C: 活菌制剂不能用超过 40% 的水送服
- D: 泡腾片可以溶解于温开水中服用，也可以作为咀嚼片服用

答案：D

6. 《中国药典》规定可在室温干燥并于避光处保存的药品是

- A: 聚克（复方乳酸菌）
- B: 金双歧（双歧杆菌-乳杆菌三联活菌）
- C: 美常安（枯草杆菌二联活菌）
- D: 培菲康（双歧杆菌三联活菌）

答案：C

7. 急性肾盂肾炎常见

- A: 细胞管型
- B: 白细胞管型
- C: 颗粒管型、透明管型
- D: 蜡样管型

答案：B

8. 患者，男，56 岁，以发热、左侧胸廓剧痛就诊。查体：体温 38.8℃，左侧沿第四肋走向有簇集性水疱。

A: 卡马西平

B: 对乙酰氨基酚

C: 普瑞巴林

D: 阿米替林

答案：A

9. 另有草药专辑、营养品专辑、眼药专辑、非处方药和食品补充剂专辑的是

A: 《医师案头参考》

B: 《英国国家处方集》

C: 《中国国家处方集（2010 年版）》

D: 《国家基本药物处方集（2012 年版）》

答案：A

10. 患者，男，58 岁，因心前区疼痛 5 年，加重伴呼吸困难入院。入院前 6 年常感心前区疼痛，疼痛性质系紧缩性或压迫感，多于劳累、餐后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg；呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻及湿啰音，心界向左侧扩大，心音减弱。入院诊断为冠心病。

A: 严重主动脉瓣狭窄或肥厚型梗阻性心肌病的心绞痛患者优先使用硝酸酯类药物

B: 发作时可舌下含服作用较快的硝酸酯类制剂

C: 阿司匹林是常用药物，主要不良反应为胃肠道出血或对阿司匹林过敏

D: 稳定型心绞痛患者合并高血压、糖尿病、心力衰竭可选用卡托普利、依那普利等药物

答案: A

11. 白细胞分类中，中性粒细胞参考范围为

A: 1%~5%

B: 3%~8%

C: 50%~70%

D: 20%~40%

答案: C

12. 患者，男，52岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

A: 左旋氨氯地平

B: 比索洛尔

C: 氟伐他汀

D: 雷米普利

答案: D

13. 可使驾驶员视物模糊或辨色困难的药物是

A: 苯噻啶

B: 阿托品

C: 氨苯蝶啶

D: 西咪替丁

答案: B

14. 老年增龄导致机体内环境改变，肝肾功能下降，药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄及药效发生一系列变化，一些药物的治疗剂量与中毒剂量更加接近，药物不良反应的发生率增高。

- A: 维生素 B1
- B: 苯巴比妥
- C: 阿司匹林
- D: 磺胺异恶唑

答案：A

15. 洗胃液 1：5000～1：10000 高锰酸钾溶液可用于解救哪类药物中毒

- A: 1605 中毒
- B: 巴比妥类中毒
- C: 3911 中毒
- D: 乐果中毒

答案：B

16. 前记

- A: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量
- B: 主要实验室数据
- C: 临床诊断、费别
- D: 医师签名、药品金额

答案：C

17. 环磷酰胺

- A: 心脏毒性
- B: 溶血性尿毒症
- C: 出血性膀胱炎
- D: 肺纤维化

答案：C

18. 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A: 酚麻美敏口服溶液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚，应避免重复用药

B: 酚麻美敏口服溶液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药

C: 酚麻美敏口服溶液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药

D: 酚麻美敏口服溶液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药

答案：D

19. 心力衰竭治疗中唯一能够控制体液潴留的药物是

A: 利尿药

B: β 受体拮抗剂

C: 阿托品

D: 肾上腺素

答案：A

20. 患者，女，22 岁，因淋雨导致发热、咳痰伴胸痛 1 天就诊。查体：体温 38.6℃，脉搏 90 次 / 分，呼吸 24 次 / 分，血压正常；双肺布满湿啰音。实验室检查：WBC 11×10^9 / L，胸片显示斑片状浸润性阴影。既往无过敏史。选用有效抗生素治疗后 2 天，体温恢复正常，咳痰减少。

A: 肺炎链球菌

B: 副流感病毒

C: 鲍曼不动杆菌

D: 铜绿假单胞菌

答案: A

21. 最可能引起血小板计数减少的药物是

A: 阿莫西林

B: 乳酸钠

C: 阿司匹林

D: 氯丙嗪

答案: C

22. 以下所列药物中，推荐用于治疗三叉神经痛者的首选处方药是

A: 舒马曲坦

B: 苯噻啶

C: 卡马西平

D: 地西泮

答案: C

23. 心律失常患者用药治疗期间应该禁用的是

A: 烟

B: 酒

C: 浓茶

D: 咖啡

答案: C

24. 患者手术后，给予肠外营养液 10%GS500ml，50%GS250ml，20%脂肪乳 250ml，8.5%复方氨基酸 750ml，水溶性维生素 10ml，脂溶性维生素 10ml，微量元素 10ml，10%氯化钠注射液 40ml，10%氯化钾注射液 30ml。营养液中葡萄糖提供的能量是()

- A: 700kcal
- B: 200kcal
- C: 1150kcal
- D: 450kcal

答案：A

25. 下列高血压的降压目标普通高血压患者

- A: <130/80mmHg
- B: <120/80mmHg
- C: <140/90mmHg
- D: <150/80mmHg

答案：C

26. (2019 年真题) 湿疹患者的实验室检查结果常会出现

- A: 中性粒细胞减少
- B: 淋巴细胞增多
- C: 淋巴细胞减少
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：D

27. 下列复方药物中，可使高血压患者血压升高的是

- A: 复方酚咖伪麻胶囊
- B: 速克感冒胶囊
- C: 银菊清解片

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 速感宁胶囊

答案: A

28. 常用的抗肿瘤药给药途径有:动脉、静脉、肌内、腔内、口服五种途径最常用的给药途径

- A: 动脉注射
- B: 肌内注射
- C: 腔内注射
- D: 静脉注射

答案: D

29. β 受体阻断剂的主要不良反应是

- A: 直立性低血压
- B: 足踝部水肿
- C: 血尿酸升高
- D: 支气管痉挛

答案: D

30. 患者,男,64岁,为缓解剧烈癌痛,同时使用5片芬太尼透皮贴剂后,出现呼吸抑制,可选用的解救药物是()

- A: 氟马西尼
- B: 二巯丙醇
- C: 亚甲蓝
- D: 纳洛酮

答案: D

31. 可用于评价肾功能的指标不包括

- A: BUN
- B: AST
- C: 尿沉渣结晶

D: Cr

答案: B

32. 口服普萘洛尔用于解救

A: 苯丙胺中毒

B: 硝西泮中毒

C: 氯丙嗪中毒

D: 瘦肉精中毒

答案: D

33. 下列药物中，不属于三环类抗抑郁药的是（）

A: 氟伏沙明

B: 氯米帕明

C: 丙米嗪

D: 阿米替林

答案: A

34. 急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

A: 右美沙芬

B: 苯海拉明

C: 伪麻黄碱

D: 愈创木酚甘油醚

答案: C

35. 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

- A: 每天用药最多不应超过 6 次，用药不超过 3 天
- B: 每天用药最多不应超过 4 次，用药不超过 3 天
- C: 每天用药最多不应超过 3 次，用药不超过 3 天
- D: 每天用药最多不应超过 5 次，用药不超过 3 天

答案：B

36. 静脉药物配置的环境条件要求是

- A: 千级洁净、密闭环境下，局部万级净化的操作台上
- B: 万级洁净、密闭环境下，局部千级净化的操作台上
- C: 万级洁净、密闭环境下，局部万级净化的操作台上
- D: 万级洁净、密闭环境下，局部百级净化的操作台上

答案：D

37. 香豆素类杀鼠药中毒呈现

- A: 恶心、呕吐、口内有金属味
- B: 呼出气体中可有苦杏仁气味
- C: 抽搐、进行性加重
- D: 出血、凝血时间延长

答案：D

38. 下列叙述正确的是

- A: 白细胞均是有粒细胞
- B: 淋巴细胞为有粒细胞
- C: 单核细胞为有粒细胞

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D：有粒细胞根据其颗粒的嗜好可分为中性、嗜酸性、嗜碱性 3 种

答案：D

39. 患者，男，50 岁。临床诊断慢性肾衰竭（尿毒症期），进行肾移植治疗，配合应用免疫抑制剂他克莫司，其初始剂量为

A: 0.05~0.15mg/（kg·d）

B: 0.75~1mg/（kg·d）

C: 0.02~0.03mg/（kg·d）

D: 2~5mg/（kg·d）

答案：A

40. 提示：用药期间不饮酒（或含酒精的饮料），是针对

A: 铋制剂

B: 卡托普利

C: 氟西汀

D: 氯苯那敏

答案：C

41. （2015 年真题）患者，男，70 岁，右手抖动和行走缓慢 3 个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病。既往前列腺肥大史 3 年，临床上对该患者不宜选用（）。

A: 司来吉兰

B: 左旋多巴

C: 多巴丝肼

D: 苯海索

答案：D

42. 患者男 78 岁，因心房颤动服用华法林治疗 2 年余。后因真菌感染使用氟康唑，用药后 INR 升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是（）

- A: 氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力,导致血中游离的华法林浓度升高
- B: 氟康唑可增加华法林的吸收,导致华法林血药浓度升高
- C: 氟康唑抑制华法林的肾脏排泄,导致华法林血药浓度升高
- D: 氟康唑可抑制 CYP2C9,导致华法林血药浓度升高

答案: D

43. 与联用药物竞争结合血浆蛋白的是

- A: 阿司匹林
- B: 西沙必利
- C: 丙胺太林
- D: 丙磺舒

答案: A

44. 患者,女,30岁。患先兆子痫,以硫酸镁治疗,适宜的给药途径是

- A: 吸入给药
- B: 直肠给药
- C: 静脉注射
- D: 口服给药

答案: C

45. 氰化氢中毒呈现

- A: 出血、凝血时间延长
- B: 恶心、呕吐、口内有金属味
- C: 抽搐、进行性加重
- D: 呼出气体中可有苦杏仁气味

答案: D

46. (2018 年真题) 患者, 男, 69 岁, 因高血压长期服用抗高血压药, 近日患者出现足踝部水肿引起此不良反应的药物是 ()

- A: 非洛地平
- B: 多沙唑嗪
- C: 普萘洛尔
- D: 卡托普利

答案: A

47. (2015 年真题) 解救有机磷中毒过程中, 如阿托品应用过量, 应立刻给予 ()。

- A: 麻黄碱
- B: 东莨菪碱
- C: 山莨菪碱
- D: 毛果芸香碱

答案: D

48. 药师发药时提示患者“不要驾车、操作机器或高空作业等”, 针对的药物是

- A: 卡托普利
- B: 铋制剂
- C: 氟西汀
- D: 氯苯那敏

答案: D

49. 感冒初出现卡他症状, 如鼻黏膜充血、打喷嚏、流眼泪、流鼻涕, 宜选服

- A: 含中枢兴奋剂咖啡因制剂
- B: 含非甾体抗炎药制剂

C: 含氢溴酸右美沙芬制剂

D: 含伪麻黄碱及氯苯那敏制剂

答案：D

50. (2016 年真题) 患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院、目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是（）。

A: 肝素

B: 利伐沙班

C: 氯吡格雷

D: 阿司匹林

答案：D

51. (2016 年真题) 将药物治疗成本和所产生的效益规划为以货币为单位的数字，进行药物经济学评价。这一评价方法属于（）。

A: 成本-效果分析

B: 成本-效益分析

C: 最小成本分析

D: 成本-效用分析

答案：B

52. 妇女口服避孕药致阿米替林清除率下降，引起药源性疾病的因素主要为

A: 遗传因素

B: 基础疾病因素

C: 性别因素

D: 年龄因素

答案：C

53. 在药师应该具备的诸项专业技能中，作为药师的最基本工作的是

- A: 处方点评
- B: 处方调剂
- C: 药品警戒技能
- D: 处方审核

答案：B

54. 某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

- A: 尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药，在以后的 7 天内要加用屏障避孕法
- B: 不再继续服用此周期药物，经过一个 7 天的停药期，再开始继续服用下一周期的药物
- C: 在常规时间 20:00 服用 4 月 25 日的药片，不用补服 4 月 24 日的药片
- D: 尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药，不需要使用额外的避孕措施

答案：D

55. 嗜碱性粒细胞正常值参考范围是

- A: 0~0.01
- B: 0.01~0.05
- C: 0.20~0.40
- D: 0.03~0.08

答案：A

56. 清晨 5 时至中午 11 时最低，下午 2 时至次日凌晨 1 时最高，是指

- A: 胰岛 B 细胞的分泌规律
- B: 胃酸的分泌规律
- C: 肝脏合成胆固醇的规律
- D: 糖皮质激素的分泌规律

答案：B

57. 患者，男，27 岁，电话咨询药师朋友，告知目前正在欧洲旅游，从昨夜开始出现腹泻，呈水样便，起夜 4 次，希望药师给出建议。有关药师给予该患者的建议，错误的是

- A: 口服双八面体蒙脱石散，与抗菌药物同服
- B: 口服补液盐 ORSIII 50ml/kg，4~6h 内服完
- C: 避免高脂肪、高糖饮食
- D: 口服左氧氟沙星胶囊 0.2gtid

答案：A

58. 心力衰竭的风湿性心脏病禁用

- A: RAAS 抑制剂
- B: 强心苷
- C: 利尿剂
- D: β 受体阻断剂

答案：B

59. 血清丙氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 成人 <50U/L
- B: 成人 <40U/L
- C: 男性 11~50U/L
- D: 男性 <40U/L

答案：B

60. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别) 右眼

- A: 0
- B: LD
- C: DOL
- D: NS

答案: A

61. 禁用油类泻剂导泻的毒物是()。

- A: 磷化锌
- B: 麦角胺
- C: 麻黄碱
- D: 阿片类药物

答案: A

62. 患者,男 58 岁,高血压病史 5 年,吸烟史 40 年,日均 40 支,6 小时前出现左侧肢体无力,并逐渐加重,不能站立,家属发现其说话迟钝含混,右侧嘴唇变浅,意识清楚,到某院急诊 BP190/120mmHg,血常规基本正常,行头部 MRI 检查后,诊断为急性脑梗死。

- A: 甘露醇注射液 250mlq6hiv
- B: 胞二磷胆碱注射液 200mgqdiv
- C: 尼莫地平注射液 20mgqdiv
- D: 呋塞米片 200mgqdp

答案: A

63. 服用柳氮磺吡啶的注意事项不正确的是

- A: 必要时服用碱化尿液的药物
- B: 服用期间应避免饮水

C: 服用期间应多饮水

D: 禁用于对磺胺类药物过敏者

答案: B

64. 下述药物中，具有肝药酶诱导作用的是

A: 环丙沙星

B: 卡马西平

C: 西咪替丁

D: 胺碘酮

答案: B

65. 患者，男，45 岁，患有高血压，因感冒致发热、咽痛、流涕到药店买药，药师不应推荐其使用的药物是

A: 复方酚咖伪麻胶囊

B: 速感宁胶囊

C: 维 C 银翘片

D: 速克感冒片

答案: A

66. 治疗胃病的药物

A: 硝酸甘油

B: 去氨加压素

C: 甘草合剂

D: 胃黏膜保护剂

答案: D

67. 药学服务的特殊人群

A: 护理人员

B: 血液透析者

C: 医务人员

D: 广大公众

答案: B

68. 急诊处方药品用量一般不宜超过

A: 7 日用量

B: 1 日用量

C: 15 日用量

D: 3 日用量

答案: D

69. 静脉滴注阿昔洛韦的适宜溶媒是

A: 0.9%氯化钠注射液

B: 5%葡萄糖注射液

C: 50%葡萄糖注射液

D: 复方氯化钠注射液

答案: A

70. (2021 年真题) 哺乳期妇女使用，易诱发新生儿胆红素脑病的药物是 ()

A: 复方炔诺酮

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 胰岛素

D: 依那普利

答案: B

71. 慢性阻塞性肺病急性加重期伴脓痰者宜选用的治疗方案是 ()

- A: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药
- B: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂
- C: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素
- D: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素

答案：D

72. 宜用常量短期治疗，以免产生依赖性，可用于 IBS 患者止泻的药物是

- A: 匹维溴铵
- B: 地芬诺酯
- C: 蒙脱石散
- D: 环孢素 A

答案：B

73. 应急能力较差，较敏感，极易产生药品不良反应，是指

- A: 严格掌握适应证
- B: 密切监护
- C: 明确诊断
- D: 严格掌握用药剂量

答案：B

74. 口服后可导致肠道内 pH 下降，并可通过渗透作用增加结肠内容量的药物是

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 比沙可啶
- C: 乳果糖
- D: 硫酸镁

答案：C

75. 高胆固醇血症，首选的治疗药物是

- A: ω -3 脂肪酸制剂
- B: 他汀类
- C: 贝特类
- D: 烟酸类

答案：B

76. 血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的 8%~9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下，血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

- A: <30g/L
- B: >90g/L
- C: 31~60g/L
- D: 61~90g/L

答案：A

77. 下列抗感冒药中，归属于处方药的是

- A: 对乙酰氨基酚片
- B: 奥司他韦片
- C: 含金刚烷胺的复方制剂
- D: 含伪麻黄碱的复方制剂

答案：B

78. (2018 年真题) 患者,男,60 岁,因水疱型足癣到药店购药药师应推荐的药品是 ()

- A: 利巴韦林软膏

B: 氢化可的松软膏

C: 10%樟脑软膏

D: 特比萘芬乳膏

答案: D

79. 患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15KG，一天前发热(39℃)，咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约2~5次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，R28次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC： 5×10

A: 若症状不能改善，及时加用诺氟沙星

B: 应给予少量、多次、清淡饮食

C: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止

D: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液

答案: A

80. (2018年真题) 患者，男，46岁，因类风湿性关节炎长期使用免疫抑制剂，近日因出现发热、咳嗽、咳痰入院经病原学检查，诊断为侵袭性肺曲霉病，临床欲使用伏立康唑治疗。患者同时合并肝功能不全 Child-Turcotte-Pugh (CTP) 评分为13分 (CTPC级)。根据CTP评分结果，药师的用建议是 ()

A: 该患者重度肝功能不全，不建议使用伏立康唑

B: 该患者轻度肝功能不全，伏立康唑维持剂量减少25%

C: 该患者轻度肝功能不全，伏立康唑维持剂量不变

D: 该患者中度肝功能不全，伏立康唑维持剂量减少50%

答案: A

81. 提示：可能引起咳嗽，是针对

- A: 氟西汀
- B: 氯苯那敏
- C: 卡托普利
- D: 铋制剂

答案：C

82. 可引起嗜酸性粒细胞增多的药物是()

- A: 氯苯那敏
- B: 坎地沙坦
- C: 碳酸氢钠
- D: 头孢氨苄

答案：D

83. 使肿瘤所在局部药物浓度达到相当高的水平而全身药物浓度很低。

- A: 腹腔注射
- B: 膀胱灌注
- C: 动脉注射
- D: 腔内注射

答案：C

84. 低危患者

- A: 立即进行抢救治疗
- B: 立即使用抗高血压药物
- C: 先观察（血压及危险因素）数周，然后决定是否进行药物治疗
- D: 观察相当一段时间，再决定是否进行药物治疗

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/536024202101011030>