

2024 安徽省岳西县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库含答案（名师推荐）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 处方中“餐后给药”的外文缩写是

A: pc

B: qn

C: Ac

D: po

答案：A

2. 瘦肉精（克仑特罗）中毒时，可采用的解毒药是

A: 乙酰胺

B: 普萘洛尔

C: 乙酰半胱氨酸

D: 氟马西尼

答案：B

3. 不需要睡前服用的他汀类药物为

A: 阿托伐他汀

B: 洛伐他汀

C: 辛伐他汀

D: 普伐他汀

答案：A

4. 归属"患者基本情况"的是

- A: 医保和费用支付情况
- B: 联合用药
- C: 临床诊断
- D: 主要实验室检查数据

答案：A

5. 钙制剂

- A: 激素替代剂
- B: 促进骨矿化剂
- C: 骨形成刺激剂
- D: 骨吸收抑制剂

答案：B

6. 治疗窗窄以及代谢存在较大个体差异的药物是（）

- A: 顺铂
- B: 地高辛
- C: 苯妥英钠
- D: 茶碱

答案：D

7. 用药期间饮酒可能出现“双硫仑样反应”的药物是（）

- A: 美罗培南
- B: 克拉霉素
- C: 头孢哌酮
- D: 万古霉素

答案：C

8. 女，30 岁。G2P1 既往月经规律，月经量少，身体健康，要求长期采取避孕措施。

- A: 长效口服避孕药
- B: 安全期避孕
- C: 宫内节育器
- D: 紧急避孕药

答案：C

9. 患者，男，57 岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊，经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为 H1N1 甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是()

- A: 金刚乙胺
- B: 奥司他韦
- C: 利巴韦林
- D: 金刚烷胺

答案：B

10. 慎用硝酸甘油的原因是

- A: 引起嗜睡
- B: 引起多尿或多汗
- C: 致使定向力障碍
- D: 致使视力模糊

答案：D

11. 痛风急性发作期不宜服用，以防发生转移性痛风发作的是

- A: 泼尼松
- B: 秋水仙碱
- C: 苯溴马隆

D: 别嘌醇

答案: C

12. 下列用于治疗咳嗽的药物中，属于祛痰剂的是

A: 可待因

B: 右美沙芬

C: 羧甲司坦

D: 氨溴索

答案: D

13. 湿疹患者的实验室检查结果常会出现 ()

A: 中性粒细胞减少

B: 淋巴细胞增多

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 淋巴细胞减少

答案: C

14. 属于 HIV 整合酶链转移抑制剂的是 ()

A: 奈韦拉平

B: 洛匹那韦

C: 多替拉韦

D: 阿巴卡韦

答案: C

15. 接种乙肝疫苗后，血清免疫学检查可呈现阳性反应的指标是

A: 乙型肝炎病毒 e 抗体?

B: 乙型肝炎病毒表面抗原?

C: 乙型肝炎病毒表面抗体?

D: 乙型肝炎病毒 e 抗原?

答案: C

16. 可治疗男性性功能障碍的药物是

A: 沙美特罗

B: 度洛西汀

C: 西地那非

D: 维生素 E

答案: C

17. 高脂饮食可促进其吸收的药物是()

A: 维 A 酸片

B: 左旋多巴片

C: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊

D: 非洛地平片

答案: A

18. 正常人的体温在 37℃左右，但各个部位的温度不尽相同，内脏温度最高，头部次之，皮肤和四肢末端的温度最低。发热是指人体体温升高，超过正常范围。发热是人体对致病因子的一种全身性防御反应，是患病时常伴发或主要表现的一种症状。

A: 口腔温度超过 37.3℃

B: 直肠温度超过 36.3℃

C: 口腔温度超过 37.0℃

D: 腋下温度超过 36.6℃

答案: A

19. 应提示患者服用后舌苔、大便可呈灰褐色的是

- A: 氟西汀
- B: 米索前列醇
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 胰岛素注射剂

答案：C

20. 与蛇胆川贝液不宜联用的药物是

- A: 阿托品
- B: 苯巴比妥
- C: 氢氧化铝
- D: 可待因

答案：D

21. (处方缩写) 餐后的缩写为

- A: iv
- B: pc
- C: qid
- D: q4h

答案：B

22. 患者，男，56 岁，诊断为病毒性乙型肝炎。实验室检查：HbeAg (+)，HBV-DNA ≥ 20000 IU/ml。ALT 200 U/L。现需要启动抗病毒治疗，采用干扰素 α 和核苷(酸)类抗病毒药物。

- A: 中性粒细胞计数 $< 0.5 \times 10^9/L$ ，应停药
- B: 出现体温升高、肌肉酸痛可服用对乙酰氨基酚
- C: 中性粒细胞计数 $\leq 0.75 \times 10^9/L$ ，应减量
- D: 血小板计数 $< 100 \times 10^9/L$ ，应减量

答案：D

23. 理论效价的表示中，以其特定的“盐” $1\mu\text{g}$ 作为 1IU 抗生素是

- A: 红霉素
- B: 链霉素
- C: 土霉素
- D: 盐酸四环素

答案：D

24. 患儿，男，1 岁 4 个月，家长为预防幼儿缺钙，每日给患儿用维生素 D5000IU。3 个月后患儿出现乏力、恶心、呕吐、食欲不振等症状。化验结果：血钙 18mg/dl ，25-OH-维生素 D，水平 632ng/ml 。诊断为维生素 D 中毒。下列处理措施错误的是

- A: 停用维生素 D 及其强化食品
- B: 停用钙剂
- C: 增加日晒
- D: 停饮牛奶

答案：C

25. 服药期间饮酒可致药效增强、引发风险的药物是

- A: 格列本脲
- B: 泼尼松
- C: 维生素
- D: 维生素

答案：A

26. (2016 年真题) 患者，男，67 岁，因带状疱疹前来就诊，实验室检查肌酐清除率 100ml/min ，医生处方阿昔洛韦片治疗，对于该患者，适宜的用法用量是 ()。

- A: 0.4g，每日 5 次
- B: 0.4g，每日 2 次
- C: 0.4g，每日 4 次
- D: 0.4g，每日 3 次

答案：A

27. 治疗大肠埃希菌所致的尿路感染，不宜选用的抗菌药物是

- A: 左氧氟沙星
- B: 阿奇霉素
- C: 阿莫西林
- D: 头孢呋辛

答案：B

28. 患者男，55 岁，BMI28，2 型糖尿病 5 年，伴有高脂血症，应首选的降糖药是

- A: 格列本脲？
- B: 阿卡波糖？
- C: 二甲双胍？
- D: 罗格列酮？

答案：C

29. 感冒初出现卡他症状，如鼻黏膜充血、打喷嚏、流眼泪、流鼻涕，宜选服

- A: 含伪麻黄碱及氯苯那敏制剂
- B: 含氢溴酸右美沙芬制剂
- C: 含中枢兴奋剂咖啡因制剂
- D: 含非甾体抗炎药制剂

答案：A

30. 以下用于治疗寻常型痤疮的药物中，属于非处方药的是

- A: 阿达帕林
- B: 过氧苯甲酰
- C: 维胺酯
- D: 异维 A 酸

答案：B

31. 在治疗痛风时，应用排尿酸药过程中，应多饮水，一日尿量宜保持在

- A: 1500ml 以上
- B: 2000ml 以上
- C: 1000ml 以上
- D: 500ml 以上

答案：B

32. 下列疾病中，WHO 视为艾滋病最常见的机会性感染的是

- A: 肺炎
- B: 结核病
- C: 卡氏肉瘤
- D: 腹泻

答案：B

33. 强腐蚀剂中毒

- A: 不能导泻
- B: 不能用强利尿剂
- C: 不能催吐
- D: 禁止洗胃

答案：D

34. 下列药物中，即使肝功能不全的病人也可使用原剂量的是

- A: 氯霉素
- B: 青霉素
- C: 苯妥英钠
- D: 洋地黄毒苷

答案：B

35. 发现处方存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施

- A: 处方审核
- B: 治疗药物监测
- C: 静脉药物配置
- D: 处方点评

答案：D

36. 以下的论述哪项是错误的

- A: 普萘洛尔不可抑制肾素的分泌
- B: 氢氯噻嗪作为基础降压药可单用于轻度高血压，也可与其他降压药合用，提高疗效，减少不良反应
- C: 氢氯噻嗪不可与普萘洛尔合用于治疗高血压
- D: 硝普钠可用于高血压危象和慢性心功能不全

答案：C

37. 关于治疗肺炎的用药注意事项，叙述不正确的是

- A: 肺炎的抗菌药物治疗应尽早进行，一旦怀疑为肺炎即应马上给予首剂抗菌药物

B: 肺炎的药物治疗应避免使用抗生素，其他药物无效时再考虑使用抗生素

C: 体温正常 48~72h，无肺炎任何一项临床不稳定征象可停用抗菌药物

D: 抗菌药物治疗后 48~72h 应对病情进行评价

答案：B

38. 夜间咳嗽宜选用的药品是

A: 右美沙芬

B: 苯丙哌林

C: 羧甲司坦

D: 可待因

答案：A

39. 药物相互作用包括发生在体内的药动学、药效学方面的作用；以及发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

A: 用药时同服甲氧氯普胺

B: 抗酸药合用四环素类药

C: 磺胺类药与青霉素合用

D: 依他尼酸合用华法林

答案：D

40. 交代患者用药期间应禁止摄入酒精，以免加深中枢神经抑制的是

A: 氟西汀

B: 米索前列醇

C: 枸橼酸铋钾

D: 胰岛素注射剂

答案：A

41. II 期临床试验很难发现“低于 1% 发生频率”的不良反应，缘于

- A: 病例数目少
- B: 管理漏洞
- C: 考察不全面
- D: 观察时间短

答案：A

42. (2018 年真题) 举重运动员使用后, 可短时间内急速降低体重, 因此需按兴奋剂管理的药物是 ()

- A: 硝苯地平
- B: 呋塞米
- C: 普萘洛尔
- D: 缬沙坦

答案：B

43. 急、慢性或习惯性便秘可选

- A: 乳果糖
- B: 聚乙二醇粉
- C: 比沙可啶
- D: 硫酸镁

答案：C

44. I 期临床试验是初步的临床药理学及人体安全性评价。试验对象主要为健康受试者，样本数一般只有

- A: 12~13 例
- B: 20~24 例

C: 20~30 例

D: 10~18 例

答案: C

45. 应用华法林抗凝治疗时，INR 的安全有效范围在我国通常为

A: <2.0

B: 2.0~3.0

C: >3.0

D: 2.0~2.5

答案: B

46. 合并闭角型青光眼的前列腺增生患者不宜选用的药物是()

A: 坦索罗辛

B: 多沙唑嗪

C: 托特罗定

D: 非那雄胺

答案: C

47. 下列口服降糖药中，最适宜餐后血糖(PBG)高者选用的口服降糖药是

A: 格列本脲

B: 格列美脲

C: 格列齐特

D: 格列吡嗪

答案: D

48. 慢性肾小球肾炎常见

A: 蜡样管型

- B: 白细胞管型
- C: 细胞管型
- D: 颗粒管型、透明管型

答案：D

49. 妊娠期妇女不宜选用药物是

- A: 氯化钾
- B: 青霉素
- C: 维生素 A
- D: 华法林

答案：D

50. 可提示隐性黄疸或亚临床性黄疸的是

- A: $STB 34.2 \mu\text{mol} / \text{L} \sim 171 \mu\text{mol} / \text{L}$
- B: $STB 17.1 \mu\text{mol} / \text{L} \sim 34.2 \mu\text{mol} / \text{L}$
- C: $STB > 342 \mu\text{mol} / \text{L}$
- D: $STB 17.1 \mu\text{mol} / \text{L} \sim 171 \mu\text{mol} / \text{L}$

答案：B

51. 解救急性乙醇中毒的是 ()

- A: 纳洛酮
- B: 双复磷
- C: 二巯丁二钠
- D: 亚硝酸钠

答案：A

52. 6 个月~2 岁儿童的白细胞计数的正常范围值

- A: $(10.0 \sim 20.0) \times 10^9 / \text{L}$

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: $(15.0 \sim 20.0) \times 109/L$

C: $(3.5 \sim 10.0) \times 109/L$

D: $(11.0 \sim 12.0) \times 109/L$

答案：D

53. (2017 年真题) 患者, 77 岁, 因感冒发热咳嗽, 自服酚麻美敏片、维 C 银翘片, 三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是 ()

A: 对乙酰氨基酚

B: 维生素

C: 氯苯那敏

D: 银翘

答案：C

54. 以下属于急性肾盂肾炎的表现的是

A: 可出现排尿不适、下腹痛和排尿困难

B: 尿液常浑浊, 有异味

C: 约 30% 可出现血尿

D: 老年人表现不典型, 可仅表现为纳差、淡漠、谵妄等

答案：D

55. 服药时饮茶可降低疗效的是

A: 格列本脲

B: 维生素 A

C: 硫酸亚铁

D: 西咪替丁

答案：C

56. 下列药物中，可以增加缺血性脑卒中发作风险的药物是()

- A: 叶酸
- B: 口服避孕药
- C: 银杏叶片
- D: 阿司匹林

答案：B

57. 铁剂联用维生素 C，可增加疗效的机制是（）

- A: 延缓或降低抗药性
- B: 作用于不同的靶点
- C: 协同作用
- D: 促进机体的吸收利用

答案：D

58. (2016 年真题) 患者，男，40 岁，因肺结核使用抗结核药后，四肢出现针刺感，导致这种症状的药物是（）。

- A: 异烟肼
- B: 乙胺丁醇
- C: 利福平
- D: 吡嗪酰胺

答案：A

59. 峰值一般在清晨 7~8 时，谷值则在午夜 0 时，是指

- A: 糖皮质激素的分泌规律
- B: 肝脏合成胆固醇的规律
- C: 胃酸的分泌规律
- D: 胰岛 B 细胞的分泌规律

答案：A

60. 格列本脲

- A: 宜餐后服用
- B: 宜睡前服用
- C: 宜清晨服用
- D: 宜餐前服用

答案: D

61. 患者，男，46 岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌症是()

- A: 双侧肾动脉狭窄
- B: 冠心病
- C: 痛风
- D: 心力衰竭

答案: D

62. 以下不同人群中，白细胞或红细胞计数正常值参考范围的数值最高的是

- A: 成人女性
- B: 成人男性
- C: 新生儿
- D: 儿童

答案: C

63. 某患者到药店购买降糖灵，药师应交付的药物是

- A: 格列本脲
- B: 苯乙双胍
- C: 吡拉西坦

D: 胃得灵

答案: B

64. 为使药物作用与胆固醇合成高峰期同步，普伐他汀等适宜

A: 清晨服用

B: 睡前服用

C: 餐前服用

D: 餐后服用

答案: B

65. 针对单纯严重乙醇中毒同时出现烦躁不安症状的患者，下列救治措施，错误的是()

A: 静脉滴注维生素 C 注射液 1g

B: 静脉注射 50%葡萄糖注射液 100ml 和胰岛素 20U

C: 静脉注射纳洛酮 0.4mg 和吗啡 20mg

D: 肌肉注射维生素 B

答案: C

66. 主要用于降低三酰甘油的药物是

A: 他汀类

B: 普罗布考

C: 贝丁酸类

D: 考来烯胺

答案: C

67. 需要在冷处贮存的高警示药品是

A: 高锰酸钾

B: 胰岛素

C: 肾上腺素

D: 降钙素

答案: B

68. 发现处方存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施，归属于

A: 治疗药物监测

B: 静脉药物配置

C: 处方审核

D: 处方点评

答案: D

69. 常见药源性疾病有药源性胃肠道疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、血液疾病、神经系疾病、高血压病。

A: 阿洛司琼

B: 利血平

C: 呋塞米

D: 阿米替林

答案: D

70. 合并闭角型青光眼的前列腺增生症患者不宜选用的药物是

A: 非那雄胺

B: 托特罗定

C: 多沙唑嗪

D: 坦索罗辛

答案: B

71. 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用的止吐治疗方案是

A: 化疗前使用阿瑞吡坦，化疗后需要继续使用止吐药

B: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予阿瑞吡坦和地塞米松

C: 化疗联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予地塞米松或昂丹司琼

D: 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药

答案：B

72. 患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断服用沙丁胺醇 4mg tid 治疗，没有规律用药治疗。因秋冬季交替出现明显喘憋，话不成句，被紧急送医预防治疗。

A: 沙丁胺醇片

B: 布地奈德气雾剂

C: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂

D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：D

73. 下列药物中使用前无需皮试的是

A: 紫杉醇注射剂

B: 抑肽酶注射剂

C: 苄星青霉素注射剂

D: 抗狂犬病病毒血清注射剂

答案：A

74. 关于癌症疼痛患者止痛药使用原则的说法，错误的是（）

A: 按阶梯给药

B: 应个体化用药

C: 疼痛时用药，不痛时无需用药

D: 提倡无创给药方式，尽量口服

答案：C

75. 患者女, 25 岁, 两天前淋雨后开始发热, 体温 39.0℃, 咳嗽, 咳铁锈色黏痰, 化验结果提示白细胞计数及中性粒细胞比例升高, 诊断为肺炎, 经验性抗感染治疗时适宜选用的药物 ()

- A: 阿奇霉素
- B: 头孢他啶
- C: 头孢唑林
- D: 阿米卡星

答案：C

76. 早晨因咳嗽和打喷嚏引起的头痛, 提示可能是

- A: 动脉瘤
- B: 脑肿瘤
- C: 脑血管意外
- D: 脑膜炎

答案：B

77. 对购药患者讲授安全用药常识是

- A: 教育方式
- B: 主动方式
- C: 协商方式
- D: 指令方式

答案：B

78. 可致昏迷及惊厥

- A: 抗组胺药
- B: 维生素 A

C: 苯妥英钠

D: 氯霉素

答案：A

79. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响, 长期服用阿司匹林

A: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血

B: 可能致胎儿畸形

C: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍

D: 导致新生儿血钙过高

答案：A

80. 患者，男 50 岁，血压 170/95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是：

A: α 受体阻滞剂+ACEI

B: β 受体阻滞剂+ARB

C: 利尿剂+CCB

D: 利尿剂+AR

答案：C

81. 患者，女，62 岁，医师处方如下：患者：××X，性别：女，年龄：62 岁。临床诊断：2 型糖尿病高血压 2 级高脂血症 PCI 术后。

A: 阿卡波糖

B: 氯吡格雷

C: 二甲双胍

D: 氨氯地平

答案：B

82. 禁止与单胺氧化酶抑制剂联用的药物不包括

- A: 5-HT
- B: 苯二氮
- C: 三环类药物
- D: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

答案：B

83. 胃黏膜保护药硫糖铝应该

- A: 在餐前 15 分钟服用
- B: 在餐后 1~2 小时服用
- C: 在早、晚餐前 1.5 小时服用
- D: 在餐前 1 小时服用

答案：D

84. 有机酸排出减少

- A: 肾小管分泌减少
- B: 肾小球滤过减少
- C: 肾小管重吸收增加
- D: 肾血流量减少

答案：A

85. 为细菌感染性腹泻患者开具小檗碱片、盐酸地芬诺酯片与双八面体蒙脱石散的处方，应评判为

- A: 无正当理由超适应证用药
- B: 联合用药不适宜
- C: 有禁忌证用药
- D: 过度治疗用药

答案：B

86. (2018 年真题) 患者, 女, 30 岁, 因感冒所致发热 (体温 38.5℃) 并伴有头痛、全身酸痛到药店购药, 药师应推荐的药品是 ()

- A: 对乙酰氨基酚片
- B: 氯苯那敏片
- C: 萘甲唑啉滴鼻液
- D: 酚麻美敏片

答案: A

87. 处方中开具 "黄体酮用于排除输尿管结石", 应评判为

- A: 有禁忌证用药
- B: 无正当理由超适应证用药
- C: 联合用药不适宜
- D: 过度治疗用药

答案: B

88. 各种肠道染性或非感染性腹泻, 或急性胃肠炎可引起

- A: 米泔水样便
- B: 脓状便
- C: 黏液便
- D: 稀糊状或水样粪便

答案: D

89. 人体的生物钟规律即指在人体内调控某些生化、生理和行为现象有节奏地出现的生理机制, 很多药物的作用和毒性、不良反应与人体的生物节律 (生物钟) 有着极其密切的关系, 同一种药物在同等剂量可因给药时间不同而产生不同的作用和疗效。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 清晨服用泼尼松

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/536120234103011030>