专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年陕西省镇坪县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试大全【网校专用】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.（2017年真题）药师在工作中预防用药错误可以采取的行为不包括（）

A：自行修改错误处方

B：仔细核对药品

C：严格审核处方

D：进行用药指导

答案：A

2.肿瘤患者在化疗后出现痛性黏膜炎，可对症给予

A：吗啡

B：醋酸甲地孕酮一地塞米松

C：劳拉西泮

D：苯海拉明一利多卡因一氢氧化镁铝

答案：D

3.患者男,34岁因糖尿病酮症酸中毒入院,需静脉给予胰岛素或胰岛素类似物,应选用的药物是（）

A：门冬胰岛素

B：普通胰岛素

C：精蛋白锌胰岛素

D：低精蛋白锌胰岛素

答案：B

4.氯化钾注射液的正确给药方法是

A: 稀释后静脉滴注

B: 鞘内注射给药

C: 直接肌内注射

D: 直接静脉注射

答案：A

5.甲状旁腺素制剂属于

A: 骨形成刺激剂

B: 骨吸收抑制剂

C: 激素替代剂

D: 促进骨矿化剂

答案：A

6.患儿，男，1岁3个月，因仍不能独立行走而就诊。经询问其母亲，该患儿一直睡眠不好，夜哭较多，非常容易出汗，数次罹患呼吸道感染。查体：头部有“枕秃”。实验室检查：血钙水平低于正常值。诊断为“佝偻病”。

A: 15万一30万IU

B: 30万一45万IU

C: 10万一15万IU

D: 30万～60万IU

答案：A

7.为避免重复用药，书写处方时，药品名称应采用

A: 商品名

B: 通用名

C：化学名

D：专利名

答案：B

8.患者,女,72岁,有青霉素过敏史。主诉尿痛、尿频,尿常规检查示大量白细胞,尿细菌数105cfu/m,诊断为急性膀胱炎。应选用的药物是

A：复方磺胺甲噁唑片

B：阿莫西林胶囊

C：莫西沙星片

D：阿奇霉素片

答案：A

9.万古霉素0.5g加入5%葡萄糖注射液100ml中静脉滴注要求滴注时间不得少于1h，已知每毫升15滴，每分钟最多可滴注的滴数约是()

A：50滴

B：7滴

C：15滴

D：25滴

答案：D

10.(儿童用药特点)针对儿童最方便、最安全、最经济的给药途径

A：静脉给药

B：皮下注射

C：局部给药

D：口服给药

答案：D

11.一般情况下，每张处方中开具的西药和中成药的总数目最多为

A：5种

B：4种

C：2种

D：3种

答案：A

12.由国家药典委员会组织编写的是

A：《医师案头参考》

B：《国家基本药物处方集》

C：《中国国家处方集》

D：《中国药典临床用药须知》

答案：D

13.“尽量为患者选择给药方便的药物和剂型”体现选择治疗药物的

A：安全性

B：方便性

C：有效性

D：经济性

答案：B

14.可提示隐性黄疸或亚临床性黄疸的是

A：17.1μmol/L～34.2μmol/L

B：>342μmol/L

C：34.2μmol/L～171μmol/L

D：17.1μmol/L～171μmol/L

答案：A

15.患者,女,75岁,近来因家庭变故出现焦虑相关的精神和躯体症状,入睡困难,多梦易惊醒,诊断为焦虑症、核查其用药记录,患者在服用氨氯地平、阿托伐他汀钙。

A: 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂

B: 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂

C: 三环类抗抑郁药

D: 苯二氮?类药物

答案：D

16.孕妇的急性膀胱炎治疗时间为（）

A: 8-10天

B: 10-15天

C: 5-10天

D: 3-7天

答案：D

17.容易引湿的药物是

A: 胃蛋白酶

B: 青霉素类

C: 牛痘菌苗

D: 阿扑吗啡

答案：A

18.用于解救苯二氮䓬类药物中毒的特殊解毒剂是

A: 氟马西尼

B: 纳洛酮

C: 乙酰半胱氨酸

D: 亚甲蓝

答案：A

19.治疗水疱型足癣宜选用的药物是

A：阿昔洛韦软膏

B：维 A 酸乳膏

C：氢化可的松软膏

D：复方苯甲酸酊

答案：D

20.属于 CYP1A2 强抑制剂的药物是

A：环丙沙星

B：西咪替丁

C：氟康唑

D：红霉素

答案：A

21.一般情况下，容易透过透析膜被清除的药物是

A：分布容积小的药物

B：分子量>500 的药物

C：血浆蛋白结合率高的药物

D：低水溶性的药物

答案：A

22.育龄期癫痫患者可酌情选用

A：丙戊酸钠

B：乙琥胺

C：卡马西平

D：托吡酯

答案：C

23.反复性偏头痛，推荐应用的药物是

A：罗通定

B：谷维素

C：阿司匹林

D：地西泮

答案：A

24.（2021年真题）为配制有效氯浓度为500mg/L的消毒剂10L,需要次氯酸钠溶液（有效氯浓度为6．0%）和纯化水的量分别是（）

A：83mL和9917mL

B：120mL和9880mL

C：830mL和9170mL

D：150mL和9850mL

答案：A

25.患者,男,65岁,诊断为高血压(2级),同时有哮喘病史,不宜选用的药物是()

A：普萘洛尔

B：多沙唑嗪

C：非洛地平

D：卡托普利

答案：A

26.肾脏功能主要是分泌和排泄尿液、废物、毒物和药物，调节和维持体液容量和成分，维持机体内环境（血压、内分泌）的平衡。变态反应、感染、肾血管病变、代谢异常、先天性疾病、全身循环和代谢性疾病、药物、毒素对肾脏的损害，均可影响肾功能。

A: 53～97μmol／L

B: 18～62μmol／L

C: 18～35μmol／L

D: 45～84μmol／L

答案：C

27.患者，男性，36岁，主因“反复上腹部疼痛3年，加重伴黑便2天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院3年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前2天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排3次，每次约2509左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36．2℃、P84次／分、R20次／分、BP110／70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音3～5次／分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有-1．5cm×2cm椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 左氧氟沙星500mgqd+呋喃唑酮100mgbid+四环素500mgqid+枸橼酸铋钾220mgbid，疗程2周

B: 四环素500mgtid+甲硝唑400mgtid+艾司奥美拉唑20mgbid+枸橼酸铋钾220mgbid。疗程2周

C: 克拉霉素 500ragbid+左氧氟沙星 200mgbid+甲硝唑 400mgqid+艾司奥美拉唑 20mgbid，疗程 2 周

D: 阿莫西林1000mgbid+克拉霉素500mgbid+艾司奥美拉唑20mgbid+枸橼酸铋钾220mgbid；疗程2周

答案：B

28.蒽环类抗肿瘤药可引起

A: 末梢神经炎

B: 心脏毒性

C: 出血性膀胱炎

D: 溶血性尿毒症

答案：B

29.静注的缩写为

A: qid

B: q4h

C: iv

D: pc

答案：C

30.由服用利尿药所引起的尿失禁属于

A: 真性尿失禁

B: 急性、可逆性/暂时性尿失禁

C: 急迫性尿失禁

D: 压力性尿失禁

答案：B

31.在与患者进行沟通的过程中，切忌的事项是

A: 尽量避免使用专业术语

B: 一次性尽量提供更多的信息

C: 认真聆听

D: 可提供一些宣传资料

答案：B

32.属于第三代头孢菌素类抗菌药物的是

A: 头孢曲松

B: 头孢拉定

C: 头孢洛林酯

D: 头孢吡肟

答案：A

33.治疗药物评价的内容，一般不包括的项目是：

A: 有效性

B: 经济型

C: 依从性

D: 安全性

答案：C

34.急性痛风性关节炎常见单个关节出现红、肿、热、痛，最常见的部位是

A: 膝关节?

B: 腕关节?

C: 第一跖趾关节?

D: 踝关节?

答案：C

35.可迅速崩解和释放药物的制剂

A: 透皮贴剂

B：膜剂

C：滴丸剂

D：泡腾片剂

答案：D

36.饮食对粪外观的影响,食西红柿、西瓜

A：红色

B：黑褐色

C：暗绿色

D：酱色

答案：A

37.药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示有明确的风险，有必要采取措施以降低风险的信号属于

A：尚不确定的信号

B：部分确认的信号

C：驳倒的信号

D：确认的信号

答案：D

38.（2015年真题）处方中“餐后给药”的外文缩写是（）。

A：Ac

B：pc

C：po

D：qn

答案：B

39.作用于靶器官的多巴胺受体，神经系统副作用罕见的是

A：甲氧氯普胺

B：多潘立酮

C：莫沙必利

D：西沙必利

答案：B

40.服用氨基糖苷类药时应该禁用的是

A：脂肪

B：食盐

C：食醋

D：酒

答案：C

41.（2015年真题）中成药血脂康中含有的化学成分是（）。

A：依折麦布

B：洛伐他汀

C：阿托伐他汀钙

D：辛伐他汀

答案：B

42.苯妥英、地塞米松、地西泮在妊娠26～29周时游离药物浓度达高峰，是由于

A：妊娠期药物分布容积明显增加

B：血容量增加使血浆清蛋白浓度降低

C：妊娠晚期血流动力学发生改变较多

D：胃肠活动程度减弱，使吸收减慢

答案：B

43.下列选项中，关于老年人患病的叙述，错误的是()。

A：机体适应能力低下，一旦发病，病情常迅速恶化

B：自觉症状常较轻微，临床表现往往不典型

C：患病时一般不容易出现意识障碍和精神症状

D：常常是多系统同时发病或同一脏器、同一系统发生多种疾病

答案：C

44.稳定型心绞痛发作时的治疗选用

A：氯贝丁酯

B：硝酸甘油

C：低分子肝素

D：阿司匹林

答案：B

45.患者,男,65岁,诊断为持续性心房纤颤,医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症,目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况,药师提出的合理化药物治疗建议,不包括()

A：患者在复律成功后,尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗

B：胺碘酮可以显著抑制CYP2D6,减慢美托洛尔的代谢,应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量

C：因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用,建议换成氨氯地平等CCB降压药

D：胺碘酮能增加华法林的抗凝活性,在逐渐降低胺碘酮剂量的时候,注意随时根据INR值调整华法林的剂量

答案：C

46.适用于急性疼痛、骨关节炎的处方药是

A: 阿托品

B: 硫酸氨基葡萄糖

C: 可待因

D: 塞来昔布

答案：D

47.根据药物对胎儿的危害，美国FDA将妊娠用药分为A、B、C、D、X五个级别属于妊娠毒性X级的药物是查看材料

A: 万古霉素

B: 阿莫西林

C: 沙利度胺

D: 葡萄糖

答案：C

48.根据药物对胎儿的危害,美国FDA将妊娠用药毒性分为A、B、C、D、X五个级别,依那普利的妊娠毒性分级是()

A: A级

B: C级

C: X级

D: D级

答案：D

49.静脉给药用于重度及危重度哮喘治疗的药品是

A: 异丙托溴铵

B: 孟鲁司特

C: 噻托溴铵

D: 氨茶碱

答案：D

50.切忌直接静脉注射，应于临用前稀释，否则不仅会引起剧痛，且可致心脏停搏的药物是

A: 两性霉素B

B: 氯化钾

C: 头孢曲松钠

D: 青霉素

答案：B

51.对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是

A: 乙酰唑胺

B: 依他尼酸

C: 布美他尼

D: 氢氯噻嗪

答案：B

52.伴痛风者禁用()。

A: 利尿剂（噻嗪类）

B: 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂

C: ACEI

D: 利尿剂（袢利尿药）

答案：A

53.患者，男，52岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

A: 雷米普利

B: 左旋氨氯地平

C: 比索洛尔

D: 氟伐他汀

答案：D

54.接种乙型肝炎疫苗后，血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是：

A: 乙型肝炎病毒表面抗体

B: 乙型肝炎病毒表面抗原

C: 乙型肝炎病毒e抗体

D: 乙型肝炎病毒e抗原

答案：A

55.（2017年真题）患者，男52岁，身高168cm，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖7.8mmol/L（正常值:3.9～6.1mmol/L），餐后血糖148mmo/L（正常值:<7.8mmol/L），血尿酸580μmol/L（正常值:男性180～440μmol/L），LDL-c3.7mmo/L（正常值:2.1~3.1mmo/L）肌酐清除率100ml/min。颈动脉彩超提示:动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症.

A: 适量运动

B: 控制体重

C: 应用阿司匹林

D: 低嘌呤饮食

答案：C

56.药物的成本与产生的收益之间进行对比，评价治疗方案的经济性，以货币为单位。该药物经济学评价方法是

A: 成本-效果分析

B: 成本-效益分析

C: 最小成本分析

D: 成本-效用分析

答案：B

57.患者平日佩戴隐形眼镜，使用抗结核药后，导致患者隐形眼镜染色的药物是()

A：乙胺丁醇

B：利福平

C：异烟肼

D：吡嗪酰胺

答案：B

58.主要药物代谢酶系活性接近成人，对多数药物具有足够的代谢能力，即

A：药物吸收

B：药物排泄

C：药物代谢

D：药物分布

答案：C

59.药物不良反应多潘立酮（）

A：性功能障碍

B：溢乳现象

C：睡眠障碍

D：黑便

答案：B

60.下列药物属于改善眼部调节功能的是

A：山莨菪碱滴眼药

B：羟甲基纤维素钠滴眼液

C：玻璃酸钠滴眼液

D：七叶洋地黄双苷滴眼液

答案：D

61.患者，男，28岁，主诉：发作性四肢抽搐2年，加重2月，化验结果显示TSH增高，FT3，FT4减低，临床诊断为甲状腺功能减退，欲使用左甲状腺素钠治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是

A：100μg，qd，早餐后半小时，顿服

B：100mg，qd，晚餐后顿服

C：100μg，qd，早餐前半小时，顿服

D：100mg，qd，睡前顿服

答案：C

62.可能引起肺间质病变的药物是（）

A：羟氯喹

B：柳氮磺吡啶

C：甲氨蝶呤

D：硫唑嘌呤

答案：C

63.阿托品联用氯解磷定解救有机磷重度中毒的机制是

A：促进机体的利用

B：竞争性拮抗作用

C：作用于不同的靶点

D：延缓或降低抗药性

答案：C

64.心力衰竭抗高血压药物的禁忌证

A：依那普利

B：美托洛尔

C：维拉帕米

D：氢氯噻嗪

答案：C

65.对于尿液的描述正确的是

A：正常人的尿量变化幅度不大

B：正常人的新鲜尿液呈弱碱性

C：尿量的多少主要取决于肾小球滤过率和肾小管的重吸收

D：正常人每日排出尿液1～2L，其中50％为水分

答案：C

66.患者,女,76岁,慢性阻塞性肺病病史10年年来多次因急性加重入院,予以抗感染等治疗。近日因咳嗽咳痰加重再次入院,经验性抗感染治疗时适宜选用的药物是（）

A：阿奇霉素

B：头孢唑林

C：头孢他啶

D：阿米卡星

答案：C

67.根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度重度贫血为

A：30～60g/L

B：60～90g/L

C：120～160g/L

D：90～120g/L

答案：A

68.患儿，男，1岁3个月，因仍不能独立行走而就诊。经询问其母亲，该患儿一直睡眠不好，夜哭较多，非常容易出汗，数次罹患呼吸道感染。查体：头部有“枕秃”。实验室检查：血钙水平低于正常值。诊断为“佝偻病”。

A: 泼尼松2mg/（kg·d）口服

B: 降钙素50～100U/d肌注

C: 立即停止使用维生素D

D: 少饮水

答案：D

69.下列药物中，即使肝功能不全的病人也可使用原剂量的是

A: 苯妥英钠

B: 氯霉素

C: 洋地黄毒苷

D: 青霉素

答案：D

70.下列物质口服中毒后，解救时不宜洗胃的是

A: 重金属

B: 汽油

C: 砒霜

D: 乐果

答案：B

71.成人血小板计数正常参考区间是

A: (100～300)×10

B: (4.0～10.0)×10

C: (11.0～12.0)×10

D: (200～300)×10

答案：A

72.可影响幼儿软骨发育，导致承重关节损伤的药物是

A: 阿米卡星

B: 头孢唑林

C: 诺氟沙星

D: 米诺环素

答案：C

73.餐前15～20min服用的药物是

A: 奥美拉唑

B: 复方氢氧化铝

C: 伊托必利

D: 阿托伐他汀

答案：C

74.患者，女，65岁，因乳腺癌接受第二周期化疗。禁用的止吐药物是（）

A: 苯海拉明

B: 甲氧氯普胺

C: 地塞米松

D: 昂丹司琼

答案：B

75.下列疾病中，WHO视为艾滋病最常见的机会性感染的是

A: 结核病

B：腹泻

C：卡氏肉瘤

D：肺炎

答案：A

76.高血压合并糖尿病、肾功能不全，宜选用的药物是

A：缬沙坦

B：非洛地平

C：美托洛尔

D：氢氯噻嗪

答案：A

77.氟乙酰胺中毒的特效解毒剂是（）

A：青霉胺

B：维生素K1

C：纳洛酮

D：乙酰胺

答案：D

78.具有中枢和周围抗多巴胺双重作用的是

A：西沙必利

B：多潘立酮

C：甲氧氯普胺

D：莫沙必利

答案：C

79.解救经口急性铅中毒的洗胃液是

A：1%硫酸铜

B：1%氯化钠

C：1%硫酸镁

D：3%过氧化氢

答案：C

80.ADR报告表对不良反应的主要临床表现和体征进行明确、具体的描述；如过敏性皮疹的类型、性质、部位、面积大小等；所对应的项目是

A：不良反应/事件的结果

B：用药起止时间

C：ADR/ADE过程描述

D：用药原因

答案：C

81.MAO-B抑制剂

A：苯海索

B：恩托卡朋

C：司来吉兰

D：左旋多巴

答案：C

82.可提示肝细胞性黄疸的是

A：34.2μmol/L～171μmol/L

B：17.1μmol/L～171μmol/L

C：17.1μmol/L～34.2μmol/L

D：>342μmol/L

答案：B

83.可引起体位性低血压，服用后，患者由卧而坐起或由坐而站起等从低位向高位的转换动作时均应缓慢，动作不能突然的药物是

A：卡马西平

B：特拉唑嗪

C：左氧氟沙星

D：头孢哌酮

答案：B

84.某患者，女，14岁，尿频、尿急、尿痛3天，伴腰痛。肾区叩击痛，血分析见白细胞及中性粒细胞百分比升高，尿分析见尿液浑浊，尿白细胞+++，临床诊断为急性肾盂肾炎。

A：头孢噻肟

B：阿奇霉素

C：左氧氟沙星

D：林可霉素

答案：A

85.90g/L≤Hb量

A：中度贫血

B：轻度贫血

C：基本正常

D：重度贫血

答案：B

86.沟通时多使用服务用语、通俗易懂的语言、短句子和开放式提问方式

A：关注特殊人群

B：注意语言的表达

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/536233133204011030