2024年河北省孟村回族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背200题完整题库含答案（黄金题型）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.下列药品中，属于药品类易制毒化学品的兴奋剂是

A：可待因

B：麻黄碱

C：螺内酯

D：芬太尼

答案：B

2.患者,男,64岁,为缓解剧烈癌痛,同时使用5片芬太尼透皮贴剂后,出现呼吸抑制,可选用的解救药物是()

A：亚甲蓝

B：氟马西尼

C：纳洛酮

D：二巯丙醇

答案：C

3.引起"肾病患者清除减慢，服用呋喃妥因血药浓度升高，可引起周围神经炎"是

A：遗传因素

B：年龄

C：性别

D：基础疾病

答案：D

4.属于中效的胰岛素制剂是

A：低精蛋白锌胰岛素

B：赖脯胰岛素

C：精蛋白锌胰岛素

D：甘精胰岛素

答案：A

5.下列是5位患者血常规检查的结果，其中白细胞计数异常的是

A：成人静脉血13.0×109/L

B：成人静脉血4.3×109/L

C：成人末梢血8.0×109/L

D：6个月～2岁婴儿11.0×109/L

答案：A

6.（2019年真题）对乙酰氨基酚的妊娠毒性分级是

A：A级

B：B级

C：C级

D：X级

答案：B

7.视疲劳所呈现的显著临床特征是

A：泪液减少

B：视物时症状加重

C：复视

D：眼睑沉重、痉挛

答案：B

8.抗高血压药物中，非二氢吡啶类钙通道阻滞剂的主要不良反应为()。

A: 血钾减低、血钠减低、血尿酸升高

B: 房屋传导阻滞，心功能抑制

C: 直立性低血压

D: 血钾增高

答案：B

9.患者,男,64岁,因右足肿痛就诊。查体:右脚第一趾关节红肿,触痛明显。化验结果:血尿酸581m0/L.诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病,目前正服用氢氯噻嗪片25mgqd、美托洛尔缓释47.5mgqd、赖诺普利片20mgqd、辛伐他汀片10rqn、阿司匹林肠溶片10m9gqd。

A: 别嘌醇片

B: 双氯芬酸钠片

C: 阿司匹林片（300mg）

D: 贝诺酯片

答案：B

10.通过阻断 β 受体，同时具有血管扩张作用的非苷类药物是

A: 地高辛

B: 卡维地洛

C: 米力农

D: 洋地黄毒苷

答案：B

11.赵某，男性，60岁，既往高血压病史8年。与邻居吵架后突然起病，言语不清、左侧肢体无力、意识不清。查体：BP210／120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激阳性，左侧肢体无法活动，左侧巴宾斯基征阳性。

A: 脑血栓形成

B: 短暂性脑缺血发作

C: 脑出血

D: 缺血性脑卒中

答案：C

12.由于心外副作用发生率较高，且不良反应较大，不宜作为治疗心房颤动一线用药的是()

A: 地高辛

B: 福辛普利

C: 胺碘酮

D: 美托洛尔

答案：C

13.可待因属于

A: β受体阻断剂

B: 利尿剂

C: 精神刺激剂

D: 麻醉药品

答案：D

14.在药学信息咨询服务中，应用二级信息资料的最突出优势是

A: 有的还能提供疾病与药物治疗的基本知识

B: 读者能自己评价信息，免受他人观点影响

C: 对一个具体问题所提供的信息简明扼要

D: 可以很方便地对所需要的一级文献信息进行筛选

答案：D

15.容易引起脱发的是（）

A: 阿霉素

B: 吉非替尼

C: 博来霉素

D: 氟尿嘧啶

答案：A

16.患者，男性，58岁，患有膀胱肿瘤，经常出现不能控制的尿频、尿急、夜尿增多。确诊为急迫性尿失禁，给予托特罗定治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

A: 鼻咽炎和尿路感染

B: 口干、便秘、尿潴留

C: 直立性低血压

D: 卧位和坐位时高血压

答案：B

17.以下抗抑郁药物的合理使用中，叙述不正确的是（）

A: 显效慢即换药

B: 尽可能单一用药

C: 个体化用药

D: 从小剂量开始

答案：A

18.服药时进食高脂肪食物可促进药物吸收的是

A：格列本脲

B：硫酸亚铁

C：西咪替丁

D：维生素A

答案：D

19.（2019年真题）患者，女，25岁，两天前淋雨后开始发热体温39.0℃，咳嗽，咳铁锈色黏痰，化验结果提示白细胞计数及中性粒细胞比例升高，诊断为肺炎，经验性抗感染治疗时适宜选用的药物

A：头孢他啶

B：头孢唑林

C：阿米卡星

D：阿奇霉素

答案：B

20.磺胺类药用于抗感染不宜食用的是

A：食盐

B：蛋白质

C：食醋

D：脂肪

答案：C

21.临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

A：维生素B

B：阿托品

C：维生素K

D：乙酰胺

答案：C

22.适用于L-dopa治疗伴发疗效减退、症状波动的患者

A：左旋多巴

B：恩托卡朋

C：苯海索

D：司来吉兰

答案：B

23.对缺铁性贫血者应选用

A：叶酸+维生素B

B：甲磺酸去铁胺

C：富马酸亚铁

D：维生素K

答案：C

24.有机氟中毒的特效解毒剂是

A：烯丙吗啡

B：乙酰胺

C：氯磷定

D：维生素K1

答案：B

25.皮下脂肪薄，局部循环差，致使皮下和肌内注射给药的吸收不规则，即

A：药物代谢

B：药物分布

C：药物吸收

D: 药物排泄

答案：C

26.左旋多巴治疗震颤麻痹时宜减少食用的是

A: 食盐

B: 食醋

C: 脂肪

D: 蛋白质

答案：D

27.降钙素

A: 激素替代剂

B: 骨吸收抑制剂

C: 骨形成刺激剂

D: 促进骨矿化剂

答案：B

28.患者，女，55岁，因"反复发作胸骨后疼痛2年，伴反酸，胃灼热，间断积食"而就诊。食管测压提示食管下括约肌(LES)压力<6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片20mgbid强化抑酸治疗。

A: 避免高脂饮食

B: 餐中多饮水

C: 戒烟酒

D: 控制体重

答案：B

29.解救急性乙醇中毒的是（）

A: 双复磷

B: 纳洛酮

C: 二巯丁二钠

D: 亚硝酸钠

答案：B

30.下列药物中属于溶栓药物的是（）

A: 利伐沙班

B: 华法林

C: 阿替普酶

D: 血凝酶

答案：C

31.消化性溃疡发病机制中的防御因子为（）

A: 吸烟

B: H.pylori 感染

C: 酒精

D: 前列腺素

答案：D

32.（2019年真题）湿疹患者的实验室检查结果常会出现

A: 淋巴细胞减少

B: 中性粒细胞减少

C: 淋巴细胞增多

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：D

33.抗癫痫药应从小剂量起始给药，滴定增量，长期规律用药。成年癫痫患者药物治疗时

A：卡马西平

B：拉莫三嗪

C：丙戊酸钠

D：苯妥英钠

答案：C

34.适用于重症或伴有喉头水肿的荨麻疹患者的治疗药物是

A：第一代抗组胺药

B：第二代非镇静抗组胺药

C：1：1000肾上腺素注射液

D：肾上腺糖皮质激素

答案：D

35.妇女在月经期间不宜服用的药品是

A：氨酚待因

B：氢氯噻嗪

C：颠茄浸膏

D：山莨菪碱

答案：B

36.给予(透析患者)维生素B、维生素C的依据是

A：腹膜透析容易丢失水溶性维生素

B：透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛

C：肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素D

D：有助于机体合成红细胞

答案：A

37.用于前列腺增生症的高选择性 α1A 受体阻断剂是（）

A: 索利那新

B: 坦索罗辛

C: 特拉唑嗪

D: 托特罗定

答案：B

38.下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是

A: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判定疗效

B: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗

C: 剂量递增，尽可能采用最小有效剂量，使不良反应减至最小

D: 当单药治疗无效时，可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药

答案：A

39.某患者，男，78 岁既往有动脉粥样硬化史，因尿频，尿急就诊，体征和实验室检查结果为：血压 166/98mmHg，前列腺增生>60g，前列腺特异性抗原（PAS）正常，在控制患者血压的同时，应联合选用（）

A: 非那雄胺

B: 泼尼松龙

C: 丙酸睾酮

D: 吲达帕胺

答案：A

40.为配制有效氯浓度为 500mg/L 的消毒剂 10L,需要次氯酸钠溶液（有效氯浓度为 6．0%）和纯化水的量分别是（）

A: 150mL 和 9850mL

B: 830mL 和 9170mL

C: 83mL和9917mL

D: 120mL和9880mL

答案：C

41.患者，女，50岁，50kg，157cm，患复发转移性乳腺癌，术后使用曲妥珠单抗进行靶向治疗。药师应告知的用药注意事项和患者教育，错误的是

A: 用药前应进行RAS基因筛查

B: 用药期间应每3个月监测心脏功能

C: 从第2周起，每次给药100mg，静脉滴注30min

D: 每周给药1次，第1周给药剂量200mg，静脉滴注90min

答案：A

42.为氧化剂，不能用于乐果中毒的洗胃液是

A: 淀粉溶液

B: 活性炭混悬液

C: 1：5000高锰酸钾

D: 3%鞣酸溶液

答案：C

43.患者，女，55岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的NSAID类药物是

A: 塞来昔布

B: 布洛芬

C: 双氯芬酸

D: 吲哚美辛

答案：A

44.（2017年真题）高血压伴高钾血症患者慎用的药物是（）

A：氢氯噻嗪

B：氨氯地平

C：依那普利

D：美托洛尔

答案：C

45.服用异烟肼抗结核治疗时，应注意的事项是

A：服药期间不宜饮茶

B：用药期间宜吃高蛋白食物

C：服药期间不宜饮酒

D：用药期间不宜食用富含组胺类的食物

答案：D

46.单核细胞正常参考区间是

A：0～0.01

B：0.01～0.05

C：0.03～0.08

D：0.20～0.40

答案：C

47.可用于氰化物中毒的药物是

A：乙酰胺

B：亚硝酸钠

C：维生素K1

D：碘解磷定

答案：B

48.滴虫性阴道炎宜选用

A：林可霉素

B：甲硝唑

C：制霉菌素

D：庆大霉素

答案：B

49.(联合用药)感染性腹泻患者应用小檗碱+鞣酸蛋白属于

A：超适应证用药

B：超剂量用药

C：过度治疗用药

D：非适应证用药

答案：C

50.下列白细胞计数检查结果中，属于不正常的是

A：成人4.3X109/L

B：成人3.0X109/L

C：成人8.0X109/L

D：新生儿16.0X109/L

答案：B

51.以下用于治疗寻常痤疮的药物中，属于非处方药的是

A：阿达帕林

B：过氧苯甲酰

C：异维A酸

D：维胺酯

答案：B

52.医师咨询"加替沙星用于糖尿病患者抗感染"，属于

A：给药途径

B：禁忌证

C：新药信息

D：药物相互作用

答案：B

53.静注的缩写为

A：q4h

B：pc

C：iv

D：qid

答案：C

54.杨某，女，19岁，咳嗽，有脓性痰，并伴有胸痛；发热39℃；肺闻及湿性啰音；WBC>13×10

A：红霉素

B：左氧氟沙星

C：利福霉素

D：链霉素

答案：B

55.用于颠茄类生物碱中毒的解救药物是

A：毛果芸香碱

B：亚甲蓝

C：碘解磷定

D：阿托品

答案：A

56.患者男,73岁,胃溃疡病史2年,半年前出现静止性震颤搓丸样运动迟缓,面具脸,慌张步态该患者应使用的药物是（）

A: 司来吉兰

B: 甲基多巴

C: 多巴丝肼（苄丝肼左旋多巴）

D: 多奈哌齐

答案：C

57.药师应及时向患者交待有关用药的注意事项，以避免误用药物，减轻患者不必要的恐慌，提高用药依从性。根据患者用药情况，发药时药师应有针对性的提示患者各类药物的应用注意事项。

A: 患者三?

B: 患者二?

C: 患者一?

D: 患者四?

答案：B

58.清洁手术的预防用药时间不超过

A: 6小时

B: 24小时

C: 48小时

D: 12小时

答案：B

59.患者，女，29岁，孕25+6周，近日出现乏力、困倦、食欲不振、恶心等症状。化验结果为Hb71g/L。诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是

A: 快速静脉注射

B: 先少量缓慢静注，观察无过敏反应，1小时后继续静脉注射余下剂量

C: 口服，每次5ml，一日3次

D: 先静脉注射负荷剂量，再静脉滴注余下剂量

答案：B

60.贫血患者常出现

A: 嗜酸性粒细胞增多

B: 血红蛋白减少

C: 血小板计数增高

D: 中性粒细胞增多

答案：B

61.理论效价的表示中，以其特定的“盐”1μg作为1IU抗生素是

A: 盐酸四环素

B: 土霉素

C: 链霉素

D: 红霉素

答案：A

62.美托洛尔和肾上腺素的相互作用属于()。

A: 排泄

B: 与血浆蛋白结合

C: 作用于同一受体的拮抗作用

D: 酶诱导作用

答案：C

63.医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握，必要时需向患者进行解释OS．是指

A：左眼

B：右眼

C：适量

D：立即

答案：A

64.应用华法林抗凝治疗时，患者应该控制的国际标准化比值为

A：<2.0

B：>3.0

C：2.0～3.0

D：2.0～2.5

答案：C

65.阿莫西林等水溶性药物血浆中游离药物浓度较成人低，其机制是

A：肝脏的相对重量约为成人的2倍

B：胃排空快

C：体液及细胞外液容量大

D：胃酸分泌少

答案：C

66.对目标适应证患者的治疗作用的初步评价是指

A：Ⅲ期临床试验

B：Ⅰ期临床试验

C：Ⅱ期临床试验

D：临床预试验

答案：C

67.较易导致肾损伤的药品是

A: 氯化钾

B: 阿米卡星

C: 酮康唑

D: 新霉素

答案：D

68.高血压治疗药物选择噻嗪类利尿剂慎用于()

A: 胃溃疡患者

B: 心力衰竭患者

C: 痛风患者

D: 双侧肾动脉狭窄患者

答案：C

69.可沉淀大部分有机物及无机物的是

A: 鸡蛋白

B: 药用炭混悬液

C: 1%氯化钠溶液

D: 3%～5%鞣酸溶液

答案：D

70.具有沉淀作用，不宜在胃内滞留，可用浓茶代替的洗胃液是

A: 3%鞣酸溶液

B: 淀粉溶液

C: 1：5000高锰酸钾

D: 活性炭混悬液

答案：A

71.下列药物中，可呈现肝药酶抑制作用的是

A: 苯巴比妥

B: 异烟肼

C: 利福平

D: 地塞米松

答案：B

72.严重疼痛者可选用的镇痛药是

A: 氨酚待因片

B: 塞来昔布

C: 罗通定

D: 双氯芬酸钠缓释片

答案：A

73.用药错误定义为药物在临床使用全过程中出现的、任何可以防范的用药不当。临床用药的过程一般是指开写处方、转抄医嘱、药师调剂发药、护士或患者给药以及监测用药结果等。

A: 药品位置凌乱

B: 患者自行选购药品

C: 药品包装外观相似

D: 新手值班

答案：C

74.患者，女性，46岁。半年来食欲减退、易疲劳，查体发现多处淋巴结肿大，尤以颈部淋巴结为甚。骨髓抽取及切片、放射线检查（X线、淋巴摄影）后诊断为恶性淋巴瘤。

A: 干扰核酸生物合成

B：破坏DNA结构和功能

C：干扰蛋白质合成

D：嵌入DNA干扰核酸合成

答案：B

75.消化不良患者宜选用

A：小檗碱

B：乳果糖

C：干酵母

D：阿苯达唑

答案：C

76.（2017年真题）患者,77岁,因感冒发热咳嗽,自服酚麻美敏片、维C银翘片,三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是（）

A：氯苯那敏

B：维生素

C：对乙酰氨基酚

D：银翘

答案：A

77.血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的8%～9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下，血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

A：61～90g/L

B：>90g/L

C：＜30g/L

D: 31～60g/L

答案：C

78.患者，女，30岁。患先兆子痫，以硫酸镁治疗，适宜的给药途径是

A: 吸入给药

B: 口服给药

C: 静脉注射

D: 直肠给药

答案：C

79.患者,女,59岁,绝经后3年,近日出现腰背疼痛,负重时疼痛加剧骨密度T值为-3.5,诊断为骨质疏松每天补充维生素D800IU元素钙500mg同时给予唑来膦酸治疗。唑来膦酸正确的给药方案是()

A: 5mg静脉滴注,每周一次

B: 10mg口服每日一次

C: 4mg静脉滴注,每日一次

D: 5mg静脉滴注,每年一次

答案：D

80.白细胞分类中，淋巴细胞参考范围为

A: 50%～70%

B: 3%～8%

C: 1%～5%

D: 20%～40%

答案：D

81.（2017年真题）用于评价肝功能不全严重程度的是（）

A: APACHE评分系统

B：Cochrane证据分级

C：数字评分法

D：CTP评分标准

答案：D

82.（2017年真题）根据《中国成人超重和肥胖预防控制指南》体重指数（BMI）判断为肥胖的标准是（）

A：BMI＜21.5

B：BMI≤18.5

C：BMI≥28.0

D：BMI≥24.0

答案：C

83.（2021年真题）患者，男，58岁,有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊,开具药品如下:

A：阿托伐他汀钙用于冠心病的治疗，需长期规律用药

B：美托洛尔会影响阿司匹林的抗血小板活性，应停用

C：如大便次数规律（如每日1次），聚乙二醇4000散可按需使用

D：同时使用双氯芬酸钠与阿司匹林会增加消化道出血风险，两药不宜合用

答案：B

84.对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

A：雌二醇/雌二醇-地屈孕酮片

B：17β 一雌二醇

C：雌二醇一屈螺酮片

D: 戊酸雌二醇/雌二醇-醋酸环丙孕酮片

答案：D

85. Ⅰ期临床试验阶段，试验样本数为多少例

A: 20～30例

B: 1000～3000例

C: <10例

D: 200～300例

答案：A

86.（2017年真题）有较强刺激性服药时不可嚼碎的泻药是（）

A: 干酵母

B: 硫酸镁

C: 双歧杆菌

D: 比沙可啶

答案：D

87.不宜选用静脉滴注5%碳酸氢钠注射液碱化尿液的情况是

A: 异戊巴比妥中毒

B: 苯妥英钠中毒

C: 司可巴比妥中毒

D: 苯巴比妥中毒

答案：A

88.微粒型非诺贝特的用量是（）

A: 0.1g，tid

B: 0.2g，qd

C：0.6g，bid

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/537022133052010024