

福建省 2023-2024 年《执业药师之西药学专业二》考试真题题库及参考答案（巩固）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2020 年真题）患者，男，65 岁。高血压病史 8 年，血压峰值 180/110mmHg，冠心病史 5 年，双侧肾动脉狭窄，不宜选用的抗高血压药是

- A: 赖诺普利
- B: 吲达帕胺
- C: 氨氯地平
- D: 普萘洛尔

答案：A

2. （2018 年真题）不易发生“双硫仑样”反应的药物是（）

- A: 头孢哌酮
- B: 头孢曲松
- C: 头孢他啶
- D: 头孢替安

答案：C

3. 属于血小板膜蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是

- A: 奥扎格雷
- B: 替罗非班
- C: 氯吡格雷
- D: 阿司匹林

答案：B

4. 在骨组织中分布浓度高，可用于骨和关节的感染的是

- A: 克林霉素
- B: 红霉素
- C: 替硝唑
- D: 万古霉素

答案：A

5. 伏格列波糖的降糖作用机制是

- A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- B: 竞争性抑制 α 葡萄糖苷酶
- C: 直接补充胰岛素
- D: 提高靶组织对胰岛素的敏感性

答案：B

6. 被称为餐时血糖调节剂，无需餐前 0.5h 服用的是

- A: 利拉鲁肽
- B: 艾塞那肽
- C: 格列齐特
- D: 瑞格列奈

答案：D

7. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是()。

- A: 二甲双胍
- B: 艾塞那肽
- C: 阿卡波糖
- D: 那格列奈

答案：C

8. 血浆蛋白结合率低，易透过血-脑屏障用于治疗流行性脑脊髓膜炎的药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 甲氧苄啶
- C: 磺胺多辛
- D: 复方新诺明

答案：A

9. 治疗难辨梭状芽孢杆菌引起的假膜性肠炎，宜选择的药物是

- A: 米诺环素
- B: 利奈唑胺
- C: 万古霉素
- D: 阿奇霉素

答案：C

10. 下述药物中，不属于促动力药的是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 氢氧化铝
- C: 多潘立酮
- D: 莫沙必利

答案：B

11. 硝酸酯类药发挥抗心绞痛作用时，体内参与的物质不包括

- A: 钙离子
- B: cGMP 依赖性蛋白激酶
- C: β 受体
- D: 谷胱甘肽转移酶

答案：C

12. (2018 年真题) 可用于治疗厌氧菌及产 ESBL 的革兰阴性杆菌感染的药物是 ()

- A: 头孢米诺
- B: 头孢呋辛
- C: 头孢唑林
- D: 头孢他啶

答案：A

13. 属于抗雄激素类的抗肿瘤药是

- A: 他莫昔芬
- B: 阿那曲唑
- C: 氟他胺
- D: 炔雌醇

答案：C

14. 口服存在首关效应的药物是

- A: 氨溴索
- B: 溴己新
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 羧甲司坦

答案：C

15. 监测他汀类药所致肌毒性的临床指标是 ()。

- A: 肌酸激酶
- B: 尿淀粉酶
- C: 乳酸脱氢酶

D: 碱性磷酸酶

答案：A

16. (2021 年真题) 兼有抑菌作用的鼻用减充血剂是 ()

A: 呋麻滴鼻液

B: 羟甲唑啉鼻喷剂

C: 赛洛唑啉滴鼻液

D: 麻黄碱滴鼻液

答案：A

17. ACEI 与其联用，除可增强降压效果外，还可减少后者引起的高肾素血症以及对血尿酸和血糖的不良影响的是 ()

A: 噻嗪类利尿药

B: 留钾利尿药

C: β 受体阻断药

D: 人促红素

答案：A

18. 阿糖胞苷的作用机制是 ()

A: 胸腺核苷合成酶抑制剂

B: 核苷酸还原酶抑制剂

C: DNA 多聚酶抑制剂

D: 二氢叶酸还原酶抑制剂

答案：C

19. 头孢曲松

A: 用于非典型病原体感染

B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

D: 肾毒性较大

答案: B

20. 单纯疱疹性角膜炎应选用

A: 夫西地酸

B: 头孢他啶

C: 阿昔洛韦

D: 利福平

答案: C

21. 苯妥英钠的血药浓度超过多少可出现眼球震颤症状

A: $20 \mu\text{g} / \text{ml}$

B: $15 \mu\text{g} / \text{ml}$

C: $10 \mu\text{g} / \text{ml}$

D: $25 \mu\text{g} / \text{ml}$

答案: A

22. (2015 年真题) 服用时必须保持坐位或立位、空腹、服后 30 分钟内不宜进食和卧床的药品是 ()。

A: 依普黄酮

B: 阿仑膦酸钠

C: 雷洛昔芬

D: 依降钙素

答案: B

23. 通过激动胰高血糖素样肽-1 受体降低血糖的药物

A: 胰岛素皮下注射

B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

C: 艾塞那肽

D: 二甲双胍

答案：C

24. (2020 年真题) 关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

A: 可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮

B: 小剂量可促进头发生长，用于治疗源性脱发

C: 能降低血清前列腺特异性抗原 (PSA) 水平

D: 易引起直立性低血压

答案：D

25. 排痰功能不良引起的痰液黏稠而不易咳出者可选用

A: 沙丁胺醇

B: 喷托维林

C: 氨溴索

D: 噻托溴铵

答案：C

26. (2017 年真题) 口角炎可以使用的治疗药物是 ()

A: 维生素 D

B: 维生素 A

C: 维生素 B₂

D: 维生素 B₁

答案：C

27. 长期大量使用林旦后可导致的不良反应是

A: 白细胞减少

B: 中枢神经系统毒性

C: 眼部水肿

D: 肝脏损害

答案：B

28. 属于 β_2 受体激动剂的平喘药是()

A: 噻托溴铵

B: 孟鲁司特

C: 茶碱

D: 沙美特罗

答案：D

29. 治疗细菌性结膜炎宜选用

A: 左氧氟沙星滴眼液

B: 碘苷滴眼液

C: 复方托吡卡胺滴眼液

D: 毛果芸香碱滴眼液

答案：A

30. 用于治疗单纯性甲状腺肿的是

A: 甲状腺素

B: 丙硫氧嘧啶

C: 糖皮质激素

D: 放射性碘

答案：A

31. 下列药物不属于大环内酯类的是

A: 泰利霉素

- B: 大观霉素
- C: 阿奇霉素
- D: 罗红霉素

答案：B

32. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食、增加运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片 20mg/d 治疗。服药期间应监测血生化指标，其中超过正常值上限 10 倍，应立即停药的指标是()。

- A: CK
- B: Cr
- C: BUN
- D: Hcy

答案：A

33. 用于治疗低磷血症的药物是()

- A: 二磷酸果糖
- B: 三磷酸腺苷
- C: 葡萄糖
- D: 碳酸钙

答案：A

34. 去乙酰毛花苷在体内失去葡萄糖基和乙酸转化为

- A: 毛花苷丙(西地兰 C)
- B: 洋地黄毒苷
- C: 地高辛
- D: 去乙酰毛花苷(西地兰 D)

答案：C

35. 可与 PPI、铋剂联合使用治疗幽门螺杆菌感染的药物是()

- A: 美罗培南
- B: 克拉霉素
- C: 替考拉宁
- D: 大观霉素

答案: B

36. 壬二酸的抗菌活性和吸收依赖于

- A: 作用面积
- B: pH
- C: 剂型
- D: 浓度

答案: B

37. 属于短效胰岛素制剂的是

- A: 甘精胰岛素
- B: 地特胰岛素
- C: 普通胰岛素
- D: 精蛋白锌胰岛素

答案: C

38. 下列有关口服伪麻黄碱的描述，错误的是

- A: 不宜与中枢神经系统抑制药、抗精神病药合用
- B: 属处方类鼻黏膜肿胀治疗药物
- C: 用药期间不宜饮酒
- D: 兴奋肾上腺能 α 受体，使鼻腔黏膜血管收缩

答案: B

39. 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是

- A: 氟尿嘧啶
- B: 多柔比星
- C: 伊立替康
- D: 多西他赛

答案：B

40. 长期大量应用双嘧达莫治疗缺血性心脏病时,可能导致患者缺血加重,甚至病情恶化可能的原因是 ()

- A: 冠状动脉窃血
- B: 抗血小板药物继发失效
- C: 治疗反应变异
- D: 双嘧达莫抵抗

答案：A

41. 可用于防治泌尿系统结石的是

- A: 氯化钾
- B: 枸橼酸钾
- C: 氯化钙
- D: 氯化钠

答案：B

42. 眼底散瞳检查宜选用

- A: 托吡卡胺滴眼剂
- B: 拉坦前列素滴眼剂
- C: 碘苷滴眼剂
- D: 氯霉素滴眼剂

答案：A

43. 可导致视神经炎的抗结核药是

A: 乙胺丁醇

B: 吡嗪酰胺

C: 利福平

D: 利福喷丁

答案：A

44. 叶酸主要用于治疗

A: 缺铁性贫血

B: 妊娠期巨幼红细胞性贫血

C: 再生障碍性贫血

D: 溶血性贫血

答案：B

45. 属于促血小板生成药的是

A: 甲萘氢醌

B: 氨甲环酸

C: 酚磺乙胺

D: 艾曲泊帕乙醇胺

答案：D

46. 下列哪个选项不属于十一酸睾酮的适应症

A: 前列腺增生引起的排尿障碍

B: 乳腺癌转移的姑息性治疗

C: 原发性或继发性睾丸功能减退

D: 女性儿童体质性青春期延迟

答案：A

47. 吸入用布地奈德混悬液抗炎作用是强的松龙的

- A: 15 倍
- B: 40 倍
- C: 100 倍
- D: 25 倍

答案：A

48. (2015 年真题) 利尿作用极弱，具有降低眼内压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是 ()。

- A: 氢氯噻嗪
- B: 乙酰唑胺
- C: 呋塞米
- D: 螺内酯

答案：B

49. 属于 5α 受体还原酶抑制剂的抗良性前列腺增生症的药品是 ()。

- A: 酚妥拉明
- B: 特拉唑嗪
- C: 普适泰
- D: 度他雄胺

答案：D

50. (2016 年真题) 服用叶酸治疗巨幼红细胞贫血，需同时联合使用的药品是

- A: 依诺肝素
- B: 维生素 B1

C: 维生素 B2

D: 维生素 B12

答案：D

51. 羟孕酮与戊酸雌二醇配伍作长效注射避孕药，每月需肌内注射次数

A: 3 次

B: 2 次

C: 4 次

D: 1 次

答案：D

52. 抗肿瘤药一般缺乏特异性，在杀伤肿瘤细胞同时，对正常组织细胞不可避免的会产生损害或毒副作用，75%以上化疗患者会出现不同程度的恶心、呕吐。

A: 每天化疗前，联合应用 5-HT₃ 受体阻断剂和口服地塞米松 12mg

B: 每天化疗前，口服地塞米松 12mg

C: 每天化疗前，联合应用 5-HT₃ 受体阻断剂或口服地塞米松 12mg

D: 每天化疗前，应用 5-HT₃ 受体阻断剂

答案：A

53. (2021 年真题) 适用于膀胱过度兴奋引起的尿频、尿急或紧迫性尿失禁症状治疗的药物是 ()。

A: 托拉塞米

B: 度他雄胺

C: 托特罗定

D: 坦洛新

答案：C

54. 糖皮质激素隔日疗法用于()

- A: 湿疹
- B: 肾病综合征
- C: 抑制器官移植急性排斥危象
- D: 变态反应性疾病

答案: B

55. 疗效优于乙琥胺，但因有肝毒性，仅在癫痫小发作合并大发作时应用的药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 丙戊酸钠
- C: 卡马西平
- D: 苯妥英钠

答案: B

56. 过量使用，会导致大量的中间代谢产物 N-乙酰对苯醌亚胺堆积，引起严重肝毒性的药物是()

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 双氯芬酸
- C: 塞来昔布
- D: 阿司匹林

答案: A

57. 主要用于口服给药的广谱青霉素类是

- A: 头孢哌酮
- B: 庆大霉素
- C: 阿莫西林
- D: 头孢噻肟

答案：C

58. 巴比妥类急性中毒时，导致死亡的主要原因是

- A: 肝损害
- B: 肾损害
- C: 呼吸循环衰竭
- D: 心搏骤停

答案：C

59. 关于右美沙芬药理作用及临床评价的说法,正确的是

- A: 镇咳作用弱于可待因
- B: 口服吸收缓慢,主要经肝脏代谢作用时间长
- C: 主要用于干咳但左旋右美沙芬有镇痛作用
- D: 通过阻断肺—胸膜的牵张感受器产生的迷走神经反射而引起镇咳作用

答案：C

60. 兼具抑菌作用、抑制痛觉神经和刺激腺体分泌的鼻用制剂是

- A: 鲑鱼降钙素鼻喷剂
- B: 异丙托溴铵吸入剂润德教育
- C: 氟替卡松鼻喷剂
- D: 复方薄荷脑滴鼻液

答案：D

61. 可促进白细胞增生的药物是

- A: 红细胞生成素
- B: 叶酸
- C: 粒细胞集落刺激因子

D: 维生素 B

答案：C

62. (2020 年真题) 可用于治疗乙型肝炎病毒感染的药物是

A: 恩替卡韦

B: 阿昔洛韦

C: 更昔洛韦

D: 金刚烷胺

答案：A

63. 多数 ACEI 的起效时间在 1 小时，作用时间可以维持

A: 24 小时

B: 12 小时

C: 6 小时

D: 36 小时

答案：A

64. 下列关于胺碘酮的叙述错误的是

A: 可以用于窦房传导阻滞

B: 促心率失常反应少

C: 对室上性和室性心律失常均有效

D: 适用于合并器质性心脏病的心率失常

答案：A

65. 作用于细菌二氢叶酸还原酶而发挥作用的抗菌药物是

A: 甲氧苄啶

B: 呋喃妥因

C: 磺胺甲唑

D: 利奈唑胺

答案：A

66. 分解痰液中的黏液成分如黏多糖和黏蛋白，使黏痰液化，痰液黏度降低而易于咳出的祛痰药是

A: 表面活性剂

B: 碘化钾

C: 氨溴索

D: 氯化铵

答案：C

67. 易发生持续干咳不良反应的药品是

A: 氢氯噻嗪

B: 福辛普利

C: 硝酸甘油

D: 硝苯地平

答案：B

68. 患者，男，25 岁。咽炎，注射青霉素后 1 分钟呼吸急促、面部发绀，心率 130 次/分，血压 60/40mmHg。

A: 青霉素加速抗原抗体结合

B: 青霉素的降解产物诱导机体发生变态反应

C: 青霉素本身诱导机体发生变态反应

D: 青霉素促进机体释放组胺、白三烯等致敏原

答案：B

69. 可使维生素 B

A: 糖皮质激素

B: 异烟肼

C: 雌激素

D: 丙磺舒

答案: C

70. 新斯的明治疗重症肌无力的机制是

A: 兴奋骨骼肌中 M 胆碱受体

B: 对大脑皮质有兴奋作用

C: 增强运动神经乙酰胆碱合成

D: 抑制胆碱酯酶和兴奋骨骼肌 N 胆碱受体

答案: D

71. (2021 年真题) 属于乙酰胆碱酯酶抑制剂，用于改善脑功能及抗记忆障碍的药物 ()

A: 尼莫地平

B: 多奈哌齐

C: 依达拉奉

D: 吡拉西坦

答案: B

72. 同时抑制 5-HT 及去甲肾上腺素 (NE) 再摄取而起到抗抑郁作用的药物是 ()

A: 马普替林

B: 度洛西汀

C: 吗氯贝胺

D: 帕罗西汀

答案: B

73. (2020 年真题) 属于一线抗结核分枝杆菌的药物是

- A: 异烟肼、利福平、莫西沙星
- B: 异烟肼、阿米卡星、对氨基水杨酸
- C: 异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇
- D: 莫西沙星、卡那霉素、卷曲霉素

答案: C

74. 与氢氯噻嗪不存在交叉过敏反应的是

- A: 磺胺类药
- B: 依他尼酸
- C: 呋塞米
- D: 布美他尼

答案: B

75. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年，体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。

- A: 血钾
- B: 血钙
- C: 血氯
- D: 血钠

答案: A

76. 由我国学者发现并用于抗疟的是

- A: 链霉素
- B: 甲硝唑
- C: 二氯沙奈
- D: 青蒿素

答案: D

77. 诱导肝微粒体酶，加速皮质激素和雌激素代谢的是()

- A: 链霉素
- B: 乙胺丁醇
- C: 异烟肼
- D: 利福平

答案: D

78. 长期大量与阿司匹林或其他 NSAID 合用时，可明显增加肾毒性的是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 吲哚美辛
- C: 塞来昔布
- D: 阿司匹林

答案: A

79. 属于解毒类保肝药的是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 还原型谷胱甘肽
- C: 双环醇
- D: 异甘草酸镁

答案: B

80. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 贝那普利
- B: 罗格列酮

C: 阿卡波糖

D: 二甲双胍

答案: B

81. 患者，男，15 岁，因咳嗽、咳痰，发热 3 天入院，确诊为社区获得性肺炎，给予静滴青霉素钠 10 分钟后出现头昏，面色苍白，呼吸困难，血压下降等症状，对该患者首选的抢救药物是（）

A: 多巴胺

B: 肾上腺素

C: 去甲肾上腺素

D: 地塞米松

答案: B

82. （2016 年真题）属于延长动作电位时程的抗心律失常药是

A: 硝酸甘油

B: 索他洛尔

C: 利多卡因

D: 美托洛尔

答案: B

83. 有关甲氨蝶呤药物相互作用的说法，错误的是（）

A: 丙磺舒会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

B: 阿司匹林会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

C: 与顺铂等肾毒性药物合用，可能减慢甲氨蝶呤的肾排泄

D: 碳酸氢钠会减慢甲氨蝶呤的肾排泄

答案: D

84. 适用于干咳、咳嗽伴黏稠痰的患者,但不宜长期使用,用药 7 日症状未缓解应停药的恶心性祛痰药物是

- A: 氨溴索
- B: 溴己新
- C: 氯化铵
- D: 乙酰半胱氨酸

答案: C

85. 属于第三代头孢菌素的药物是()。

- A: 头孢氨苄
- B: 头孢哌酮
- C: 头孢拉定
- D: 头孢吡肟

答案: B

86. 可引起致死性肺毒性和肝毒性的抗心律失常药物是

- A: 胺碘酮
- B: 维拉帕米
- C: 普萘洛尔
- D: 奎尼丁

答案: A

87. (2016 年真题) 脂溶性较高,起效快,属于巴比妥类的镇静催眠药是

- A: 异戊巴比妥
- B: 地西洋
- C: 佐匹克隆

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 阿普唑仑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/537035055000010026>