

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

口腔修复学考试试题库及答案

1、经过成功的根管治疗后无临床症状，一般需要多长时间才可以开始桩冠修复

- A、1~2 周
- B、1~2 个月
- C、2 个月
- D、以上都是
- E、以上都不是

答案：A

2、可摘局部义齿的固位体不应对基牙产生

- A、解剖式瓷牙
- B、固位力
- C、侧向压力
- D、约束力
- E、牙合向力

答案：C

3、合力完全由一侧基牙承担是哪种固定桥

- A、双端固定桥
- B、单端固定桥
- C、C 半固定桥
- D、D 粘接固定桥
- E、E 卫生桥

答案：B

4、戴用全口义齿两年，一直未吃硬性食物，小心谨慎使用，但上总义齿仍裂开，查：上总义齿前份正中折裂，固位好，腭侧基托厚 2mm，腭中缝较平。

造成义齿折裂的主要原因是

- A、腭侧基托较薄
- B、腭中缝成为义齿折裂支点
- C、人工牙排列在嵴顶外
- D、基托前部分厚薄不均
- E、基托材料老化，变脆

答案：C

5、全冠龈边缘最基本的要求是

- A、应位于龈上
- B、应平龈

- C、应位于龈沟内
- D、边缘要密合
- E、设计成直角肩台

答案：D

6、牙体缺损桩冠修复时，冠桩的理想长度约为根长的

- A、 $1/3 \sim 1/2$
- B、 $1/3 \sim 3/4$
- C、 $1/2 \sim 2/3$
- D、 $2/3 \sim 3/4$
- E、 $3/4$ 以上

答案：D

7、后牙颊舌侧卡环臂的固位力应相等，主要是为

- A、加强固位作用
- B、加强环抱作用
- C、防止义齿翘动
- D、防止义齿摆动
- E、防止义齿损伤

答案：D

8、有利于全口义齿稳定的人工牙排列规律不包括

- A、形成合适的补偿曲线
- B、形成合适的横合曲线
- C、正中咬合时合面应均匀广泛地接触
- D、前伸、侧合运动时应达到平衡
- E、有时因需要也可在前伸、侧合运动时不达到平衡

答案：E

9、牙列缺损 Kennedy 分类第一类

- A、单侧游离端缺失
- B、双侧游离端缺失
- C、单侧非游离端缺失
- D、双侧非游离端缺失
- E、前牙缺失

答案：B

10、具有保髓作用的水门汀是

- A、磷酸锌水门汀及氧化锌水门汀
- B、氧化锌丁香酚水门汀及氢氧化钙水门汀

- C、玻璃离子水门汀及磷酸锌水门汀
- D、聚羧酸锌水门汀及磷酸锌水门汀
- E、玻璃离子水门汀及氢氧化钙水门汀

答案：B

11、全冠粘固后很快出现过敏性疼痛，其主要原因，除了

- A、牙体预备时热刺激
- B、粘固剂刺激
- C、腐质未去净
- D、消毒剂刺激
- E、取印模时刺激

答案：C

12、稳定可重复的颌位是

- A、正中关系
- B、正中合位
- C、息止颌位
- D、非正中关系
- E、以上都不对

答案：A

13、防止可摘局部义齿水平移动的方法中，错误的是

- A、排塑料牙
- B、减小牙尖斜度
- C、增加间接固位体
- D、加强卡环体的环抱作用
- E、用连接体连接左右侧鞍基

答案：A

14、可摘局部义齿的固位力不包括

- A、弹性卡抱力
- B、B：制锁力
- C、相互制约状态产生的摩擦力
- D、粘结力
- E、吸附力与大气压力

答案：D

15、口腔修复应用材料的良好性能中错误的描述是

- A、溶解性能
- B、机械性能

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/537116043132006115>