
儿科护理(医学高级)-内分泌系统疾病

1、先天性甲状腺功能减低症以下最早出现的症状是（）

- A. 便秘
- B. 贫血、面色苍黄
- C. 生理性黄疸时间延长
- D. 呼吸、心率减慢
- E. 纳差、吃奶缓慢

2、先天性甲状腺功能减低症用甲状腺激素适量治疗后，向家长交代最重要的一条是（）

- A. 注意膳食营养
- B. 注意监测身高
- C. 症状改善后不能自动停药
- D. 经常补充维生素
- E. 加强智能训练

3、先天性甲状腺功能减低症，在新生儿筛查时测定的是（）

- A. 血清碘
- B. T3、T4
- C. TSH
- D. 游离 T3、游离 T4

E. 游离 T3、游离 T4、TSH

4、先天性甲状腺功能减低患儿，常最早引起注意的症状是（）

- A. 黏液性水肿
- B. 皮肤粗糙
- C. 生理性黄疸时间延长
- D. 生长发育迟缓
- E. 特殊面容

5、先天性甲状腺功能减低症用甲状腺制剂过程中，剂量过大的表现为（）

- A. 嗜睡，少动
- B. 食欲减退
- C. 脉搏、呼吸减慢
- D. 腹胀，便秘
- E. 烦躁，多汗，消瘦，腹泻

6、先天性甲状腺功能减低症应用甲状腺片治疗后，患儿代谢增强，生理功能改进，生长发育加速，应注意下列哪项（）

- A. 休息
- B. 预防感染
- C. 补充水分

D. 适当补充各种营养

E. 供给大量碘

7、特发性生长激素缺乏症的临床特点，哪项不正确（）

A. 智能低下

B. 身材矮小，匀称

C. 生长速度低下

D. 无黏液性水肿等

E. 骨龄落后

8、先天性甲状腺功能减低症用甲状腺片治疗，何时开始治疗不至于遗留神经系统损害（）

A. 3~4 个月

B. 6~7 个月

C. 1~2 个月

D. 4~5 个月

E. 8~9 个月

9、原发性生长激素缺乏症的主要病因是（）

A. 遗传

B. 生长激素释放激素分泌不足

C. 特发性垂体功能不足

- D. 生长激素释放抑制因子不足
- E. 以上均不是

10、以下不符合原发性生长激素缺乏症的是（）

- A. 身材矮小
- B. 骨化中心发育正常
- C. 智力正常
- D. 身体各部分比例匀称
- E. 青春发育期延迟

11、下列哪项不是儿童糖尿病的临床特点（）

- A. 起病较急骤
- B. 多饮、多尿、多食和体重下降
- C. 消瘦、精神不振、倦怠乏力
- D. 容易出现糖尿病性周围神经炎
- E. 急性感染时易发生酮症酸中毒

12、最常见的儿童糖尿病类型是（）

- A. 非糖尿病性葡萄糖尿症
- B. 继发性糖尿病
- C. 胰岛素依赖型糖尿病
- D. 非胰岛素依赖型糖尿病

E. 婴儿暂时性糖尿病

13、生长激素缺乏症 thGH 替代疗法的疗程是（）

A. 6 个月

B. 1 年

C. 5 年

D. 用至骨骺愈合为止

E. 终身用药

14、关于性早熟，下列不正确的是（）

A. 发育启动年龄较正常儿童平均年龄提前 2 个标准差以上

B. 发育启动年龄较正常儿童平均年龄提前 1 个标准差以上

C. 一般认为女孩在 8 岁以前出现性发育征象临床可判断为性早熟

D. 一般认为男孩在 9 岁以前出现性发育征象临床可判断为性早熟

E. 性早熟以女孩多见

15、关于中枢性性早熟的临床特征，下列错误的是（）

A. 提前出现的性征发育与正常青春期发育程序相似

B. 提前出现的性征发育与正常青春期发育程序明显不同

C. 有些可在性发育一定程度后停顿一时期再发育

D. 在青春期成熟后，患儿除身高低于一般群体外，其余均正常

E. 青春期前的各个年龄组都可以发病

16、患儿女，7岁，多饮、多尿、多食，体重下降，诊断为糖尿病，她的饮食成分的分配为（）

- A. 糖 70%，蛋白质 10%，脂肪 20%
- B. 糖 60%，蛋白质 20%，脂肪 20%
- C. 糖 50%，蛋白质 20%，脂肪 30%
- D. 糖 40%，蛋白质 35%，脂肪 25%
- E. 糖 30%，蛋白质 30%，脂肪 40%

17、患儿男，8岁，多饮、多尿、多食，体重下降，诊断为1型糖尿病收入院治疗，其饮食中全日热量的分配方法是（）

- A. 早餐 1/5，中餐 2/5，晚餐 2/5
- B. 早餐 2/5，中餐 2/5，晚餐 1/5
- C. 早餐 2/5，中餐 1/5，晚餐 2/5
- D. 早餐 3/5，中餐 1/5，晚餐 1/5
- E. 早餐 1/5，中餐 1/5，晚餐 3/5

18、糖尿病患儿应用胰岛素治疗时，护理人员给予的正确指导是（）

- A. 随身携带糖块
- B. 皮内注射
- C. 固定注射部位
- D. 短期注射

E. 终生固定剂量

19、婴幼儿糖尿病患儿早期的症状多表现为（）

A. 烦躁

B. 多食

C. 消瘦

D. 多饮

E. 遗尿

20、儿童糖尿病不出现下列哪项表现（）

A. 多饮多尿，消瘦

B. 尿糖阳性

C. 空腹血糖增高

D. 糖耐量试验异常

E. 血压升高

21、哪项不属于小儿糖尿病的护理诊断（）

A. 便秘

B. 排尿异常

C. 酮症酸中毒

D. 营养失调

E. 有感染的危险

22、患儿，男，2岁，表情呆板，眼距宽，眼裂小，皮肤干燥，毛发稀少，眼睑浮肿不爱活动，鼻梁宽平，实验室检查：T3T4低，TSH高，最可能的疾病是（）

- A. 先天性甲低症
- B. 21-三体综合征
- C. 垂体性侏儒症
- D. 苯丙酮尿症
- E. 糖原累积症

23、10岁女孩，因多尿烦渴、疲乏来院就诊，经检查空腹血糖为11mmol/L，临床诊断为糖尿病胰岛素依赖型，护士指导其控制饮食时，每天正确的热卡摄入量为（）

- A. 1200kcal
- B. 1500kcal
- C. 1800kcal
- D. 2000kcal
- E. 2300kcal

24、造成小儿身体矮小的最常见原因是（）

- A. 呆小病

- B. 垂体分泌抗利尿激素
- C. 垂体性侏儒症
- D. 肾小管上皮细胞缺陷
- E. 肾小管性酸中毒

25、垂体性侏儒症的最好治疗方法是（）

- A. 人生长激素替代疗法
- B. 促蛋白合成激素应用
- C. 绒毛膜促性腺激素
- D. 甲状腺片
- E. 糖皮质激素

26、儿童糖尿病绝大多数为（）

- A. I 型糖尿病
- B. II 型糖尿病
- C. III型糖尿病
- D. 非胰岛素依赖型糖尿病
- E. 继发性糖尿病

27、地方性甲状腺功能减低症的主要原因是（）

- A. 甲状腺激素合成障碍
- B. 垂体分泌促甲状腺激素减少

- C. 甲状腺发育异常
- D. 孕妇饮食中缺碘
- E. 妊娠期母亲应用抗甲状腺药

28、对先天性甲状腺功能减低症患儿的护理不妥的是（）

- A. 保暖，防止感染
- B. 加强智能训练
- C. 定时监测血糖
- D. 保证营养供应
- E. 保持大便通畅

29、对糖尿病患儿的护理不妥的是（）

- A. 控制饮食
- B. 预防感染
- C. 预防低血糖
- D. 记录出入量
- E. 监测血清胆红素

30、胰岛素的应用注意事项应除外哪项（）

- A. 餐前 15～30 分钟注射
- B. 皮下注射
- C. 每次更换注射部位

D. 肌肉注射

E. 药物剂量绝对准确

31、小儿糖尿病全热量分三餐，早中晚正确的是（）

A. $2/5$ ， $2/5$ ， $1/5$

B. $2/5$ ， $1/5$ ， $2/5$

C. $1/5$ ， $2/5$ ， $2/5$

D. $1/3$ ， $1/3$ ， $1/3$

E. $1/4$ ， $2/4$ ， $1/4$

32、患儿在家一旦发生低血糖反应，应首先采取哪项措施（）

A. 立即平卧，进食糖水或糖块

B. 立即呼叫

C. 立即保暖

D. 立即送医院

E. 立即口服开水

33、下列哪项不是酮症酸中毒的救护措施（）

A. 立即建立 2 条静脉通路

B. 心理护理

C. 查血生化

D. 常规查尿酮体

E. 密切观察生命体征

34、患儿需终生服用甲状腺片，应定期测量（）

- A. 血糖
- B. 血压
- C. 血常规
- D. 血小板
- E. 体温、脉搏、体重、身高

35、小儿患生长激素缺乏症是骨龄较实际年龄落后（）

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 1 年
- D. 1 年以上
- E. 2 年以上

36、典型的甲状腺功能减低症患儿的临床表现应除外（）

- A. 头大颈短
- B. 皮肤细嫩
- C. 眼距宽
- D. 鼻梁宽平
- E. 头发稀少而干枯

37、患儿，男，10 岁，因多饮多尿消瘦入院，已确诊为糖尿病，给予胰岛素替代治疗，近日食欲差，今中午突然心慌，脉速多汗，护士立即给予的处理是（）

- A. 立即呼叫
- B. 立即口服温开水
- C. 立即给予高糖 40ml 口服
- D. 立即保暖
- E. 立即输入生理盐水

38、新生儿甲状腺功能减低症筛查的最佳时间（）

- A. 出生后 1 周左右
- B. 出生后立即查血
- C. 出生后 2~3 天
- D. 生后满 1 个月
- E. 生后 100 天

39、2 个月男婴，临床诊断为先天性甲状腺功能减低症，使用甲状腺片治疗 2 周后出现发热、多汗、体重减轻、易激惹，可能是出现了（）

- A. 甲状腺功能减低
- B. 甲状腺结节
- C. 甲状腺炎

- D. 甲状腺肿瘤
- E. 甲状腺功能亢进

40、新生儿最早出现的先天性甲状腺功能减低症的表现是（）

- A. 腹胀
- B. 嗜睡
- C. 喂养困难
- D. 生长发育迟缓
- E. 生理性黄疸的时间延长

41、为避免神经系统功能损害，先天性甲状腺功能减低症的患儿开始治疗的时间应为（）

- A. 生后 1~2 个月
- B. 生后 2~3 个月
- C. 生后 3~5 个月
- D. 生后 5~8 个月
- E. 生后 8~10 个月

42、生长激素缺乏症的患儿出现临床症状的年龄多在（）

- A. 出生时
- B. 1 岁以后
- C. 2 岁以后

D. 3 岁以后

E. 4 岁以后

43、先天性甲状腺功能减低症患者的治疗原则是（）

A. 甲状腺片治疗维持到症状好转

B. 甲状腺片治疗维持到学龄期结束

C. 甲状腺片治疗维持到青春期开始

D. 甲状腺片治疗到青春期结束

E. 甲状腺片维持终生治疗

44、唯一能促进能量储存的激素是（）

A. 肾上腺素

B. 胰高血糖素

C. 皮质醇

D. 胰岛素

E. 生长激素

45、10 岁小儿，因多尿、烦渴、疲乏来院就诊，经检查空腹血糖 10mmol / L，临床诊断为糖尿病胰岛素依赖型。护士指导其控制饮食时，每日正确的热卡摄入量是（）

A. 1200kcal

B. 1500kcal

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/537134003125010043>