

## 国家基本药物（中成药）部分

### 4. 银翘解毒丸（颗粒、片）

**【药物组成】**金银花、连翘、薄荷、荆芥、淡豆豉、牛蒡子(炒)、桔梗、淡竹叶、甘草。

**【功能主治】**疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，症见发热、头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛。

**【方解】**方中金银花、连翘辛凉透邪，清热解毒，为君药。薄荷、荆芥、淡豆豉辛散表邪，透热外出，为臣药。牛蒡子、桔梗、甘草宣肺止咳、清利咽喉；淡竹叶清热生津止咳，均为佐药。其中甘草调和诸药而兼使药。诸药合用，共奏疏风解表，清热解毒之功。

**【临床应用】**感冒外感风热所致发热、微恶风寒、鼻塞流黄浊涕、身热、无汗、头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛、舌苔薄黄、脉浮数；上呼吸道感染见上述证候者。

**【药理毒理】**本品有解热、抗菌、抗病毒、抗炎、镇痛作用。

**【不良反应】**服用本品后有发生心慌、胸闷、憋气，呼吸困难，大汗淋漓，面色苍白，眼前发黑，恶心呕吐过敏反应及致过敏性休克的报道。

**【禁忌】**无特殊禁忌。

**【注意事项】** 1. 风寒感冒，表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽者不宜用。

2. 孕妇慎用。

3. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

4. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

**【用法用量】**丸剂：浓缩蜜丸及水蜜丸，用芦根汤或温开水送服。一次1丸，一日2~3次；浓缩丸，口服，一次0.7~0.8g，一日3次。

颗粒剂：开水冲服。一次15g或5g（含乳糖），一日3次；重症者加服1次。

片剂：口服。一次4片，一日2~3次。

**【剂型规格】**丸剂：浓缩蜜丸每丸重3g；水蜜丸每丸重9g；浓缩

丸每 10 丸重 1.5g。

颗粒剂：每袋装（1）15g；（2）2.5g（含乳糖）。

片剂：薄膜衣片每片重 0.52g。

### 三、表里双解

#### 5. 防风通圣丸（颗粒）

**【药物组成】**麻黄、荆芥穗、防风、薄荷、大黄、芒硝、滑石、栀子、石膏、黄芩、连翘、桔梗、当归、白芍、川芎、白术(炒)、甘草。

**【功能主治】**解表通里，清热解毒。用于外寒内热，表里俱实，恶寒壮热、头痛咽干、小便短赤、大便秘结、瘰疬初起、风疹湿疮。

**【方解】**麻黄、荆芥穗、防风、薄荷疏风解表，使外邪从汗而解，共为君药。大黄、芒硝泻热通便，滑石、栀子清热利湿，使里热从二便分消；石膏、黄芩、连翘、桔梗清热泻火解毒，共为臣药。当归、白芍、川芎养血和血；白术健脾燥湿，为佐药。甘草益气和中，调和诸药，为使药。诸药合用，汗、下、清、利四法俱备，共奏解表通里，清热解毒之功。

**【临床应用】** 1. 感冒外感风寒、内有蕴热所致恶寒壮热，头痛，咽干，小便短赤，大便秘结，舌红苔黄厚，脉浮紧或弦数；上呼吸道感染见上述证候者。

2. 风疹湿疮内蕴湿热、复感风邪所致恶寒发热，头痛，咽干，小便短赤，大便秘结，丹斑隐疹，瘙痒难忍或湿疮；荨麻疹、湿疹见上述证候者。

3. 瘰疬颈部一侧或两侧见结块肿大如豆，或兼见恶寒发热，小便短赤，大便秘结；淋巴结结核早期见上述证候者。

**【药理毒理】**本品有通便、解热、抗炎、抑菌等作用。

**【不良反应】**服用本品后有发生过敏性皮疹不良反应的报道。

**【禁忌】**无特殊禁忌。

**【注意事项】** 1. 本品解表通里，清热解毒，虚寒证者不宜用。

2. 孕妇慎用。

3. 不宜久服。

4. 服药期间宜食清淡、易消化食物，忌油腻、鱼虾海鲜类食物。

**【用法用量】**丸剂：口服。水丸一次 6g；大蜜丸一次 1 丸；浓缩丸一次 8 丸，一日 2 次。

颗粒剂：口服。一次 3g，一日 2 次。

**【剂型规格】**丸剂：水丸每 20 丸重 1g；大蜜丸每丸重 9g；浓缩丸每 8 丸相当于原药材 6g。

颗粒剂：每袋装 3g。

#### 四、扶正解表

##### 6. 玉屏风颗粒

**【药物组成】**黄芪、白术（炒）、防风。

**【功能主治】**益气，固表，止汗。用于表虚不固，自汗、恶风、面色晄白，或体虚易感风邪者。

**【方解】**黄芪重用益气固表，实卫而止汗，为君药。白术健脾益气，助黄芪益气固表，为臣药。防风走表而御风邪，为佐药。黄芪得防风，固表不留邪；防风得黄芪，祛邪不伤正。诸药合用，补中有散，散中有补，共建益气，固表止汗之功。

**【临床应用】** 1. 自汗多由气虚卫外不固所致，症见自汗，恶风，气短，乏力，舌淡，脉虚弱。

2. 体虚易感冒由表虚不固所致的神疲乏力，自汗恶风，反复感冒，舌淡，脉虚。

**【药理毒理】**本品有增强机体免疫功能和抗变态反应等作用。

**【不良反应】**目前尚未检索到不良反应报道。

**【禁忌】**无特殊禁忌。

**【注意事项】** 1. 宜饭前服用。

2. 热病汗出不宜服用。

3. 阴虚盗汗慎用。

4. 服药期间饮食宜选清淡之品，忌油腻食物。

**【用法用量】**颗粒剂：开水冲服，一次 5g，一日 3 次。

**【剂型规格】**颗粒剂：每袋装 5g。

#### 第二节 祛暑剂

##### 一、解表祛暑

## 7. 保济丸

**【药物组成】** 广藿香、苍术、白芷、化橘红、厚朴、菊花、蒺藜、钩藤、薄荷、茯苓、薏苡仁、神曲茶、稻芽、木香、葛根、天花粉。

**【功能主治】** 解表，祛湿，和中。用于暑湿感冒，症见发热头痛、腹痛腹泻、恶心呕吐、肠胃不适；亦可用于晕车晕船。

**【方解】** 方中广藿香芳香辛散，解表化湿；苍术、白芷解表散寒，燥湿宽中，三药共为君药。化橘红、厚朴燥湿除满，下气和中；菊花、蒺藜、钩藤、薄荷清宣透邪，六药共为臣药。茯苓、薏苡仁淡渗利湿；神曲茶、稻芽、木香醒脾开胃，行气和中；葛根升清止泻；天花粉清热生津，七药共为佐药。全方配伍，共收解表，祛湿，和中之功。

**【临床应用】** 1. 感冒外感表邪、胃失和降所致发热头痛、腹痛腹泻、噎食噎酸、恶心呕吐、肠胃不适、消化不良、舌质淡、苔腻、脉浮；胃肠型感冒见上述证候者。

2. 急性胃肠炎感受时邪、饮食不慎所致吐泻不止、下利清稀或如米泔水、腹痛或不痛、胸膈满闷、四肢清冷、舌苔白腻、脉濡弱。

3. 晕动症乘坐交通工具时出现头晕、恶心、呕吐、面色苍白、汗出肢冷。

**【药理毒理】** 1. 本品具有抗炎、镇痛及调节胃肠平滑肌张力等作用。

2. 毒理本品小鼠灌胃给药的 LD<sub>50</sub> 为 699.8±30.11g/kg (相当于临床口服量的 5000 倍)。

**【不良反应】** 目前尚未检索到不良反应报道。

**【禁忌】** 孕妇禁用。

**【注意事项】** 1. 本品解表，祛湿，外感燥热者不宜用。

2. 急性肠道传染病之剧烈恶心、呕吐、水泻不止者不宜用。

3. 哺乳期妇女慎用。

4. 服药期间饮食宜清淡，忌生冷油腻食物。

**【用法用量】** 口服。水丸：一次 1.85~3.7g，一日 3 次。浓缩丸：一次 1.2g，一日 3 次。

**【剂型规格】** 丸剂：水丸每瓶装(1)1.85g，(2)3.7g；浓缩丸：每

瓶装 1.2g。

#### 8. 藿香正气水

**【药物组成】** 广藿香油、紫苏叶油、白芷、厚朴(姜制)、大腹皮、生半夏、陈皮、苍术、茯苓、甘草浸膏。

**【功能主治】** 解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。

**【方解】** 方中藿香味辛，性微温，既可解表散风寒，又芳香化湿浊，且辟秽和中，升清降浊，以为君药。辅以紫苏、白芷辛温发散，助藿香外散风寒，芳化湿浊，为臣药。厚朴、大腹皮行气燥湿、除满消胀，半夏、陈皮燥湿和胃、降逆止呕，苍术、茯苓燥湿健脾、和中止泻，共为佐药。使以甘草调和脾胃，并调和药性。诸药相合，内外兼治，表里双解，风寒得解，湿滞得化，清升浊降，气机通畅，共奏解表化湿，理气和中之效。

**【临床应用】** 1.感冒因外感风寒、内伤湿滞所致的恶寒发热，头身困重疼痛，胸脘满闷，恶心纳呆，舌质淡红，舌苔白腻，脉浮缓；胃肠型感冒见上述证候者。

2.呕吐因湿阻中焦所致的呕吐，脘腹胀痛，伴发热恶寒，周身酸困，头身疼痛；胃肠型感冒见上述证候者。

3.泄泻因湿阻气机、大肠湿热所致的泄泻暴作，便下清稀，肠鸣腹痛，脘闷纳呆，伴见恶寒发热，周身酸楚；胃肠型感冒见上述证候者。

4.中暑因外感暑湿、气机受阻所致的突然恶寒发热，头晕昏沉，胸脘满闷，恶心欲呕，甚则昏仆，舌苔白厚腻；胃肠型感冒见上述证候者。

**【药理毒理】** 本品有促进胃肠运动、解除肠痉挛、抗过敏、镇吐、镇痛等作用。

**【不良反应】** 服用本品后有发生药疹、紫癜、休克等过敏反应的报道。

**【禁忌】** 孕妇禁用。

- 【注意事项】** 1.外感风热所致的感冒不宜用。  
2.阴虚火旺者不宜用。  
3.饮食宜清淡。  
4.不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

**【用法用量】** 口服。一次5~10ml，一日2次，用时摇匀。

**【剂型规格】** 酏剂：每瓶装10ml。

## 二、健胃祛暑

### 9. 十滴水

**【药物组成】** 樟脑、干姜、桉油、小茴香、肉桂、辣椒、大黄。

**【功能主治】** 健胃，祛暑。用于因中暑所致的头晕、恶心、腹痛、胃肠不适。

**【方解】** 方中樟脑辛香辟秽，开窍祛暑，为君药。干姜温脾和中，化湿除满；桉油透邪疏风，清热解暑，二药共为臣药。小茴香理气开胃，辛香止痛；肉桂温中理气；辣椒消食解结，辟毒开胃；大黄荡涤实浊，四药共为佐药。全方配伍，共收健胃祛暑之功。

**【临床应用】** 中暑夏秋季节感受暑湿所致头晕，头重如裹，恶心，脘腹胀痛，胃肠不适或泄泻，身热不扬，舌苔白腻，脉濡缓。

**【药理毒理】** 本品有抑制胃肠运动、镇痛等作用。

**【不良反应】** 服用本品后有发生猩红热样药疹、接触性皮炎不良反应的报道。

**【禁忌】** 孕妇禁用。。

- 【注意事项】** 1.服药期间饮食宜清淡，忌食辛辣油腻之品。  
2.不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

**【用法用量】** 口服。一次2~5ml。

**【剂型规格】** 酏剂：每瓶装（1）5ml；（2）10ml。

## 第三节 泻下剂

### 润肠通便

#### 10. 麻仁润肠丸（软胶囊）

**【药物组成】** 火麻仁、大黄、苦杏仁（去皮炒）、白芍、陈皮、木香。

**【功能主治】**润肠通便。用于肠胃积热，胸腹胀满，大便秘结。

**【方解】**方中以质润多脂的火麻仁润肠通便，为君药。大黄攻积泻下，更取苦杏仁、白芍，一则益阴增液以润肠通便，使腑气通，津液行；二则甘润可减缓大黄攻伐之力，使泻下而不伤正，共为臣药。再以陈皮、木香调中宣滞，加强降泄通便之力，共为佐药。诸药相合，共奏润肠通便之功。

**【临床应用】**便秘胃肠积热所致大便秘结，胸腹胀满，口苦，尿黄，舌红苔黄或黄燥，脉滑数；习惯性便秘见上述证候者。

**【药理毒理】**本品有通便、促进肠运动等作用。

**【不良反应】**少数患者服用本品软胶囊后出现腹痛。

**【禁忌】** 1.孕妇禁用。

2.严重气质性病变引起的排便困难，如结肠癌，严重的肠道憩室，肠梗阻及炎症性肠病等禁用。**【注意事项】** 1.虚寒性便秘不宜用。

2.月经期慎用。

3.忌食生冷、油腻、辛辣食物。

4.有慢性病史者、小儿及年老体虚者不宜长期服用。

5.服药后大便次数过多，大便偏稀，可酌情减量或停药。

**【用法用量】**丸剂：口服。一次1~2丸，一日2次。

软胶囊剂：口服。一次8粒，一日2次，年老、体弱者酌情减量使用。

**【剂型规格】**丸剂：大蜜丸每丸重6g。

软胶囊剂：每粒装0.5g。

#### 第四节 清热剂

##### 一、清热泻火

##### 11. 黄连上清丸（颗粒、胶囊、片）

**【药物组成】**黄连、黄芩、黄柏（酒炒）、石膏、栀子（姜制）、大黄（酒制）、连翘、菊花、荆芥穗、白芷、蔓荆子（炒）、川芎、防风、薄荷、旋覆花、桔梗、甘草。

**【功能主治】**散风清热，泻火止痛。用于风热上攻、肺胃热盛所致的头晕目眩、暴发火眼、牙齿疼痛、口舌生疮、咽喉肿痛、耳痛耳

鸣、大便秘结、小便短赤。

**【方解】**方中黄连、黄芩、黄柏、石膏清热泻火，燥湿解毒；栀子、大黄清热凉血解毒并可引热毒从二便而出，共为君药。连翘、菊花、荆芥穗、白芷、蔓荆子、川芎、防风、薄荷疏散风热，共为臣药。佐以旋覆花下气行水；桔梗清热利咽排脓，载药上行。甘草清热解毒，调和诸药，为佐使药。诸药合用，散风清热，泻火止痛，上通下行，使火热随之而解。

**【临床应用】** 1.暴风客热因风热上攻，肺胃热盛，引动肝火上蒸头目所致，症见眼内刺痒交作，羞明流泪，眵多，白睛红赤，头痛，身热，口渴，尿赤，舌苔黄，脉浮数；急性结膜炎见上述证候者。

2.聤耳因风热邪毒上犯，并肺胃热盛，毒热结聚，循经上蒸耳窍，气血相搏，化腐成脓所致，症见急剧发作，耳痛显著，眩晕流脓，重听耳鸣，头痛发热，鼻塞流涕，舌红苔薄黄，脉浮数；急性化脓性中耳炎见上述证候者。

3.口疮因风热邪毒内侵，或肺胃热盛，循经上攻于口所致，症见口腔黏膜充血发红，水肿破溃，渗出疼痛，口热口臭，身痛不适，口干口渴，便干尿黄，舌红苔黄，脉浮滑数；急性口炎、复发性口疮见上述证候者。

4.牙宣因肺胃火盛，风热内侵，火热蕴郁，循经上蒸于龈所致，症见牙龈红肿，出血渗出，疼痛，口干口渴，口臭口黏，便秘尿黄，舌苔黄，脉浮弦数；急性牙龈（周）炎见上述证候者。

5.尽牙痛因风热邪毒侵袭，并有肺胃火盛，蕴热化火结毒，循经郁结牙龈冠周所致，症见冠周牙龈充血肿胀，渗出化脓，疼痛剧烈，口热口臭，口渴口干，张口可受限，便秘，尿黄，舌苔黄厚，脉弦实数；急性智齿冠周炎见上述证候者。

6.喉痹因风热邪毒内侵，并肺胃热盛，蕴热生火相结，循经上蒸咽喉所致，症见咽喉红肿疼痛，头痛，身热，尿黄便干，舌苔黄，脉弦数；急性咽炎见上述证候者。

**【药理毒理】**本品有解热、抗炎、镇痛及通便等作用。

**【不良反应】**服用本品有发生急性肝损害不良反应的报道。



**【禁忌】** 1.孕妇禁用。

2.对本品过敏者禁用。

**【注意事项】** 1.本品清实热火毒，阴虚火旺者慎用。

2.本品苦寒，易伤胃气，脾胃虚寒者慎用。

3.过敏体质者慎用。

4.服药期间饮食宜清淡，忌食辛辣刺激等食物。

5.不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

**【用法用量】** 丸剂：口服。水丸或水蜜丸一次 3~6g，大蜜丸一次 1-2 丸，一日 2 次。

颗粒剂：口服。一次 2g，一日 2 次。

胶囊剂：口服。一次 4 粒，一日 2 次。

片剂：口服。一次 6 片，一日 2 次。

**【剂型规格】** 丸剂：水丸每袋装 6g；水蜜丸每 40 丸重 3g；大蜜丸每丸重 6g。

颗粒剂：每袋装 2g。

胶囊剂：每粒装 0.3g。

片剂：每片重 0.3g（薄膜衣片）。

12.牛黄解毒丸（胶囊、软胶囊、片）

**【药物组成】** 人工牛黄、石膏、黄芩、大黄、雄黄、冰片、桔梗、甘草。

**【功能主治】** 清热解毒。用于火热内盛，咽喉肿痛，牙龈肿痛，口舌生疮，目赤肿痛。

**【方解】** 方中人工牛黄味苦气凉，入肝、心经，功善清心泻火解毒，为君药。生石膏味辛能散，气大寒可清胃泻火，除烦止渴，黄芩味苦气寒，清热燥湿，泻火解毒，大黄苦寒沉降，清热泻火，凉血解毒，泻下通便，开实火下行之途，共为臣药。雄黄、冰片清热解毒，消肿止痛；桔梗味苦辛，归肺经，宣肺利咽，共为佐药。甘草调和诸药，为使药。诸药合用，共奏清热解毒之效。

**【临床应用】** 1.口疮因胃火亢盛所致的口舌生疮，疼痛剧烈，或此起彼伏，反复发作，口干喜饮，大便秘结，舌质红苔黄，脉沉实有

； 口腔炎、口腔溃疡见上述证候者。

dateTime=2009-10-26T11:44>

2.牙痛因三焦火盛所致的牙龈红肿疼痛，发热，甚则牵引头痛，日轻夜重，口渴引饮，大便燥结，小便黄赤，或面颊红肿，颌下瘰疬疼痛，苔黄，脉滑数有力；急性牙周炎、牙龈炎见上述证候者。

3.急喉痹因火毒内盛，火热上攻所致的咽痛红肿，壮热烦渴，大便秘结，腹胀胸满，小便黄赤，舌红苔黄，脉滑数有力；急性咽炎见上述证候者。

**【药理毒理】**本品有抗炎、解热、镇痛等作用。

**【不良反应】**服用牛黄解毒片后有发生药疹、过敏性休克、肝脏损害、砷中毒等不良反应的报道。

**【禁忌】** 1.孕妇禁用。

2.对本品过敏者禁用。

**【注意事项】** 1.阴虚火旺所致口疮、牙痛、喉痹者不宜用。

2.本品苦寒泄降，脾胃虚弱者慎用。

3.过敏体质者慎用。

4.因方中含有雄黄，故不宜过量、久服。

5.忌烟、酒及辛辣、油腻食物。

6.不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

**【用法用量】**丸剂：口服。大蜜丸一次1丸，一日2~3次；水丸一次2g，一日3次。

胶囊剂：口服。小粒一次3粒；大粒一次2粒，一日2~3次。

软胶囊剂：口服。一次4粒，一日2~3次。

片剂：口服。小片一次3片，大片一次2片，一日2~3次。

**【剂型规格】**丸剂：大蜜丸每丸重3g。

胶囊剂：每粒（1）0.3g（小粒）；（2）0.4g（大粒）。

软胶囊剂：每粒装0.4g。

片剂：每片（1）0.3g（小片）；（2）0.6g（大片）。

13.牛黄上清丸（胶囊、片）

芩、黄连、黄柏、大黄、栀子、石膏、赤芍、地黄、当归、川芎、冰片、桔梗、甘草。

**【功能主治】** 清热泻火，散风止痛。用于热毒内盛、风火上攻所致的头痛眩晕、目赤耳鸣、咽喉肿痛、口舌生疮、牙龈肿痛、大便燥结。

**【方解】** 方中人工牛黄性凉，功能清热解毒，消肿止痛，为清热解毒之佳品，故为君药。菊花、连翘凉散风热，清热解毒；荆芥穗、白芷解表散风，消肿止痛；薄荷疏风清热，利咽解毒，诸药均有发散火邪之能，有“火郁发之”之意，故为臣药。黄芩、黄连、黄柏、大黄、栀子苦寒清热燥湿，解毒泻火，凉血消肿，能够清泻三焦实火；石膏清解阳明经实热火邪；赤芍、地黄、当归、川芎凉血活血，上行头目，祛风止痛；冰片疏散郁火，通关开窍，清利咽喉，聪耳明目，以助清上焦热邪，透发火郁，以为佐药。桔梗轻清上浮，载药上行；甘草调和诸药，共为使药。诸药合用，共奏清热泻火，散风止痛之功。

**【临床应用】** 1. 头痛因热毒内盛，风火上攻所致，症见头痛，伴有头晕，面红目赤，口干口苦；原发性高血压、血管神经性头痛见上述证候者。

2. 眩晕因热毒内盛，风火上攻所致，症见眩晕，面红，目赤，耳鸣，耳聋；原发性高血压见上述证候者。

3. 暴风客热因热毒内盛，风火上攻，引动肝火，上犯头目所致，眼内刺痒交作，羞明流泪，眵多，白睛红赤，头痛身热，口渴尿赤，舌苔黄，脉浮数；急性结膜炎见上述证候者。

4. 喉痹因热毒内盛，风火上攻，蕴热生火相结，循经上蒸咽喉所致，症见咽喉红肿疼痛，头痛，身热，尿黄，便干，舌苔黄，脉弦数；急性咽炎见上述证候者。

5. 口疮、口糜因热毒内盛，风火上攻，蕴热生火产毒，结聚口腔而致，症见黏膜充血发红，水肿破溃，渗出疼痛，口干口渴，身痛乏力，便干尿黄，舌红苔黄，脉弦洪数；急性口炎、复发性口疮见上述证候者。

牙宣因热毒内盛，风火上攻，火热相搏，蕴结上犯牙龈所致，症见牙龈红肿，出血渗出疼痛，口干口渴，口臭口热，便秘，尿黄，舌苔黄，脉浮弦数；急性牙龈（周）炎见上述证候者。

7.牙痛因热毒内盛，复感风火上攻，蕴热化火结毒，循经至冠周牙龈，症见牙龈充血肿胀，渗出化脓，疼痛剧烈，口热口臭，张口可受限，便秘，尿黄，舌苔黄厚，脉弦实数；急性智齿冠周炎见上述证候者。

**【药理毒理】**本品有镇痛、抗炎、通便和解热的作用。

**【不良反应】**服用本品后有发生药疹及过敏性休克不良反应的报道。

**【禁忌】**对本品过敏者禁用。

**【注意事项】** 1.阴虚火旺所致的头痛眩晕，牙痛咽痛不宜用。

2.孕妇慎服。

3.本品寒凉，易伤胃气，小儿、年老体弱、大便溏软者慎服。

4.服药期间饮食宜清淡，忌食辛辣油腻食物。

5.不宜在服药期间同时服用温补性中成药。

6.用本品治疗喉痹，口疮，口糜，牙宣，牙痛时，可配合使用外用药物，以增强疗效。

7.注意保持口腔清洁卫生，经常漱口，以减少邪毒滞留。

**【用法用量】**丸剂：口服。水丸一次 3g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次。

胶囊剂：口服。一次 3 粒，一日 2 次。

片剂：口服。一次 4 片，一日 2 次。

**【剂型规格】**丸剂：水丸每 16 粒重 3g；大蜜丸每丸重 6g。

胶囊剂：每粒装 0.3g。

片剂：每片重 0.25g。

## 二、清热解毒

### 14. 双黄连合剂（颗粒、胶囊、片）

**【药物组成】**金银花、黄芩、连翘。

**【功能主治】**疏风解表，清热解毒。用于外感风热所致的感冒，

**【方解】**方中金银花性味甘寒，芳香疏散，善散肺经热邪，又可清解心胃之热毒，为辛凉解表、清热解毒之良药，故为君药。黄芩苦寒，长于清肺热与上焦实火，并能清热燥湿，泻火解毒；连翘味苦，性微寒，既能清热解毒，又能透表达邪，长于清心火而散上焦之热，二药共为臣药。全方配合，药少而力专，共奏疏风解表、清热解毒之功。

**【临床应用】**感冒因外感风热所致发热、微恶风、汗泄不畅、头胀痛、鼻塞流黄浊涕、咳嗽、舌红苔薄黄、脉浮数；上呼吸道感染见上述证候者。

**【药理毒理】**本品有解热、抗炎、抗病原微生物（链球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、肺炎双球菌、金黄色葡萄球菌和流感病毒亚甲1型、流感病毒亚甲3型、流感病毒A1、流感病毒A3、腺病毒3型、呼吸道合胞病毒等）作用。

**【不良反应】**服用本品后有发生皮肤瘙痒、皮疹不良反应的报道。

**【禁忌】**对本品过敏者禁用。

**【注意事项】** 1.本品苦寒，易伤胃气，脾胃虚寒者慎服。

2.风寒感冒，表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽者不宜用。

3.过敏体质者慎用。

4.忌烟酒及辛辣、生冷、油腻食物。

**【用法用量】**合剂：口服。一次10ml，一日3次；小儿酌减或遵医嘱。

颗粒剂：口服或开水冲服。无糖颗粒：一次5g，一日3次，6个月以下，一次1.0~1.5g，6个月至1岁，一次1.5~2.0g，1岁至3岁，一次2.0~2.5g，3岁以上儿童酌量或遵医嘱。含糖颗粒，服用量加倍。

胶囊剂：口服。一次4粒，一日3次；儿童酌减或遵医嘱。

片剂：口服。一次4片，一日3次；小儿酌减或遵医嘱。

**【剂型规格】**合剂：每瓶装100ml。

5g (1) 无糖颗粒 (相当于原药材 60g) ; (2) 含糖颗粒 (相当于原药材 30g) 。

胶囊剂: 每粒装 0.4g 。

片剂: 每片重 0.5g 。

#### 15. 银黄颗粒 (片)

**【药物组成】** 金银花提取物、黄芩提取物。

**【功能主治】** 清热疏风, 利咽解毒。用于外感风热、肺胃热盛所致的咽干、咽痛、喉核肿大、口渴、发热; 急慢性扁桃体炎、急慢性咽炎、上呼吸道感染见上述证候者。**【方解】** 方中金银花性寒泄降, 为花主散, 功善清热解毒, 又兼疏风散热, 透散表邪, 为主药。黄芩味苦气寒, 既除上焦湿热火毒, 又清肺热、泻肺火, 为辅药。二药合用, 共奏清热解毒, 疏风散热之效。

**【临床应用】** 1. 急、慢乳蛾由外感风热, 邪热入里, 肺胃热盛所致, 症见咽喉疼痛剧烈, 咽痛连及耳根及颌下, 吞咽困难, 喉核红肿较甚, 表面有黄白色脓点, 或连成伪膜, 高热, 渴饮, 口臭, 舌质红赤, 苔黄厚, 脉洪大而数; 急、慢性扁桃体炎见上述证候者。

2. 急、慢喉痹由外感风热, 邪热入里, 肺胃热盛所致, 症见咽部红肿, 疼痛较剧, 发热较高, 口干, 大便秘结, 小便黄, 舌赤, 苔黄, 脉洪数; 急、慢性喉炎见上述证候者。

3. 感冒由外感风热, 邪热入里化热, 肺胃热盛所致, 症见身热较著, 微恶风, 头胀痛, 咳嗽, 痰黏或黄, 咽燥, 或咽喉红肿疼痛, 鼻塞, 流黄浊涕, 口渴欲饮, 舌苔黄, 脉浮数; 上呼吸道感染见上述证候者。

**【药理毒理】** 本品有抗细菌毒素、抗过敏、抗炎作用。

**【不良反应】** 尚未检索到不良反应报道。

**【禁忌】** 无特殊禁忌。

**【注意事项】** 1. 本品清热解毒, 阴虚火旺者慎用。

2. 本品苦寒, 脾气虚寒, 大便溏者慎用。

3. 服药期间忌辛辣、鱼腥食物。

**【用法用量】** 颗粒剂: 开水冲服。一次 4-8g , 一日 2 次。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538023016026006032>