

## 中医眼科学试题及答案

1、患者白睛红赤肿胀,患眼焮热疼痛,刺痒较重,恶热畏光,泪热眵结;兼见头痛鼻塞,恶寒发热,口渴思饮,便秘溲赤;舌红苔黄,脉数。治宜选用

- A. 泻肺饮加减
- B. 羌活胜风汤加减
- C. 泻白散加减
- D. 防风通圣散加减
- E. 以上都不是

**【答案】D**

2、圆翳内障的病因是

- A. 外伤
- B. 先天
- C. 年老
- D. 中毒
- E. 辐射

**【答案】C**

3、组织学中角膜分为五层,受损后形成不透明瘢痕影响视力主要的是

- A. 上皮细胞层
- B. 基质层
- C. 内皮细胞层

D. 后弹力层

E. 前弹力层

**【答案】B**

4、患儿内眦部白睛暴露少,似有“对眼儿”,经下列哪项检查可排除内斜视

A. 眼压正常

B. 眼球转动不受限制

C. 角膜映光正位

D. 双眼视力对称

E. 以上都不是

**【答案】C**

5、眼前似有阴影飘浮,神膏混浊,视物昏花,兼见头晕心悸,乏力倦怠,舌淡苔薄白,脉细弱,宜用

A. 明目地黄汤

B. 杞菊地黄丸

C. 补中益气丸

D. 八珍汤

E. 天麻钩藤饮

**【答案】D**

6、眼的附属器包括

A. 眼睑与角膜,眼眶

- B. 视路, 眼睑, 泪器
- C. 眼眶, 玻璃体, 结膜
- D. 眼外肌, 晶状体
- E. 眼睑, 结膜, 泪器, 眼外肌, 眼眶

**【答案】** E

7、脓漏眼相当于西医学的眼病是

- A. 真菌性角膜炎
- B. 病毒性结膜炎
- C. 细菌性结膜炎
- D. 化脓性角膜炎
- E. 超急性细菌性结膜炎

**【答案】** E

8、为预防近视, 应注意营养均衡, 勿过食

- A. 肉类
- B. 鱼类
- C. 柑橘类水果
- D. 含钙高的食物
- E. 甜食. 软食

**【答案】** E

9、视盘上的血管向鼻侧偏移,呈屈膝状改变,C/D扩大加深,常见于

- A. 日系暴盲
- B. 络阻暴盲
- C. 绿风内障
- D. 青风内障
- E. 高风内障

**【答案】D**

10、强调内外兼治,外治疗程至少 10——12 周以上的眼病为

- A. 眼丹
- B. 睑弦赤烂
- C. 针眼
- D. 椒疮
- E. 风赤疮痍

**【答案】D**

11、视乳头颜色苍白,边界清楚的病因

- A. 多为肝肾精亏,肝血不足,目系失养所致
- B. 黑睛表面损伤,复感外邪所致
- C. 恣嗜烟酒,过食肥甘之品而生
- D. 屈光不正,白睛涩痛所致

E. 风沙阳光长期刺激而成

**【答案】** A

12、正常眼球向前平视时,眼球与眶缘的位置关系是

A. 与外侧眶缘平行

B. 在外侧眶缘之后 2——5mm

C. 突出外侧眶缘 12——14mm

D. 在外侧眶缘之后 12——14mm

E. 突出外侧眶缘 2——5mm

**【答案】** C

13、《陶氏疗目方》和甘浚之的《疗耳目方》,是我国最早的眼科方书,可惜失传,其成书年代为

A. 唐

B. 隋

C. 汉

D. 战国

E. 秦

**【答案】** B

**【解析】**

14、目系疾病多从()论治

A. 肾

B. 脾

C. 肝

D. 肺

E. 心

**【答案】** C

15、发于白睛之病症,有时责之于肺,有时不为肺之病,如白睛发黄,形成原因是

A. 脾胃湿热,交蒸肝胆,胆汁外溢

B. 肺经风热,上犯于目

C. 肺胃蕴热,上蒸于目

D. 肝郁化火,上攻于目白

E. 肝胆实火,上攻于目白

**【答案】** A

16、患眼痒涩刺痛,胬肉高厚红赤,眦头尤甚;心烦多梦,或口舌生疮,小便短赤;舌尖红,脉数。证属

A. 阴虚火旺

B. 脾胃实热

C. 心火上炎

D. 心肺风热

E. 肝火上亢

**【答案】** C

17、单疱病毒性角膜炎什么情况下可考虑应用皮质激素

- A. 树枝状角膜混浊
- B. 地图样角膜溃疡
- C. 角膜基质层水肿浸润, 上皮荧光素染色阴性
- D. 角膜基质层水肿浸润, 上皮荧光素染色阳性
- E. 任何时候都不应该使用皮质激素

**【答案】** C

18、《眼科纂要》之新制柴连汤主要由下列哪些药物组成

- A. 龙胆草. 柴胡. 黄连. 生地黄. 大黄
- B. 车前子. 木贼草. 龙胆草. 柴胡. 黄连
- C. 蔓荆子. 龙胆草. 黄芩. 黄连. 柴胡
- D. 白芍. 栀子. 柴胡. 黄连. 龙胆草
- E. 银花. 车前子. 黄连. 龙胆草. 柴胡

**【答案】** C

19、根据五轮学说, 白睛属于

- A. 肉轮
- B. 血轮
- C. 气轮
- D. 风轮

E. 水轮

**【答案】** C

20、络阻暴盲的主要特征是

A. 视网膜渗出

B. 视网膜脱离

C. 黄斑区樱桃红斑

D. 视网膜出血

E. 黄斑区水肿

**【答案】** C

21、提出瞳神紧小之“强阳搏实阴”理论的著作是

A. 《审视瑶函》

B. 《原机启微》

C. 《银海指南》

D. 《外台秘要》

E. 《秘传眼科龙木论》

**【答案】** B

22、青风内障类似于西医什么类型的青光眼

A. 开角型青光眼

B. 闭角型青光眼



- C. 继发性青光眼
- D. 原发性青光眼
- E. 绝对期青光眼

**【答案】** A

23、以下哪种病不属于暴盲的范畴

- A. 视神经乳头炎
- B. 视网膜中央动脉阻塞
- C. 视网膜静脉周围炎
- D. 虹膜睫状体炎
- E. 急性球后视神经炎

**【答案】** D

24、患者视力骤降,神膏混浊,视衣脱离,伴急躁易怒,失眠多梦,耳鸣如潮,口苦,舌红苔黄,脉弦数。宜选下列何方治疗

- A. 导赤散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 抑阳酒连散
- D. 泻心汤
- E. 以上都不是

**【答案】** B

25、宿翳中之最轻者为

- A. 云翳
- B. 冰瑕翳
- C. 厚翳
- D. 斑脂翳
- E. 气翳

【答案】B

26、患者双眼昏矇日久，渐至失明，视盘色淡白，口眼干涩，头晕耳鸣，腰酸肢软，烦热盗汗，舌红苔薄白，脉细。宜选用何方

- A. 八珍汤
- B. 逍遥散
- C. 归脾汤
- D. 四物五子丸
- E. 明目地黄汤

【答案】E

27、黑睛生翳，病至后期，风热已除，遗留翳障者，宜用

- A. 加减拨云退翳散
- B. 海藏地黄散
- C. 知柏地黄汤加退翳药
- D. 羚羊钩藤汤
- E. 养阴清肺汤加味

**【答案】** A

28、惊震内障的病因是

- A. 外伤
- B. 先天
- C. 年老
- D. 中毒
- E. 辐射

**【答案】** A

29、盘状角膜炎是由下列哪种病原微生物感染所致

- A. 绿脓杆菌
- B. 单纯疱疹病毒
- C. 沙眼衣原体
- D. 丝状真菌
- E. 以上都不是

**【答案】** B

30、组织学中角膜分为五层, 受损后形成不透明瘢痕影响视力主要的是

- A. 上皮细胞层
- B. 基质层
- C. 内皮细胞层

D. 后弹力层

E. 前弹力层

**【答案】** B

31、暴风客热多因

A. 风热之邪外袭

B. 外感疫毒之气

C. 风热湿邪搏结

D. 风寒客目

E. 痰湿内蕴

**【答案】** A

32、患儿内眦部白睛暴露少,似有“对眼儿”,经下列哪项检查可排除内斜视

A. 眼压正常

B. 眼球转动不受限制

C. 角膜映光正位

D. 双眼视力对称

E. 以上都不是

**【答案】** C

33、根据五轮学说,视衣属于

A. 气轮

B. 火轮

C. 血轮

D. 水轮

E. 肉轮

**【答案】** D

34、患者目珠外伤,视物模糊,头痛珠胀,胞睑瘀血肿胀,白睛瘀赤,瞳神略大,尚能缩展,晶珠受损混浊。下列哪一方剂适用

A. 退热散

B. 除风益损汤

C. 五味消毒饮

D. 补中益气汤

E. 驱风散热饮子

**【答案】** B

35、患者视力渐降,日久失明,视盘色苍白,面色无华,唇甲色淡,神疲乏力,心悸气短;舌淡苔薄白,脉细无力。下列哪一方剂适用

A. 四物五子丸

B. 逍遥散

C. 归脾汤

D. 八珍汤

E. 明目地黄汤

【答案】D

36、下列哪种眼病不属于眼外伤范畴

- A. 撞击伤目
- B. 真睛破损
- C. 异物入目
- D. 漏睛
- E. 化学性眼损伤

【答案】D

37、黄斑位于视盘颞侧约

- A. 1mm
- B. 2mm
- C. 3mm
- D. 4mm
- E. 5mm

【答案】C

38、因眼与肺气有着密切的关系,故《灵枢·决气》中说:气脱者( )

- A. 目不明
- B. 络不畅
- C. 血不行

D. 肠不通

E. 水不利

**【答案】** A

39、我国有资料记载的使用眼镜的朝代是

A. 唐朝

B. 宋朝

C. 元朝

D. 明朝

E. 清朝

**【答案】** B

40、眼球向前方平视时,两眼球突出度相差不超过

A. 1mm

B. 1.5mm

C. 2mm

D. 2.5mm

E. 3mm

**【答案】** C

**【解析】**

41、验光时为准确获得调节静止状态的屈光度数,应在

- A. 充分休息后
- B. 点用抗疲劳眼液后
- C. 睫状肌麻痹后
- D. 充分阅读后
- E. 充分望远后

**【答案】** C

42、我国从什么时代开始发明与使用眼镜

- A. 唐朝
- B. 宋朝
- C. 元朝
- D. 明朝
- E. 清朝

**【答案】** B

43、哪个项目不是乌风内障诊断必须具备的

- A. 有眼原发病变史
- B. 头痛, 眼胀, 视力下降
- C. 抱轮红赤, 瞳神散大
- D. 眼压明显增高
- E. 房角检查小梁新生血管膜形成, 虹膜周边前粘连, 甚至房角完全闭塞



**【答案】 C**

44、用滤纸法作泪液分泌检查时,下列方法正确的是

A. 5 分钟后滤纸被泪液渗湿的长度正常平均为 15mm 以上,不足 10mm 为泪液分泌过少

B. 5 分钟后滤纸被泪液渗湿的长度正常平均为 10mm 以上,不足 5mm 为泪液分泌过少

C. 10 分钟后滤纸被泪液渗湿的长度正常平均为 15mm 以上,不足 5mm 为泪液分泌过少

D. 10 分钟后滤纸被泪液渗湿的长度正常平均为 10mm 以上,不足 5mm 为泪液分泌过少

E. 5 分钟后滤纸被泪液渗湿的长度正常平均为 15mm 以上,不足 5mm 为泪液分泌过少

**【答案】 B**

45、椒疮重症的并发症与后遗症有

A. 倒睫拳毛

B. 黑睛星翳

C. 赤膜下垂

D. 瞳神紧小

E. 眼珠干燥

**【答案】 ABCE**

46、络损暴盲,眼底视网膜静脉纤曲扩张,视网膜火焰状出血. 水肿,胸胁胀痛,或情志抑郁,食少暖气,或烦躁易怒;舌有瘀斑,脉涩。治疗宜选

A. 活血化瘀法

- B. 凉血止血法
- C. 泻肝降逆法
- D. 泻火止血法
- E. 息风活络法

【答案】A

47、《灵枢·寒热病》曰：“阳气盛则瞋目，阴气盛则瞑目”，指的是

- A. 督脉
- B. 任脉
- C. 阴维脉和阳维脉
- D. 足太阴脾经
- E. 阴跷脉和阳跷脉

【答案】E

48、患者两眦部赤脉粗大鲜红，横贯白睛，视力正常，痒涩刺痛，伴口舌生疮者，宜选下列何方治疗

- A. 补心汤
- B. 驱风一字散
- C. 除风益损汤
- D. 泻心汤合导赤散
- E. 九味羌活汤

【答案】D

49、胎风内障的病因是

- A. 外伤
- B. 先天
- C. 年老
- D. 中毒
- E. 辐射

**【答案】** B

50、哪个项目不是乌风内障诊断必须具备的

- A. 有眼原发病变史
- B. 头痛, 眼胀, 视力下降
- C. 抱轮红赤, 瞳神散大
- D. 眼压明显增高
- E. 房角检查小梁新生血管膜形成, 虹膜周边前粘连, 甚至房角完全闭塞

**【答案】** C

51、暴风客热多因

- A. 风热之邪外袭
- B. 外感疫毒之气
- C. 风热湿邪搏结
- D. 风寒客目

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538031053076006036>