

2024 年云南省泸水市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试内部题库含答案（A 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 以下药物肾毒性从大到小依次为

- A: 新霉素>阿米卡星>庆大霉素>妥布霉素>奈替米星>链霉素
- B: 新霉素>庆大霉素>妥布霉素>阿米卡星>奈替米星>链霉素
- C: 新霉素>奈替米星>阿米卡星>庆大霉素>妥布霉素>链霉素
- D: 新霉素>庆大霉素>阿米卡星>妥布霉素>奈替米星>链霉素

答案：A

2. 患者女 56 岁，诊断为高血压伴快速型心律失常，首选的药物是（）

- A: 螺内酯
- B: 维拉帕米
- C: 美托洛尔
- D: 氯沙坦

答案：C

3. 用于有机磷中毒症状的对抗药物是

- A: 碘解磷定
- B: 阿托品
- C: 毛果芸香碱
- D: 亚甲蓝

答案：B

4. 治疗非心源性栓塞性缺血性脑卒中，宜选用的药物是（）

- A: 氯吡格雷
- B: 依诺肝素钠
- C: 达比加群酯
- D: 尿激酶

答案：A

5. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

- A: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强
- B: 慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至 2~4.5h
- C: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病
- D: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

答案：C

6. 患者，男，50 岁，血压 170 / 95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选择的联合用药方案是

- A: 利尿剂+AR
- B: β 受体阻断剂+ARB
- C: α 受体阻断剂+ACEI
- D: 利尿剂+CCB

答案：D

7. 药师应掌握处方中常用的外文缩写，“每晚”用药的缩写是（）

- A: qid
- B: prn

C: qn

D: qd

答案：C

8. 与左旋多巴合用，可提高疗效的药物是

A: 叶酸

B: 苄丝肼

C: 克拉维酸钾

D: 奥美拉唑

答案：B

9. 中度支气管哮喘的临床表现为

A: 稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉

B: 休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率 >30 次/分，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，常见心率增快 >120 次/分，奇脉， $PaO_2 < 60\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 > 45\text{mmHg}$ ， $SaO_2 > 90\%$ ，pH可降低

C: 不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失

D: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常

答案：A

10. (2018年真题) 患者,女,47岁,出现一侧颜面部骤然发作性闪痛,诊断为三叉神经痛,应选用的药物是 ()

A: 麦角胺咖啡因

B: 山莨菪碱

C: 布洛芬

D: 卡马西平

答案: D

11. 对由于胃肠、肝胆疾病引起的消化酶不足者可选用

A: 胰酶片

B: 甲氧氯普胺

C: 莫沙必利

D: 雷尼替丁

答案: A

12. 需要用 10%酒精或植物油冲洗的是

A: 皮肤污染酚类毒物

B: 毛发被毒物污染

C: 眼内污染毒物

D: 眼内进入固体腐蚀性颗粒

答案: A

13. 具有临床耐受性良好、无戒断效应特点的治疗失眠症药物为 ()

A: 低剂量的多塞平

B: 阿戈美拉汀

C: 艾司唑仑

D: 小剂量米氮平

答案: A

14. 和缓医疗总的原则不包括 ()

A: 不伤害

B: 无痛苦

C: 尊重

D: 有益

答案: B

15. 有一肺炎球菌感染患者，对青霉素过敏，宜选用的有效抗菌药物是

A: 左氧氟沙星

B: 阿米卡星

C: 阿莫西林

D: 多西环素

答案: A

16. 癫痫的药物治疗失神发作首选

A: 拉莫三嗪

B: 卡马西平

C: 丙戊酸钠

D: 苯妥英钠

答案: C

17. 需与脂餐同服，以增加其口服吸收生物利用度的痤疮治疗药是

A: 过氧化苯甲酰

B: 口服短效避孕药

C: 米诺环素

D: 维 A 酸

答案: D

18. 现代临床药物治疗更多依赖于循证医学的支持。循证医学证据分为几种，下列证据级别和推荐强度最高的是

A: 同质随机对照试验的系统评价

B: 大样本病案系列

C: 同质病例对照研究的系统评价

D: 单个大样本随机对照试验

答案: A

19. 在病情危重抢救时最常用的是

A: 口服给药

B: 静脉注射

C: 肌肉注射

D: 直肠给药

答案: B

20. 单核细胞正常值参考范围是

A: 0.20~0.40

B: 0.03~0.08

C: 0~0.01

D: 0.01~0.05

答案: B

21. (2017 年真题) 痛风缓解期宜选用的治疗药物是 ()

A: 阿司匹林

B: 苯溴马隆

C: 泼尼松

D: 秋水仙碱

答案: B

22. 以下药品中，归属妊娠毒性药物 B 级的是

A: 维生素 C

B: 阿莫西林

C: 瑞格列奈

D: 阿米卡星

答案: B

23. 苯二氮

A: 唑吡坦

B: 艾司唑仑

C: 阿戈美拉汀

D: 米氮平

答案: B

24. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存

B: 每次调整 1~4 单位

C: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量

D: 每 3~5 天调整 1 次

答案: A

25. 药师应及时向患者交待有关用药的注意事项，以避免误用药物，减轻患者不必要的恐慌，提高用药依从性。根据患者用药情况，发药时药师应有针对性的提示患者各类药物的应用注意事项。

A: 患者四?

B: 患者三?

C: 患者一?

D: 患者二?

答案: A

26. 缓解视疲劳可选用的药物是()

- A: 酞丁安滴眼液
- B: 色甘酸钠滴眼液
- C: 羟甲基纤维素钠滴眼液
- D: 氧氟沙星滴眼液

答案: C

27. 下列药物中，即使肝功能不全的病人也可使用原剂量的是

- A: 青霉素
- B: 氯霉素
- C: 洋地黄毒苷
- D: 苯妥英钠

答案: A

28. 清晨尿液酸碱度的参考范围为

- A: pH4.5~8.0
- B: pH4.5~6.5
- C: pH4.5~5.5
- D: pH5.5~6.5

答案: D

29. 一般情况下，老年人应该控制总胆固醇测定值低于

- A: 5.1mmol/L
- B: 6.2mmol/L
- C: 6.1mmol/L
- D: 5.2mmol/L

答案: D

30. 患老年高血压并发心力衰竭，宜选用的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 缬沙坦
- C: 非洛地平
- D: 美托洛尔

答案：A

31. 孕妇的急性膀胱炎治疗时间为（）

- A: 5-10 天
- B: 10-15 天
- C: 8-10 天
- D: 3-7 天

答案：D

32. 儿童退热的用药选择和单次用量, 正确的是()

- A: 布洛芬 0.4~0.6g (12 岁以上儿童)
- B: 阿司匹林 30~60mg/kg
- C: 对乙酰氨基酚 25~50mg/kg
- D: 对乙酰氨基酚 10~15mg/kg

答案：D

33. (2021 年真题) 吉法酯片治疗消化性溃疡，正确的用药方法是（）

- A: 餐前 1/小时嚼碎服用
- B: 睡前服用
- C: 清晨空腹整片吞服，并保持上身直立至少 30 分钟
- D: 餐后半小时服用

答案：D

34. 依据药物临床评价的对象和内容判断，对目标适应证患者的治疗作用的初步评价是指

- A: II 期临床试验
- B: III 期临床试验
- C: IV 期临床试验
- D: I 期临床试验

答案：A

35. 非甾体抗炎药的不良反应，可致肝损害，产生黄疸、肝炎

- A: 美洛昔康
- B: 塞来昔布
- C: 保泰松
- D: 布洛芬

答案：C

36. 患者，女，68 岁，既往有高血压，双侧肾动脉狭窄，因水肿复诊。体检和实验室检查：血压 172/96mmHg，尿蛋白>2g/24h(正常值<150mg/24h)，血尿酸 $416\ \mu\text{mol/L}$ (正常值为 $180\sim440\ \mu\text{mol/L}$)，血钾 6.1mmol/L (正常值为 $3.5\sim5.5\text{mmol/L}$)。在已经服用氨氯地平的基础上，应考虑联合应用的抗血压药品是

- A: 螺内酯
- B: 卡托普利
- C: 呋塞米
- D: 依那普利

答案：C

37. 口服避孕药中雌激素对机体代谢的影响，正确的为

- A: 糖耐量异常
- B: 高密度脂蛋白胆固醇降低
- C: 甘油三酯降低
- D: 低密度脂蛋白胆固醇升高

答案：A

38. (2018 年真题) 患者, 男, 58 岁, 体重 68kg, 高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰, 伴发热, 入院查体 BP: 120/80mmHg, T38.9℃。化验结果: 白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 86%。胸片示: 右下肺纹理增粗, 诊断为社区获得性肺炎, 青霉素皮试阳性。

- A: 头孢曲松
- B: 哌拉西林
- C: 阿奇霉素
- D: 头孢他啶

答案：D

39. 血清天门冬氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 成人 <40U/L
- B: 男性 <40U/L
- C: 男性 11~50U/L
- D: 成人 <50U/L

答案：A

40. (2016 年真题) 患者, 男, 67 岁, 因带状疱疹前来就诊, 实验室检查肌酐清除率 100ml/min, 医生处方阿昔洛韦片治疗, 对于该患者, 适宜的用法用量是 ()。

- A: 0.4g, 每日 4 次
- B: 0.4g, 每日 2 次

C: 0.4g, 每日 3 次

D: 0.4g, 每日 5 次

答案: D

41. 抗真菌药

A: 中性粒细胞减少

B: 血红蛋白量增多

C: 血小板减少

D: 嗜酸性粒细胞减少

答案: A

42. 重要器官或系统功能有严重损害、缩短或危及生命，应判为

A: 重度

B: 中度

C: 轻度

D: 弱轻度

答案: A

43. 吗啡的禁用范围是

A: 3 岁以下幼儿

B: 1 岁以下婴儿

C: 新生儿

D: 婴幼儿

答案: B

44. 下面属于消化性溃疡发病机制中胃、十二指肠黏膜的攻击因素的是

A: 非甾体抗炎药

B: 胃黏液

C: 胃黏膜屏障

D: HCO_3^- 的分泌

答案：A

45. 正常情况下，人血白细胞群体中占比例最小的分类细胞是

A: 单核细胞

B: 嗜酸性粒细胞

C: 嗜碱性粒细胞

D: 淋巴细胞

答案：C

46. 心力衰竭治疗中唯一能够控制体液潴留的药物是

A: 利尿药

B: 阿托品

C: β 受体拮抗剂

D: 肾上腺素

答案：A

47. (2016 年真题) 患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是 ()

。

A: 酮康唑软膏

B: 复方苯甲酸软膏

C: 联苯苄唑软膏

D: 氢化可的松软膏

答案：D

48. 因绝经期激素替代治疗应禁用的人群是

A: 6 个月内有静脉血栓栓塞史的患者

- B: 合并轻度高血压的患者
- C: 合并高胆固醇血症的患者
- D: 甲状腺切除后的患者

答案：A

49. 属于容积性泻药的是

- A: 番泻叶
- B: 开塞露
- C: 乳果糖
- D: 硫酸镁

答案：D

50. 医师咨询"他汀类药物合用伊曲康唑或环丙沙星等"，属于

- A: 新药信息
- B: 药物相互作用
- C: 禁忌证
- D: 给药途径

答案：B

51. 患者，男，48 岁。十二指肠溃疡病史 2 年，近感头痛、眩晕而就诊。查体：血压 160/100mmHg。经一段时间观察及定期检查后，医师诊断为高血压病。

- A: 氢氯噻嗪
- B: 可乐定
- C: 利血平
- D: 胍屈嗪

答案：C

52. 患者，女，28 岁，妊娠 6 个月，出现轻度外阴烧灼感、尿痛、尿急，就医后确诊为滴虫性阴道炎合并尿路感染，首选用药方案是

- A: 口服甲硝唑 400mg，每日 2 次，连服 7 日
- B: 咪康唑栓，阴道给药，每晚 1 粒（200mg），连用 7 日
- C: 1：2 服克林霉素 300mg，每日 2 次，连用 7 日
- D: 甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚 1 次. 连用 7 日

答案：A

53. 特布他林平喘的主要机制是

- A: 激动肾上腺素 β_2 受体
- B: 拮抗 M 胆碱受体
- C: 抑制白三烯受体
- D: 阻断腺苷受体

答案：A

54. 醛固酮受体拮抗剂

- A: 阿米洛利
- B: 阿利吉仑
- C: 雷米普利
- D: 依普利酮

答案：D

55. 患者，男，56 岁，诊断为病毒性乙型肝炎。实验室检查：HbeAg（+），HBV-DNA ≥ 20000 IU/ml。ALT200U/L。现需要启动抗病毒治疗，采用干扰素 α 和核苷（酸）类抗病毒药物。

- A: 出现体温升高、肌肉酸痛可服用对乙酰氨基酚
- B: 中性粒细胞计数 $<0.5 \times 10^9$ /L，应停药
- C: 血小板计数 $<100 \times 10^9$ /L，应减量

D: 中性粒细胞计数 $\leq 0.75 \times 10^9/L$ ，应减量

答案：C

56. 有关尿液隐血及尿液白细胞的叙述正确的是

A: 尿液中如混合有 1%以上的血液时，肉眼可以观察到血尿

B: 白细胞尿中多为炎症感染时出现的嗜酸性粒细胞，已发生退行性改变，又称为脓细胞

C: 尿液隐血即反映尿液中的血红蛋白和肌红蛋白，正常人尿液中不能测出

D: 正常人的尿液中不含有白细胞

答案：C

57. 双侧肾动脉狭窄抗高血压药物的禁忌证

A: 美托洛尔

B: 氢氯噻嗪

C: 依那普利

D: 维拉帕米

答案：C

58. 以下所列药物中，推荐用于治疗三叉神经痛的首选处方药是

A: 地西泮

B: 卡马西平

C: 舒马曲坦

D: 苯噻啶

答案：B

59. 流行性结膜炎者宜选用的滴眼液是

A: 维生素 B2

B: 磺胺醋酰钠

C: 碘苷

D: 色甘酸钠

答案: C

60. 食入何种物质对磺胺药、抗痛风药、氢氧化铝、红霉素有影响

A: 脂肪

B: 食醋

C: 食盐

D: 蛋白质

答案: B

61. 下列治疗痤疮的药物中，患者在治疗期间及治疗结束后 1 个月应避免献血的是：

A: 红霉素

B: 异维 A 酸

C: 克林霉素

D: 过氧甲苯酰

答案: B

62. 患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶。

A: 非精原细胞性生殖细胞癌

B: 晚期顽固性卵巢癌

C: 皮脂腺囊肿

D: 晚期顽固性膀胱癌

答案: C

63. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径

- A: 静脉滴注给药
- B: 每个半衰期给药 1 次
- C: 每 2~3 个半衰期给药 1 次
- D: 每日给药 1 次

答案：B

64. 中枢性降压药是

- A: 胍苯哒嗪
- B: 拉贝洛尔
- C: 可乐定
- D: 利血平

答案：C

65. 对衣物或毛发具有氧化漂白作用，应尽量避免接触的痤疮治疗药是

- A: 过氧化苯甲酰
- B: 维 A 酸
- C: 口服短效避孕药
- D: 米诺环素

答案：A

66. 痛风慢性发作期间为促进尿酸排泄可选用

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 苯溴马隆
- D: 泼尼松龙

答案：C

67. 大量长期应用可导致老年人肠道菌群失调或真菌感染并发症的药物是

- A: 抗过敏药
- B: 广谱抗生素
- C: 利尿药
- D: 降糖药

答案：B

68. 癫痫持续状态首选的药物是

- A: 丙戊酸钠
- B: 拉莫三嗪
- C: 地西泮
- D: 卡马西平

答案：C

69. 抗利尿药

- A: 去氨加压素
- B: 甘草合剂
- C: 硝酸甘油
- D: 胃黏膜保护剂

答案：A

70. 可提示隐性黄疸或亚临床性黄疸的是

- A: $>342 \mu\text{mol/L}$
- B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- C: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$
- D: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案：C

71. 可诊断女性高尿酸血症的是

- A: 血尿酸为 $270 \mu\text{mol/L}$
- B: 血尿酸为 $380 \mu\text{mol/L}$
- C: 血尿酸为 $200 \mu\text{mol/L}$
- D: 血尿酸为 $420 \mu\text{mol/L}$

答案: B

72. 分析以下用药错误的事例，属于"认知缺失"的是

- A: 医师非主观意愿的诊断错误、造成误诊误治
- B: 调剂工作过于繁忙
- C: 新手值班以及计算机医嘱系统缺陷
- D: 患者自行选购药品、误用假药、劣药

答案: A

73. 高血压伴低钾血症患者慎用的药物是()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 美托洛尔
- C: 氨氯地平
- D: 依那普利

答案: A

74. (2018 年真题) 婴幼儿腹泻,服用地衣芽孢杆菌活菌制剂,正确的使用方法是 ()

- A: 清晨服用
- B: 用温水调服
- C: 舌下含服
- D: 应同时碱化尿液

答案：B

75. 白细胞分类中，嗜酸性粒细胞参考范围为

A: 50%~70%

B: 3%~8%

C: 1%~5%

D: 20%~40%

答案：C

76. 有关血清丙氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

A: 丙氨酸氨基转移酶只存在于肝脏中

B: 丙氨酸氨基转移酶(ALT)与谷丙转氨酶(GPT)是两个反映肝脏功能的指标

C: 血清丙氨酸氨基转移酶增高的程度与肝细胞被破坏的程度呈正比

D: 丙氨酸氨基转移酶是一组催化氨基酸之间氨基转移反应的酶类

答案：C

77. 患者，男，46岁。胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝、肾功能正常，化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

A: 其神经毒性与剂量大小无关

B: 与氯化钠存在配伍禁忌

C: 遇冷可加重其神经毒性

D: 在葡萄糖溶液中稳定

答案：A

78. 和含铁或钙离子的药物合用后，在胃肠道可以发生络合反应而导致生物利用度降低的药物是

A: 多潘立酮

B: 利福平

C: 左氧氟沙星

D: 丙磺舒

答案: C

79. 糖尿病患者服用后可使血糖降低或升高的药物是

A: 头孢哌酮

B: 培高利特

C: 加替沙星

D: 培氟沙星

答案: C

80. 患者，男，50 岁，血压 170 / 95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是

A: 利尿剂+AR

B: β 受体阻断剂+ARB

C: α 受体阻断剂+ACEI

D: 利尿剂+D-CCB

答案: D

81. 胃食管反流病患者应避免使用的药物是

A: 美托洛尔

B: 阿仑膦酸钠

C: 特拉唑嗪

D: 阿司匹林

答案: B

82. 能使人长时间忍受肌肉等疼痛

- A: 利尿剂
- B: 肽激素类
- C: 麻醉药品
- D: 蛋白同化制剂

答案：C

83. 医师咨询"加替沙星用于糖尿病患者抗感染"，属于

- A: 给药途径
- B: 禁忌证
- C: 新药信息
- D: 药物相互作用

答案：B

84. 李某，男，45岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为 160/100mmHg。

- A: ACEI
- B: AR
- C: β 受体拮抗剂
- D: 利尿药

答案：A

85. 恶性肿瘤

- A: 白细胞增多
- B: 淋巴细胞增多
- C: 血小板增多
- D: 红细胞沉降率减慢

答案：A

86. 血清淀粉酶检查超过正常值

- A: 诊断痛风
- B: 诊断消化性溃疡
- C: 诊断心肌梗死
- D: 诊断急性胰腺炎

答案：D

87. 具有耳毒性、肾毒性的抗结核药是

- A: 链霉素
- B: 利福平
- C: 乙胺丁醇
- D: 异烟肼

答案：A

88. 根据药物对胎儿的危害,美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别,依那普利的妊娠毒性分级是()

- A: D 级
- B: C 级
- C: X 级
- D: A 级

答案：A

89. 一般情况下,以洗胃方式解救毒物中毒为首要措施,洗胃液每次的用量为

- A: 最多不超过 500ml
- B: 最多不超过 300ml
- C: 最多不超过 400ml

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 最多不超过 200ml

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/538042017132007022>