

异常妊娠的诊疗与护理

一、选择题

1.早期流产最常见的病因是 () [单选题] *

A.胚胎染色体异常✓

B.宫颈内口松弛

C.子宫畸形

D.子宫肌瘤

E.母儿血型不合

2.先兆流产最先出现的症状是 () [单选题] *

A.停经

B.阵发性腹痛

C.少量阴道流血✓

D.子宫停止增大

E.妊娠试验由阳性转为阴性

3.下列各种流产的临床特点，正确的是 () [单选题] *

A.完全流产：腹痛，宫口松

B.先兆流产：宫口未开，阴道出血量少于月经量✓

C.难免流产：阴道出血少，未破水

D.不全流产：宫口闭，阴道出血减少

E.稽留流产：胚胎或胎儿在宫内已死亡超过 10 周

4.孕妇,28岁,孕12周,出现阵发性下腹痛,阴道排出一妊娠产物,继而阴道大量出血。妇科检查:宫口已开,有组织堵塞宫口,子宫较停经周数略小。最可能的诊断是() [单选题] *

- A.先兆流产
- B.复发性流产
- C.不全流产✓
- D.难免流产
- E.稽留流产

5.病人,女性,27岁。停经67天,下腹阵痛,阴道出血多于月经量。妇科检查:子宫如孕2个月大小,子宫颈口开大,尿妊娠试验阳性,应考虑为() [单选题] *

- A.先兆流产
- B.难免流产✓
- C.不全流产
- D.完全流产
- E.稽留流产

6.病人,女性,26岁。停经52天,阴道点滴流血2天,伴轻微下腹部阵发性疼痛,尿妊娠试验(+)。查体宫口闭,子宫如孕7周大小,最可能的诊断是() [单选题] *

- A.先兆流产✓
- B.难免流产
- C.不全流产
- D.稽留流产
- E.复发性流产

7.病人,女性,26岁。妊娠10周,今日突然出现阵发性下腹痛,阴道大量流血伴小块组织物排出,血

压 90/60mmHg。该病人可能发生了 () [单选题] *

A.不全流产✓

B.先兆流产

C.习惯性流产

D.完全流产

E.难免流产

8.下列哪种流产处理前应做凝血功能检查 () [单选题] *

A.先兆流产

B.复发性流产

C.不全流产

D.难免流产

E.稽留流产✓

9.病人，女性，27岁，妊娠45天后出现阴道流血伴阵发性腹痛。妇科检查妊娠产物已部分排出体外，尚有部分残留于宫内。此时应采取以下哪项处理措施 () [单选题] *

A.卧床休息

B.立即行清宫手术✓

C.不须特殊处理

D.做凝血功能检查

E.行子宫内口缝扎术

10. 关于复发性流产的护理措施，错误的是 () [单选题] *

A.妊娠确诊后应该卧床休息，禁止性生活

B.在下次妊娠前尽可能查明流产的原因

C.黄体功能不足者，给黄体酮治疗

D.治疗期必须达到以往发生流产的妊娠月份✓

E.如宫颈内口松弛者可在妊娠 14~18 周时行子宫内口缝扎术

11.先兆流产的处理原则是（ ）[单选题] *

A.及时促使胎儿和胎盘排出

B.卧床休息，减少刺激✓

C.行吸宫术或钳刮术

D.一般无须特殊处理

E.以预防为主

12.病人，女性，29 岁。平素月经规律，停经 42 天，诊断为早孕。阴道出血 1 天，量少许，腹部轻微

疼痛，妊娠试验（+）。下列措施中不妥的是（ ）[单选题] *

A.己烯雌酚 5~10mg 口服✓

B.安静卧床休息

C.维生素 E 口服

D.密切观察阴道出血

E.禁止性生活

13.早产是指（ ）[单选题] *

A.妊娠满 24 周不满 32 周

B.妊娠满 28 周不满 32 周

C.妊娠满 28 周不满 37 周✓

D.妊娠满 32 周不满 37 周

E.妊娠满 37 周不满 42 周

14.早产儿出生体重多低于() [单选题] *

- A. 1000g
- B. 1500g
- C. 2000g
- D. 2500g✓
- E. 3 000g

15.下列因素中最易引发早产的是() [单选题] *

- A.轻度贫血
- B.骨盆狭窄
- C.子宫畸形✓
- D.羊水偏少
- E.慢性乙肝

16.孕妇，孕 35 周，宫缩规律，间隔 5~6 分钟，每次持续约 40 秒，查宫颈管消退 80%，宫口扩张 3cm。应诊断为() [单选题] *

- A.先兆临产
- B.早产临产✓
- C.假临产
- D.足月临产
- E.生理性宫缩

17.病人，女性，28 岁。妊娠 32 周出现少量阴道流血，以往曾有 3 次早产史。主要的处理原则是()

[单选题] *

- A.抑制宫缩，促进胎儿肺成熟✓

- B.左侧卧位
- C.迅速结束分娩
- D.等待自然分娩
- E.给氧

18.关于早产的护理措施，错误的是（ ）[单选题] *

- A.鼓励产妇下床活动✓
- B.慎做肛门和阴道检查
- C.遵医嘱使用抑制宫缩的药物
- D.教会产妇自己数胎动
- E.做好早产儿保暖和复苏的准备

19.妊娠满 28 周不足 37 周孕妇，出现下列哪种情况不能作为判断早产的依据（ ）[单选题] *

- A.宫颈管缩短 $\geq 75\%$
- B.羊水量超过 2000ml✓
- C.宫颈管完全消失
- D.出现规律性宫缩
- E.宫口扩张大于 2cm

20.妊娠期高血压疾病的基本病理变化是（ ）[单选题] *

- A.脑血管痉挛
- B.胎盘血管痉挛
- C.肾小血管痉挛
- D.冠状动脉痉挛
- E.全身小动脉痉挛✓

21.病人，女性，38岁。妊娠30周，自觉头痛、眼花1天。检查发现：血压160/110mmHg，胎心、胎位正常，双下肢水肿，尿蛋白>0.5g/24h。入院后诊断为子痫前期。病人出现以上症状的原因是（ ）[单选题] *

A.全身小动脉痉挛✓

B.水钠潴留

C.静脉淤血

D.动脉硬化

E.心功能不全

22.孕妇，29岁，孕36周，因抽搐数次急诊入院。查体：眼球固定，瞳孔散大，牙关紧闭，双手紧握，血压170/120mmHg。应考虑为（ ）[单选题] *

A.子痫前期

B.子痫✓

C.癫痫

D.妊娠水肿

E.妊娠合并高血压

23.妊娠期高血压疾病使用硫酸镁解痉时，应停用药物的指征是（ ）[单选题] *

A.尿量700ml/24h

B.呼吸18次/min

C.膝反射消失✓

D.血压130/90mmHg

E.自觉症状减轻

24.使用硫酸镁治疗妊娠期高血压疾病时要注意（ ）[单选题] *

- A.使用前应测体温、脉搏
- B.尿量每日>360ml，每小时>15ml
- C.呼吸每分钟不少于16次✓
- D.膝腱反射增强提示中毒
- E.严格控制滴注速度，以2g/h为宜

25.某孕妇，足月临产，先兆子痫，轻微头痛，血压为149/90mmHg，尿蛋白(++)，呼吸、脉搏正常，宫缩好：治疗药物应选择() [单选题] *

- A.冬眠合剂
- B.硫酸镁✓
- C.安定
- D.葡萄糖酸钙
- E.低分子右旋糖酐

26.某孕妇，28岁，孕34周，因“头晕、头痛”就诊。查体：血压160/115mmHg。实验室检查：水肿(+)，尿蛋白定量5.5g/24h。临床诊断为重度子痫前期。首选的解痉药物是() [单选题] *

- A.安定
- B.阿托品
- C.硫酸镁✓
- D.冬眠合剂
- E.卡托普利

27.硫酸镁中毒时最先出现的反应是() [单选题] *

- A.膝反射消失✓
- B.肌张力减退

C.呼吸抑制

D.尿量减少

E.心脏停搏

28.病人，女性，35岁。因妊娠期高血压疾病入院，入院后给予硫酸镁治疗。在治疗过程中病人出现膝反射消失，呼吸减慢，每分钟10次。此时应立即给予（ ）[单选题] *

A.5%葡萄糖静脉滴注

B.肌注山莨菪碱

C.静推50%葡萄糖

D.静推10%葡萄糖酸钙✓

E.低分子右旋糖酐静脉滴注

29.孕83周孕妇，因先兆子痫入院。目前病人轻微头痛，血压140/90mmHg，尿蛋白(++)，呼吸、脉搏正常。在应用硫酸镁治疗过程中，护士应报告医师停药的情况是（ ）[单选题] *

A.呼吸18次/min

B.膝反射消失✓

C.头痛缓解

D.血压130/90mmHg

E.尿量800ml/24h

30.妊娠期高血压疾病病人发生抽搐时，首要的护理措施是（ ）[单选题] *

A.使病人取头低侧卧位，保持呼吸道通畅✓

B.加床挡，防止坠床

C.密切观察生命体征

D.用舌钳固定舌头，防止舌头咬伤

E.置病人于安静、暗光的单人病室

31.孕妇，25岁，孕38周。因头晕、眼花、恶心、呕吐12小时入院。查体：BP 160/110mmHg，下肢水肿，尿蛋白2g/h.考虑该病人为（ ）[单选题] *

A.子痫前期✓

B.子痫

C.癫痫

D.妊娠水肿

E.妊娠合并高血压

32.孕妇，25岁，孕38周。因头晕、眼花、恶心、呕吐12小时入院。查体：BP 160/110mmHg，下肢水肿，尿蛋白2g/h.首选的药物是（ ）[单选题] *

A.冬眠合剂

B.硫酸镁✓

C.安定

D.葡萄糖酸钙

E.低分子右旋糖酐

33.针对该病人的护理措施，错误的是（ ）[单选题] *

A.保持病室安静，避免各种刺激

B.监测胎心、胎动的变化

C.以5g/h的速度滴注硫酸镁✓

D.协助产妇取左侧卧位

E.观察硫酸镁的毒性反应

34.病人，女性，35岁，孕34周。突然出现全身抽搐，持续约1分钟，家人即将其送往医院。查体：

血压 150/100mmHg，胎头先露，胎心率 132 次/min。医嘱使用硫酸镁，下列说法错误的是（ ）[单选题]

*

- A.该药能控制子痫的发作
- B.24 小时用量不得超过 10g✓
- C.尿量小于 25ml/h，呼吸不足 16 次/min 时停止使用
- D.发现中毒现象用葡萄糖酸钙缓慢推注
- E.中毒的首要表现是腱反射消失

35.针对该孕妇的护理措施，错误的是（ ）[单选题] *

- A.孕妇一旦再次发生抽搐，应尽快控制
- B.密切关注生命体征
- C.专人护理，防止受伤
- D.病室光线宜亮，方便观察病情✓
- E.为终止妊娠做好准备

36.初产妇，24 岁。孕 36 周。近 1 周来水肿加重，并有头痛。查体：BP 160/120mmHg。实验室检查：水肿（++），尿蛋白（+++）。护理该孕妇时，应特别注意的是（ ）[单选题] *

- A.严格限制食盐摄入
- B.平卧休息
- C.服用镇静剂
- D.不能服用降压药物
- E.使用硫酸镁时有无中毒现象✓

37.某孕妇，26 岁。因重度子痫前期应用硫酸镁治疗，发生中毒现象。除应停用硫酸镁外，还应立即使用（ ）[单选题] *

- A.肌肉注射山莨菪碱
- B.静脉滴注 50%葡萄糖
- C.静脉滴注低分子右旋糖酐
- D.静脉滴注 5%的葡萄糖
- E.静脉缓慢推注 10%葡萄糖酸钙✓

38.异位妊娠最多见于 () [单选题] *

- A.卵巢
- B.腹腔
- C.输卵管✓
- D.子宫颈
- E.大网膜

39.下列哪项是异位妊娠最主要的原因 () [单选题] *

- A.输卵管发育不良
- B.子宫内膜异位症
- C.放置宫内节育器
- D.输卵管炎✓
- E.精神因素

40.输卵管妊娠病人前来就诊时，最常见的主诉是 () [单选题] *

- A.腹痛✓
- B.胸痛
- C.咳嗽
- D.咯血

E.呼吸急促

41.关于输卵管妊娠的结局，下列哪项正确（ ）[单选题] *

A.输卵管妊娠流产多见于峡部妊娠

B.输卵管妊娠完全流产一般出血较多

C.输卵管妊娠破裂多见于壶腹部妊娠

D.输卵管妊娠不完全流产可导致反复出血✓

E.输卵管妊娠破裂多发生在妊娠 8 周左右

42.病人，女性，28 岁。停经 45 天，阴道少量流血 1 天。晨 5 时突发下腹剧痛，伴恶心、呕吐及一过性晕厥。面色苍白，血压 70/50mmHg，脉搏 120 次/min。妇科检查：阴道畅，有少量血液，宫颈举痛明显，后穹窿触痛（+）。入院后初步诊断为输卵管妊娠。此时最有价值的辅助检查方法是（ ）[单选题] *

A.腹部 B 超

B.血 hCG

C.阴道后穹窿穿刺✓

D.腹腔镜检查

E.输卵管造影

43、病人，女性，28 岁，停经 50 天，1 天前出现少量阴道出血，2 小时前突感下腹剧痛，伴肛门坠胀感，晕厥一次。入院查体：面色苍白，血压 70/50mmHg，脉搏 120 次/min,下腹明显压痛，反跳痛。妇科检查见阴道后穹窿饱满，有宫颈抬举痛，子宫略大稍软。该病人最可能的诊断是（ ）[单选题] *

A.前置胎盘

B.异位妊娠✓

C.难免流产

D.先兆流产

E.急性盆腔炎

44.病人，女性，28岁，停经50天，1天前出现少量阴道出血，2小时前突感下腹剧痛，伴肛门坠胀感，晕厥一次。入院查体：面色苍白，血压70/50mmHg，脉搏120次/min，下腹明显压痛，反跳痛。妇科检查见阴道后穹窿饱满，有宫颈抬举痛，子宫略大稍软。该病人目前存在的主要护理问题是（ ）[单选题] *

A.体液不足✓

B.恐惧

C.焦虑

D.知识缺乏

E.疼痛

45.病人，女性，28岁，停经50天，1天前出现少量阴道出血，2小时前突感下腹剧痛，伴肛门坠胀感，晕厥一次。入院查体：面色苍白，血压70/50mmHg，脉搏120次/min，下腹明显压痛，反跳痛。妇科检查见阴道后穹窿饱满，有宫颈抬举痛，子宫略大稍软。针对该病人的护理措施，错误的是（ ）[单选题] *

A.取半卧位✓

B.保暖，给氧

C.密切监测生命体征

D.迅速开放静脉通路

E.做好腹部手术前准备

46.病人，女性，24岁。已婚，平素月经周期规律现停经45天，阴道少量出血伴左下腹部隐痛1天来诊。B超提示左侧宫旁见低声区并探及胚芽。诊断“左侧输卵管妊娠”采用甲氨蝶呤治疗。病人在治疗期间提示病情发展的指征是（ ）[单选题] *

A.腹痛加剧✓

B.腹泻

C.食欲减退

D.脱发

E.药物性皮炎

47.胎盘早剥的主要病理变化是 () [单选题] *

A.底蜕膜出血✓

B.小动脉痉挛

C.羊水栓塞

D.凝血功能障碍

E.急性肾衰竭

48.关于重型胎盘早剥的临床表现，错误的是 () [单选题] *

A.子宫硬如板状，有压痛

B.以外出血为主✓

C.突然发生持续性腹痛

D.腹痛程度与胎盘后积血多少呈正相关

E.子宫比妊娠周数大

49.病人，女性，30岁，孕3产0。此次妊娠38周后突感剧烈腹痛伴有少量阴道流血。检查：血压170/120mmHg，子宫似足月妊娠大小，硬如板状，有压痛，胎心90次/min，胎位不清。最大的可能是

() [单选题] *

A.子痫

B.胎膜早破

C.前置胎盘

D.胎盘早剥✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538053142054006033>