

全科医学住院医师：外科（题库版）

1、单选 脓液有甜腥臭味的是（）。

- A. 大肠杆菌
- B. 拟杆菌
- C. 绿脓杆菌
- D. 溶血性链球菌
- E. 金黄色葡萄球菌

正确答案：C

2、填空题 （）为诊断直肠的最主要的方法。

正确答案：直肠指检

3（江南博哥）、多选 造成腹股沟疝修补术后复发的因素包括（）。

- A. 结扎疝囊不够高位
- B. 用可吸收线做修补腹股沟管的缝合
- C. 术后发生血肿、切口感染
- D. 慢性便秘
- E. 慢性咳嗽

正确答案：A, B, C, D, E

参考解析：腹股沟疝修补术后复发的因素包括局部手术缝合欠佳、愈合不良、术后腹压增加（慢性咳嗽、慢性便秘等）。

4、单选 乳腺癌患者其乳腺包块大小约 5cm×5cm，病理诊断为：浸润性导管癌，查淋巴结见转移癌（8/20），肺部 X 线检查发现转移灶。此病变为哪一期（）。

- A. 0 期
- B. I 期
- C. II 期
- D. III 期
- E. IV 期

正确答案：E

5、填空题 外科病人营养补给常用方法有（）和（）。

正确答案：要素饮食（TEN）；完全胃肠道外营养（TPN）

6、填空题 腹部损伤可分为（）和（）两类。

正确答案：闭合性损伤；开放性损伤

7、单选 患者，女，9 岁，右足底被铁锈钉刺伤 1 周，突然出现张口困难，继之出现苦笑面容，角弓反张，声响及触碰病人可诱发上述症状，病人神志清楚，不发热。 该病属于（）。

- A. 毒血症
- B. 菌血症
- C. 败血症

- D. 脓血症
- E. 脓毒血症

正确答案：A

8、单选 脓液量多，淡红色，稀薄的是（）。

- A. 大肠杆菌
- B. 拟杆菌
- C. 绿脓杆菌
- D. 溶血性链球菌
- E. 金黄色葡萄球菌

正确答案：D

9、单选 男性，45岁。左腰部胀痛、少尿伴恶心呕吐7天入院。既往有排石史。查体：右肾区压、叩痛（+）。血清肌酐 $1050\text{g}\mu\text{mol/L}$ ，血钾 5.9mmol/L ，尿常规红细胞充满/HP，白细胞 $2\sim 3/\text{HP}$ 。B超检查：发现左肾为孤立肾，伴肾盂积水及左输尿管上段扩张。尿路X线平片：肠道积气重，左输尿管中段可疑结石。患者情况好转后，下一步的治疗不考虑（）。

- A. 输尿管切开取石
- B. 经皮肾穿刺造瘘引流尿液
- C. 输尿管逆行插管引流尿液
- D. 输尿管镜下碎石
- E. 体外冲击波碎石

正确答案：E

10、单选 男性，46岁，左下肢酸胀沉重，小腿出现“蚯蚓状”团块4年。查体：血压 $17.2/12.0\text{kPa}$ （ $130/90\text{mmHg}$ ），右下肢正常，左小腿可见明显的静脉曲张，内踝处皮肤增厚，有色素沉着。Trendelenburg I 式试验和 II 式试验均阳性，Pratt 试验阳性。应考虑的诊断是（）。

- A. 大隐静脉瓣膜功能不全
- B. 小隐静脉瓣膜功能不全
- C. 大隐静脉瓣膜功能不全及深浅静脉间交通支瓣膜功能不全
- D. 深静脉瓣膜功能不全
- E. 深、浅静脉间交通支瓣膜功能不全

正确答案：C

11、单选 女，17岁。颈部被刀割伤。查体：颈部横切口，可闻及呼吸声，呼吸困难，皮下可触及捻发音。对此患者重要的急诊处理是（）。

- A. 止血
- B. 缝合伤口，引流
- C. 吻合神经
- D. 局部填塞
- E. 清理呼吸道，保持呼吸道通畅

正确答案：E

12、填空题 痔在齿线以上称为（），在齿线以下称为（）。

正确答案：内痔；外痔

13、填空题 乳房疾病常见的种类有（）、（）、（）、（）和其他。

正确答案：炎症；肿瘤；乳腺增生；畸形

14、单选 男性病人，75岁，突发左下肢冷、痛、麻木8小时。有心房纤维颤动史。体检：左小腿中下1/3以下皮温明显降低，足部发绀，患肢无肿胀。双侧股动脉搏动可扪及，左侧腘动脉、足背动脉、胫后动脉搏动均消失，右腘动脉、足背和胫后动脉搏动好。请初步判断该患者的病变平面（）。

- A. 足背动脉
- B. 股动脉
- C. 腹主动脉
- D. 腘动脉
- E. 胫前动脉

正确答案：D

15、单选?男，53岁，肝硬化腹腔积液，近1周有发热，腹胀，稍有呼吸困难，腹腔积液较前有所增长，心率96次/分，应用利尿药治疗2天后出现沉默寡言，性格改变。

合适的诊断是（）。

- A. 肝性脑病
- B. 脑血管意外
- C. 脑炎
- D. 尿毒症
- E. 糖尿病昏迷

正确答案：A

16、单选 男性，42岁。B超发现左肾结石1cm大小，平时无明显症状，偶有腰部酸胀不适感。既往体健，无排石史。该患者还需要做的检查是（）。

- A. 尿培养
- B. 膀胱镜检查
- C. MRI
- D. KUB+IVU
- E. 尿流率检查

正确答案：D

17、单选 男，32岁。于1年前出现尿频，尿急，尿痛，症状反复，抗感染治疗效果不明显，近2个月出现脓尿及终末肉眼血尿，膀胱刺激症状加重，伴有恶心，发热，左侧腰部胀痛。其初步诊断首先应考虑（）。

- A. 泌尿系统肿瘤
- B. 泌尿系统结核

- C. 慢性前列腺炎急性发作
- D. 左侧上尿路结石伴感染
- E. 慢性肾盂肾炎
- F. 慢性间质性膀胱炎

正确答案：B

18、填空题 发生绞窄性肠梗阻的原因为（）、（）、（）等。

正确答案：肠系膜血管受压；血栓形成；栓塞

19、单选 男，25岁。因高位小肠瘘1天入院，入院后经颈内静脉插管滴入肠外营养液，两周后突然出现寒战、高热，无咳嗽、咳痰，腹部无压痛和反跳痛。观察8小时如果仍然有高热，应采取的措施是（）。

- A. 肠外营养液中增加胰岛素
- B. 雾化吸入
- C. 胸腔穿刺抽气
- D. 拔除中心静脉导管
- E. 咽拭子细菌培养

正确答案：D

20、填空题 乳腺检查时，手指掌面应平放于乳房上扪触，不得（）。

正确答案：用手指抓捏

21、单选 患者，女，17岁，发热5天伴纳差2天急诊。检查：血压114/70mmHg，左脚趾甲沟部红肿破溃。血白细胞计数为 $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞为85%。经处理3天后病人体温升高，且血压和血小板计数下降，此时病人可能合并有（）。

- A. 丹毒
- B. DIC
- C. 感染性休克
- D. 多器官衰竭
- E. 菌血症

正确答案：E

22、单选 男性，70岁。排尿困难2年。腹部平片提示膀胱区有2.0cm椭圆形致密影。患者典型的临床症状是（）。

- A. 膀胱刺激症状
- B. 进行性排尿困难
- C. 血尿
- D. 腰痛、血尿、脓尿
- E. 尿流中断，改变体位后好转

正确答案：E

23、多选 肛提肌上部脓肿包括（）。

- A. 肛周脓肿

- B. 坐骨直肠窝脓肿
- C. 骨盆直肠脓肿
- D. 直肠后窝脓肿
- E. 高位肌间脓肿

正确答案：C, D, E

参考解析：肛周脓肿及坐骨直肠窝脓肿位于肛提肌下部，余位于肛提肌上。

24、单选 女，32岁，主诉右乳胀痛，与月经周期有关，检查乳房有多个结节状肿块，边界不清，可推动，诊断首先考虑（）。

- A. 乳腺癌
- B. 乳房纤维腺瘤
- C. 乳房囊性增生病
- D. 乳管内乳头状瘤
- E. 乳房肉瘤

正确答案：C

参考解析：几种常见的乳房肿块的鉴别：

①纤维腺瘤 20~25岁多见，病程缓慢，无疼痛，单发肿块，边界清，活动度良好，无转移，无脓肿。

②乳房囊性增生 20~40岁多见，病程缓慢，周期性疼痛，多数成串，边界不清，活动度良好，无转移，无脓肿。

③乳管内乳头状瘤 40~50岁多见，病程缓慢，无疼痛，单发肿块，边界清，活动度良好，无转移，无脓肿。

④乳癌 40~60岁多见，病程快，无疼痛，单发肿块，边界不清，活动度不良，局部淋巴结肿大，无脓肿。

⑤肉瘤 40~50岁多见，病程快，无疼痛，单发肿块，边界清，活动度良好。

25、单选 患者，男，70岁，体重60kg，全胃切除术后5天，大量肠液自腹腔引流管引出，左上腹疼痛。查体：左上腹轻压痛，无肌紧张。首选的治疗措施是（）。

- A. 急症手术
- B. 肠外营养
- C. 要素饮食
- D. 普通饮食
- E. 输血

正确答案：B

26、单选 患者，女，9岁，右足底被铁锈钉刺伤1周，突然出现张口困难，继之出现苦笑面容，角弓反张，声响及触碰病人可诱发上述症状，病人神志清楚，不发热。对机体威胁最大的是（）。

- A. 肌肉断裂
- B. 骨折

- C. 尿潴留
- D. 持续的呼吸肌痉挛
- E. 营养障碍

正确答案：D

27、填空题 肝外胆管结石的手术原则是：（）、（）和（）。

正确答案：取尽结石；去除感染病灶；通畅引流

28、单选 男性，58岁。尿频，进行性排尿困难伴夜尿增多3年，尿流中断半年。下腹X线平片及B超检查：可见膀胱区2枚大小分别为3.5cm×2.5cm×2.5cm和2.5cm×2.0cm×2.0cm结石，上尿路未见异常改变。膀胱结石的常见原因是（）。

- A. 膀胱炎
 - B. 前列腺增生
 - C. 膀胱颈硬化
 - D. 神经源性膀胱
 - E. 前列腺癌
- 正确答案：**B

29、单选 肛周脓肿（）。

- A. 不凝的血性液体
 - B. 黄绿色透明液体，无臭味
 - C. 稀脓性液体，略带臭味
 - D. 淡黄色透明液体
 - E. 黄绿色稠厚液体，带有粪便样特殊臭味
- 下列疾病的穿刺液分别是以上哪种液体

正确答案：C

30、单选 脾破裂（）。

- A. 不凝的血性液体
 - B. 黄绿色透明液体，无臭味
 - C. 稀脓性液体，略带臭味
 - D. 淡黄色透明液体
 - E. 黄绿色稠厚液体，带有粪便样特殊臭味
- 下列疾病的穿刺液分别是以上哪种液体

正确答案：A

31、单选 男，32岁。于1年前出现尿频，尿急，尿痛，症状反复，抗感染治疗效果不明显，近2个月出现脓尿及终末肉眼血尿，膀胱刺激症状加重，伴有恶心，发热，左侧腰部胀痛。尿沉渣查到抗酸杆菌，静脉肾盂造影提示右肾功能正常，右肾无积水，左肾集合系统破坏严重，左输尿管多处狭窄、扩张，膀胱容量正常。患者明确诊断为右肾结核，目前首要的第一步治疗是（）。

- A. 抗结核治疗
- B. 左肾造口术

- C. 右肾切除术
- D. 右肾切除，左肾造口术
- E. 膀胱扩大术
- F. 右肾部分切除术

正确答案：A

32、单选 女，32岁，乳腺癌切除术后激素治疗宜选用（）。

- A. 卵泡刺激素
- B. 促肾上腺皮质激素
- C. 地塞米松
- D. 己烯雌酚
- E. 双侧卵巢切除术

正确答案：E

参考解析：年轻女性乳腺癌的激素治疗宜首选卵巢切除术。

33、填空题 性乳腺炎手术治疗要求切口应（）乳房后脓肿可（）。

正确答案：沿乳管方向呈放射状；沿乳房下缘作弧形切口

34、单选 患者，女性，42岁。半年前因突发呕新鲜血1800ml，住院治疗。并确诊为门脉高压症，保守治疗好转后出院。本次因大量呕血再次住院，经三腔二囊管压迫止血等综合治疗6天，出血停止24小时后，拔除三腔二囊管，又发大出血。出血停止后，拔除三腔二囊管，又发大出血的最可能原因是（）。

- A. 拔管时胃体黏膜撕裂
- B. 急性胃黏膜病变
- C. 并发胆道出血
- D. 十二指肠溃疡出血
- E. 应激性溃疡

正确答案：A

35、单选 治疗高渗性脱水理想的液体是（）。

- A. 5%碳酸氢钠液
- B. 10%葡萄糖液
- C. 0.9%氯化钠液
- D. 0.45%氯化钠液
- E. 平衡盐溶液

正确答案：D

参考解析：高渗性脱水治疗时以补水为主，补钠为辅，可静脉滴注5%的葡萄糖溶液或低渗的0.45%的氯化钠溶液。

36、单选 女，50岁，因患短肠综合征，予全胃肠外营养（TPN）治疗。应用一周时病人出现昏迷，但尿内无酮体。病人既往曾有空腹血糖高（11mmol/L）。

此病的发病机制是由于（）。

- A. 内源性胰岛素分泌不足

- B. 等渗性脱水
- C. 输液导管细菌滋生
- D. 肝功能损害
- E. 肾功能损害

正确答案：A

37、填空题 小肠损伤手术缝合时应采用（）缝合，以防修补后发生（）。

正确答案：间断横向缝合；肠腔狭窄

38、单选 男，27岁。反复尿频，尿急，尿痛伴终末肉眼血尿2年，大量使用抗生素治疗效果欠佳，且逐渐加重，尿常规检查：白细胞++，红细胞+++。现排尿超过30次/日。还可以行什么检查以帮助明确诊断（）。

- A. 肾功能检查
- B. 膀胱功能检查
- C. 泌尿系统CT检查
- D. 泌尿系统血管造影检查
- E. 前列腺液常规检查

正确答案：C

39、单选 男性，32岁，既往健康，有烟酒嗜好。1年前发现左上肢“红线”，伴肿硬，压痛。5个月前感觉右下肢凉、怕冷，麻木，行走200米出现小腿疼痛。近1个月症状加重，出现夜间疼痛。查体：右下肢发绀，皮温凉，右股动脉弹性好，足背胫后动脉搏动未触及。诊断应考虑为（）。

- A. 右下肢血栓性浅静脉炎
- B. 下肢静脉曲张
- C. 动脉硬化闭塞症
- D. 血栓闭塞性脉管炎
- E. 下肢深静脉血栓

正确答案：D

参考解析：患者1年前发现左上肢“红线”，伴肿硬、压痛，是血栓性浅静脉炎的表现，而目前出现间歇性跛行。

40、填空题 甲状腺术后饮水呛咳是因为（）。

正确答案：喉上神经损伤

41、填空题 Whipple三联征是（）、（）、（）。

正确答案：阵发性低血糖；发作时血糖低于2.8mmol/L；口服或静脉给葡萄糖后缓解

42、单选 女性，48岁，发现右乳内上象限肿物1周。检查：局部可及2cm大小肿物，表面皮肤凹陷，肿物质硬，表面不光滑，活动。右腋下可及1cm大淋巴结，质较硬，既往患者有肺结核病史。最可能的诊断（）。

- A. 乳腺癌
- B. 乳腺纤维瘤

- C. 乳房结核
- D. 乳腺囊性增生病
- E. 乳腺内乳头状瘤

正确答案：A

参考解析：乳腺肿物引起表面皮肤凹陷是由于肿瘤侵犯 Cooper 韧带，同时右腋下可及质硬、肿大淋巴结，考虑为乳腺癌。

43、填空题 胰岛素瘤是来源于（）的一种罕见肿瘤。

正确答案：胰岛 B 细胞

44、填空题 空腔器官破裂的临床表现主要为（）。

正确答案：腹膜炎征候群

45、单选 男，32 岁。于 1 年前出现尿频，尿急，尿痛，症状反复，抗感染治疗效果不明显，近 2 个月出现脓尿及终末肉眼血尿，膀胱刺激症状加重，伴有恶心，发热，左侧腰部胀痛。为明确诊断，还应行何种检查（）。

- A. 静脉肾盂造影检查
- B. 泌尿系统 B 超
- C. 泌尿系统血管造影
- D. 逆行肾盂造影
- E. 膀胱镜检查

正确答案：A

46、多选 老年男性，65 岁，既往有胆囊结石病史，因上腹痛 4 小时由家属送诊，查体：意识淡漠，血压 90/50mmHg，右上腹部肌紧张。可能采取的手术方式为（）。

- A. 胆囊切除
- B. 胃穿孔修补
- C. 肠切除吻合
- D. 胆管切开取石、T 管引流
- E. 胰腺切除
- F. 胰、十二指肠切除

正确答案：A, D

47、单选 女，50 岁，因患短肠综合征，予全胃肠外营养（TPN）治疗。应用一周时病人出现昏迷，但尿内无酮体。病人既往曾有空腹血糖高（11mmol/L）。此病的预防主要是（）。

- A. 开始一周内注意葡萄糖输注的浓度、速度和与胰岛素的比例
- B. 加强保肝
- C. 加强导管护理、无菌操作
- D. 纠正水和电解质紊乱，预防酸中毒发生
- E. 保护肾功能

正确答案：A

48、单选 高位单纯性直瘻宜采用（）。

- A. 肛瘻切开术
- B. 肛瘻挂线疗法
- C. 肛瘻外口扩大术
- D. 药物保留灌肠治疗
- E. 肛瘻部分切开+肛瘻挂线术

正确答案：B

49、单选 无痛性便血，便后肛门部脱出樱桃状肿物（）。

- A. 内痔
- B. 外痔
- C. 肛裂
- D. 直肠息肉
- E. 直肠癌

正确答案：D

参考解析：蹄铁型肛瘻指肛管左右侧均有外口，宜切开外口至两侧管道相通处，再用挂线疗法。4. 便后肛门部肿物疼痛明显，一般为外痔引起。及活组织检查（punchbiopsy）确诊。

50、单选 男性，45岁。左腰部胀痛、少尿伴恶心呕吐7天入院。既往有排石史。查体：右肾区压、叩痛（+）。血清肌酐 1050 μ mol/L，血钾 5.9mmol/L，尿常规红细胞充满/HP，白细胞 2~3/HP。B超检查：发现左肾为孤立肾，伴肾盂积水及左输尿管上段扩张。尿路X线平片：肠道积气重，左输尿管中段可疑结石。为明确诊断，还需要做的检查是（）。

- A. 同位素肾图
- B. 输尿管镜检查
- C. MRI
- D. KUB+IVU
- E. CT

正确答案：E

51、单选 便后肛门部肿物，疼痛明显者为（）。

- A. 内痔
- B. 外痔
- C. 肛裂
- D. 直肠息肉
- E. 直肠癌

正确答案：B

参考解析：蹄铁型肛瘻指肛管左右侧均有外口，宜切开外口至两侧管道相通处，再用挂线疗法。4. 便后肛门部肿物疼痛明显，一般为外痔引起。及活组织检查（punchbiopsy）确诊。

52、填空题 引起机械性肠梗阻的原因有（）、（）、（）。

正确答案：肠腔堵塞；肠管受压；肠壁病变

53、单选 患者，女性，65岁，洗澡时发现右乳外上近乳头处有一肿物。既往体健。查体：右乳外上近乳头处2cm×1.5cm质硬肿物，肿物局部皮肤稍凹陷，无压痛，边界尚清，腋窝未触及明显肿大淋巴结。针吸病理证实为：浸润性导管癌。目前最恰当的术式是（）。

- A. 乳房单纯切除术
- B. 肿块局部切除术
- C. 乳腺癌根治术
- D. 乳腺区段切除+腋窝淋巴结清扫术
- E. 乳腺癌改良根治术

正确答案：E

参考解析：患者诊断已经明确为乳腺癌，目前没有远处转移，应该行根治性手术治疗。

54、单选 男，32岁。于1年前出现尿频，尿急，尿痛，症状反复，抗感染治疗效果不明显，近2个月出现脓尿及终末肉眼血尿，膀胱刺激症状加重，伴有恶心，发热，左侧腰部胀痛。该患者的下一步治疗措施是（）。

- A. 抗结核治疗1周后行左肾切除术，并继续抗结核治疗
- B. 抗结核治疗1周后行左肾、输尿管全切除术，并继续抗结核治疗
- C. 抗结核治疗2周后行左肾、输尿管全切除术，不再抗结核治疗
- D. 抗结核治疗2周后行左肾、输尿管全切除术，并继续抗结核治疗
- E. 抗结核治疗2周后行左肾切除术，并继续抗结核治疗
- F. 抗结核治疗4周后行左肾切除术

正确答案：D

55、填空题 腹膜炎的结局与患者全身和腹膜局部的（）有关；亦决定于（）的性质、数量和时间。

正确答案：中心静脉；周围静脉

56、单选 男，70岁，上唇一个毛囊尖处出现红肿、疼痛的结节，中央部有灰黄色小脓栓形成，错误的处置是（）。

- A. 休息
- B. 外敷鱼石脂膏
- C. 挤出脓栓，以利引流
- D. 应用抗生素
- E. 湿热敷

正确答案：C

参考解析：面部危险三角区的疖，因挤压结肿可能引起化脓性海绵状静脉窦炎，导致生命危险。故应避免挤压。

57、单选 有关痈处理方法错误的是（）。

- A. 中央部坏死组织多，全身症状重者，应手术治疗
- B. 切口应超出炎症范围
- C. 切开至皮肤全层
- D. 尽量剪除坏死组织
- E. 唇痈不宜切开

正确答案：C

参考解析：痈是多个相邻的毛囊及其所属皮脂腺或汗腺的急性化脓性感染，或由多个疖融合而成。治疗方法：应充分休息，加强营养，使用镇静剂，合理选用敏感的抗菌药物。如有糖尿病，应给予恰当治疗。全身症状不重和初期红肿阶段，局部治疗与疖相同。如红肿范围大、中央部坏死组织多，或全身症状重，应及时做手术治疗，但唇痈不宜采用。一般用“+”、“++”或“川”形切口。切口应超出炎症范围少许，深达筋膜，尽量剪除坏死组织，亦有直接做痈切除术者，伤口以纱布或碘仿纱填塞。每日换药，并充分引流，如创面过大，待肉芽组织健康时，可考虑植皮。

58、单选 脓液恶臭。普通细菌培养阴性的是（）。

- A. 大肠杆菌
- B. 拟杆菌
- C. 绿脓杆菌
- D. 溶血性链球菌
- E. 金黄色葡萄球菌

正确答案：B

59、多选 为杀灭一切包括芽胞在内的细胞可采用（）。

- A. 高压蒸汽灭菌法
- B. 紫外线照射法
- C. 煮沸法
- D. 酒精浸泡法
- E. 火烧法

正确答案：A, C, E

60、多选 直肠癌确诊过程中的3“P”检查包括（）。

- A. 直肠指诊
- B. 直肠镜检查
- C. 结肠镜检查
- D. 钡灌肠造影
- E. 活组织检查

正确答案：A, B, E

参考解析：直肠癌确诊顺序 包括直肠指诊初诊（pal-pation）、直肠镜检查（proctoscopy）

61、多选 肛裂的治疗包括（）。

- A. 局部止血
- B. 彻底引流创面
- C. 软化大便
- D. 消除肛门括约肌痉挛
- E. 以上都是

正确答案：B, C, D

参考解析：肛裂治疗首先应软化大便，彻底引流创面，解除括约肌痉挛，中断恶性循环，促使溃疡创面愈合。

62、单选 女，25岁。尿频，尿急，尿痛5个月，常规抗生素抗感染治疗效果较差，目前每次尿量少。考虑诊断最大可能性是（）。

- A. 慢性膀胱尿道炎
- B. 慢性肾盂肾炎
- C. 肾结核
- D. 膀胱结石
- E. 膀胱肿瘤

正确答案：C

63、单选 蹄铁型肛瘘的治疗宜采用（）。

- A. 肛瘘切开术
- B. 肛瘘挂线疗法
- C. 肛瘘外口扩大术
- D. 药物保留灌肠治疗
- E. 肛瘘部分切开+肛瘘挂线术

正确答案：E

64、填空题 Charcot 三联征包括（）、（）、（）。

正确答案：腹痛；黄疸；畏寒发热

65、单选 代谢性碱中毒时不应补给氯化钾的情况是（）。

- A. 尿量钾含量减少
- B. 尿量低于 30ml/h
- C. 尿量超过 60ml/h
- D. 尿呈酸性
- E. 尿呈碱性

正确答案：B

参考解析：代谢性碱中毒时几乎都伴发低钾血症，但补钾应在尿量超过 40ml/h 后进行。

66、填空题 肠内营养给予的方式有：按时分次给予、（）、（）。

正确答案：间隙重力滴注；连续输注

67、单选 女，38岁，左乳外上象限可及3cm×2cm肿块，与周围皮肤有粘连，左腋窝可及1cm大淋巴结、活动，未触及远处淋巴结，临床活检为左乳癌。TNM分期应为（）。

- A. T1N1M3
- B. T2N1M0
- C. T2N2M2
- D. BN1M0
- E. T3N2M0

正确答案：B

参考解析：肿瘤直径2~5cm为T2；同侧可及肿大淋巴结，活动，为N₁；无远处转移为M0。因此，该病人的TNM分期为T2N1M0。

68、单选 巴德-吉利亚综合征引起（）。

- A. 门静脉高压症的主要阻塞部位在窦前
- B. 门静脉高压症的主要阻塞部位在窦后
- C. 门静脉高压症的主要阻塞部位在窦后和肝窦
- D. 门静脉高压症的主要阻塞部位在肝前
- E. 门静脉高压症的主要阻塞部位在肝后

正确答案：E

参考解析：门脉高压症分为肝前型、肝内型和肝后型三类。在肝内型又分为窦前阻塞、肝窦和窦后阻塞两种。

69、单选 患者，女性，38岁，右侧血性乳头溢液，右侧乳晕区1点钟位近乳头处可触及小肿物，约黄豆大小，伴压痛，质中，界限不清，压迫时可见乳头溢出血性液体，最可能的诊断是（）。

- A. 乳腺导管内增生
- B. 乳腺导管内乳头状瘤
- C. 乳腺囊性增生症
- D. Paget病
- E. 乳腺脓肿

正确答案：B

参考解析：乳腺导管内乳头状瘤可见于任何年龄的妇女，约75%的病例发生于大乳管近乳头的膨大部分。查体时部分病人可以在乳头附近扪到较小的质软肿块，轻压可以从乳头流出血性液体。而乳腺增生症包括导管内增生和囊性增生的溢液多为黄色或黄绿色溢液。Paget病为一种特殊类型的乳腺癌，多表现为乳头部位的慢性湿疹，乳头乳晕区的糜烂、脱屑等，血性溢液少见。乳腺脓肿多见于哺乳期妇女，且有红肿热痛等炎症表现。

70、单选 大面积烧伤创面感染最常见的细菌（）。

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 溶血性链球菌

- C. 大肠杆菌
- D. 绿脓杆菌

E. 变形杆菌

正确答案：D

参考解析：绿脓杆菌是一种广泛存在于自然界的条件致病菌，耐药性强。当大面积烧伤后机体全身及烧伤局部抵抗力下降，易致绿脓杆菌在烧伤创面繁殖感染。

71、填空题 急性继发性腹膜炎的主要临床表现有（）、（）、（）和（）全身症状。

正确答案：腹痛；恶心；呕吐；腹部体征

72、单选 虽易引起败血症，但一般不发生转移性脓肿（）。

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 变形杆菌

正确答案：B

73、单选 男性，58岁。尿频，进行性排尿困难伴夜尿增多3年，尿流中断半年。下腹X线平片及B超检查：可见膀胱区2枚大小分别为3.5cm×2.5cm×2.5cm和2.5cm×2.0cm×2.0cm结石，上尿路未见异常改变。查尿常规白细胞满视野，应采取（）。

- A. 先留置导尿管，控制感染后再膀胱切开取石+前列腺摘除
- B. 立即膀胱切开取石
- C. 膀胱镜碎石
- D. 先留置导尿管抗感染后，再碎石
- E. 非手术治疗

正确答案：A

74、填空题 阑尾炎的病因是（）、（）。

正确答案：阑尾腔阻塞；细菌入侵

75、单选 下列不应预防性应用抗生素的手术是（）。

- A. 甲状腺癌根治手术
- B. 腹外疝修补术
- C. 门静脉高压症，分流术
- D. 结肠癌根治术
- E. 主动脉瘤切除血管移植术

正确答案：B

参考解析：疝修补术是无菌手术，且创面小，时间短，故可不用预防应用抗生素。而可能污染的手术及根治术等则需要术前预防性应用抗生素。

76、单选 女，25岁。尿频，尿急，尿痛5个月，常规抗生素抗感染治疗效果较差，目前每次尿量少。为早期确诊，以下哪项检查是不必要的（）。

- A. 尿沉渣查抗酸杆菌
- B. IVU 检查
- C. 尿常规检查
- D. 膀胱镜检查
- E. 尿细菌培养

正确答案：D

77、单选 男性，32 岁。右肾绞痛后尿闭 1 天。腹部平片可见双侧输尿管中段各有结石一枚，约 1cm 大小，左肾内还有鹿角形结石。急诊处理应先采用（）。

- A. 服中药排石
- B. 中西医结合解痉排石
- C. 膀胱镜下输尿管插管引流尿液
- D. 应用利尿药物
- E. 立即手术输尿管切开取石

正确答案：C

78、单选 结肠破裂修补术后 5 天，病人血钠 136.0mmol/L，血钾 6.8mmol/L，血 pH 值 7.3，近 24 小时尿量 520ml，应诊断为（）。

- A. 低渗性脱水
- B. 高渗性脱水
- C. 低钾血症
- D. 高钾血症
- E. 低钾合并等渗性脱水

正确答案：D

参考解析：血钾超过 5.5mmol/L 即可诊断为高钾血症。

79、填空题 十二指肠损伤手术探查的典型表现为（）、（）、（）。

正确答案：腹膜后血肿；胆汁染色；捻发音

80、单选 常伴有转移性脓肿（）。

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 变形杆菌

正确答案：A

参考解析：绿脓杆菌是一种广泛存在于自然界的条件致病菌，耐药性强。当大面积烧伤后机体全身及烧伤局部抵抗力下降，易致绿脓杆菌在烧伤创面繁殖感染。

81、多选 伤口放置引流物的适应证包括（）。

- A. 脓肿或积液部位切开后

- B. 感染较重、止血不彻底的创面
- C. 肝切除术后
- D. 脾切除术后
- E. 胆道术后

正确答案：A, B, C, E

82、单选 血栓闭塞性脉管炎（ ）。

- A. Trendelenberg 试验（+）
- B. Perthes 试验（+）
- C. Pratt 试验（+）
- D. Buerger 试验（+）
- E. Trendelenberg 试验（-）

正确答案：D

83、单选 男性，35 岁。间歇性右下腹绞痛 3 天，尿常规：红细胞充满/HP，白细胞 2~3/HP，腹部 X 线平片：可见右输尿管下段走行区高密度阴影 0.6cm，IVU 检查：可见右输尿管下段结石，其上段输尿管轻度扩张，右肾轻度积水。患者采取中西药等治疗后绞痛解除，但突然出现尿流中断及排尿终末痛，其原因是（ ）。

- A. 急性前列腺炎
- B. 结石在输尿管壁间段
- C. 结石到膀胱
- D. 结石到尿道
- E. 急性尿道炎

正确答案：C

84、填空题 急性乳腺炎乳汁瘀积的主要原因是（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。

正确答案：乳头发育不良；婴儿吸食过少；乳头皲裂；乳管不通

85、填空题 直肠下端有数个纵形皱襞称为（ ）。

正确答案：肛柱

86、单选 男性，45 岁。左腰部胀痛、少尿伴恶心呕吐 7 天入院。既往有排石史。查体：右肾区压、叩痛（+）。血清肌酐 1050 μ mol/L，血钾 5.9mmol/L，尿常规红细胞充满/HP，白细胞 2~3/HP。B 超检查：发现左肾为孤立肾，伴肾盂积水及左输尿管上段扩张。尿路 X 线平片：肠道积气重，左输尿管中段可疑结石。检查发现左输尿管中段结石，大小 0.8cm 根据患者目前情况，治疗首先应采取（ ）。

- A. 输尿管切开取石
- B. 经皮肾穿刺造瘘引流尿液
- C. 输尿管逆行插管引流尿液
- D. 血液透析
- E. 体外冲击波碎石

正确答案：D

87、单选 男，27岁。反复尿频，尿急，尿痛伴终末肉眼血尿2年，大量使用抗生素治疗效果欠佳，且逐渐加重，尿常规检查：白细胞++，红细胞+++。现排尿超过30次/日。为明确诊断，首先应行何种检查（）。

- A. 膀胱镜检查
- B. 前列腺肛门指检
- C. 泌尿系统平片
- D. 静脉肾盂造影
- E. 逆行肾盂造影

正确答案：D

88、单选 脓液稠厚，有恶臭或粪臭（）。

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 变形杆菌

正确答案：E

参考解析：绿脓杆菌是一种广泛存在于自然界的条件致病菌，耐药性强。当大面积烧伤后机体全身及烧伤局部抵抗力下降，易致绿脓杆菌在烧伤创面繁殖感染。

89、填空题 腹膜炎治愈后，腹腔内多有不同程度的（），可发生（）肠梗阻。

正确答案：粘连；粘连性

90、单选 男，52岁，车祸致骨盆骨折，脾破裂，脾切除术后胃瘫，给予静脉输入25%葡萄糖400ml和其他液体，术后10天患者出现皮肤、巩膜黄染，并进行性加重，化验血糖20.3mmol/L。出现黄疸的最可能的原因是（）。

- A. 复合伤导致肝功能失代偿
- B. 糖代谢紊乱导致肝功能损害
- C. 电解质紊乱导致肝功能损害
- D. 药物中毒导致肝功能损害
- E. 输血所致血管内溶血

正确答案：B

参考解析：本题无明确输血史可以排除E，无应用其他损害肝功能药物史，排除D，黄疸出现在伤后10天，故排除A，虽提示有胃瘫，但没有电解质紊乱，排除C，本题提示有输入25%高浓度葡萄糖史，且化验血糖升高，故出现肝损害最可能的原因是血糖超负荷引起肝脂肪变性、黄疸。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538070074140006070>