

## 中医眼科学试题及答案

1、患者,女,58岁,视物模糊,晶体混浊,头晕耳鸣,腰膝酸软,舌红少苔,脉细。宜选下列何方治疗

- A. 杞菊地黄丸
- B. 驱风一字散
- C. 除风益损汤
- D. 泻心汤
- E. 九味羌活汤

【答案】A

2、青风内障早期视野缺损主要表现为

- A. 管状视野
- B. 旁中心暗点
- C. 环形暗点
- D. 扇形视野缺损
- E. 向心性缩小

【答案】B

3、患者屈光间质浑浊明显,内眼检查宜首选

- A. 荧光素眼底血管造影
- B. 视觉电生理
- C. X线检查

D. 眼 B 超

E. OCT

**【答案】D**

4、视瞻昏渺中的中心性浆液性视网膜脉络膜病变发生在

A. 周边视网膜

B. 视乳头

C. 黄斑部及其附近视网膜

D. 脉络膜

E. 玻璃体

**【答案】C**

5、消风散适用的白睛疾病是

A. 时复病

B. 暴风客热

C. 天行赤眼

D. 金疳

E. 火疳

**【答案】A**

6、治疗近视心气不足者, 首选方剂为

A. 补阳还五汤

- B. 肾气丸
- C. 定志丸
- D. 济生肾气丸
- E. 附子理中丸

**【答案】** C

7、撞击伤目的常见病因为

- A. 球类. 棍棒. 拳头. 砖头. 石块. 皮带等钝器击伤
- B. 细小昆虫飞扑入目
- C. 金属碎屑. 玻璃细渣. 谷壳. 麦芒等溅入眼内
- D. 刀. 剪. 锥. 针. 钉. 铁丝. 木签等锐器刺破眼珠
- E. 使用紫外线灭菌灯. 太阳灯. 高能光源等防护不当

**【答案】** A

8、因眼与肺气有着密切的关系, 故《灵枢·决气》中说:气脱者 ( )

- A. 目不明
- B. 络不畅
- C. 血不行
- D. 肠不通
- E. 水不利

**【答案】** A

9、患者眼眶微痛,畏光,不耐久视,兼神疲体倦,心烦少寐,宜采用下列何方加减治疗

- A. 右归丸
- B. 八珍汤
- C. 四物汤
- D. 白薇丸
- E. 当归补血汤

**【答案】** E

10、湿翳的角膜刮片常可找到

- A. 病毒
- B. 细菌
- C. 阿米巴
- D. 衣原体
- E. 真菌

**【答案】** E

11、下列哪项不是视瞻昏渺的病机

- A. 湿热内蕴,湿浊上蒸目窍
- B. 久病伤阴,阴虚燥热,虚火上炎,灼伤目中血络
- C. 情志内伤,肝失调达,气机不畅,壅遏目窍
- D. 肝肾两亏,精血不足,目失所养

E. 脾失健运, 水湿上泛于目

【答案】B

12、患者, 女, 59 岁, 视物昏花, 晶体混浊, 精神倦怠, 肢体乏力, 面色萎黄, 食少便溏, 舌淡苔白, 脉缓或细弱。选何方为宜

A. 除风益损汤

B. 千金托里散

C. 驱风散热饮子

D. 补中益气汤

E. 竹叶泄经汤

【答案】D

13、患者发病急, 瞳神紧小, 目赤痛, 视物昏蒙, 神水混浊, 黄仁纹理不清, 头重胸闷, 肢节肿痛, 舌红苔黄腻, 脉濡数, 应选用的方剂是

A. 龙胆泻肝汤加减

B. 新制柴连汤加减

C. 抑阳酒连散加减

D. 三仁汤加减

E. 甘露饮加减

【答案】C

14、胞生痰核的治疗原则以 ( ) 为主

A. 疏风清热

B. 解毒散邪

C. 温化水湿

D. 活血化瘀

E. 化痰散结

**【答案】** E

15、治疗白睛病首当

A. 祛风清热, 表里双解

B. 宣通肺气, 复其治节

C. 清热泻火, 兼以疏风

D. 疏风解表, 兼以清热,

E. 清热解毒, 化湿祛邪

**【答案】** B

16、散瞳合剂的组成是

A. 阿托品. 托品酰胺. 肾上腺素

B. 阿托品. 可卡因. 新福林

C. 阿托品. 可卡因. 肾上腺素

D. 后阿托品. 可卡因. 肾上腺素

E. 阿托品. 托品酰胺. 可卡因

**【答案】** C

17、患眼起病急骤, 眼胀, 头痛如劈. 连及目眶, 视力急降或仅存光感。检查眼部可见白睛混赤肿胀, 黑睛混浊呈雾状, 前房极浅或几近消失, 瞳神散大, 呈淡绿色, 眼硬如石。全身兼见恶心呕吐, 口苦口干, 尿黄便结, 舌红苔黄, 脉弦数。宜选下列何方治疗

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 将军定痛丸
- C. 绿风羚羊饮
- D. 温胆汤
- E. 驱风散热饮子

**【答案】** C

18、患者 65 岁, 双眼晶状体囊膜表面有胆固醇结晶, 前房加深, 晶状体核下沉。诊断为皮质性白内障

- A. 初发期
- B. 膨胀期
- C. 成熟期
- D. 过熟期
- E. 以上都不是

**【答案】** D

19、宿翳相当于西医学之

- A. 病毒性角膜炎
- B. 细菌性角膜炎

- C. 真菌性角膜炎
- D. 角膜瘢痕
- E. 角膜基质炎

【答案】D

20、病久未愈,赤时轻时重,视物不清;黑睛后色素性附着物,黄仁不荣,瞳神不圆;伴头晕耳鸣,腰膝酸软;舌红少苔,脉细。宜选用

- A. 金匱肾气丸
- B. 知柏地黄丸
- C. 杞菊地黄丸
- D. 加減驻景丸
- E. 以上都不是

【答案】C

21、患者胞睑漫肿灼热,色紫黯黑,疼痛剧烈,伴面红气粗,舌红绛,苔黄,脉洪数,属下列哪种证型( )

- A. 风毒束险
- B. 热毒壅盛
- C. 热入营血
- D. 正虚邪留
- E. 以上都不是

【答案】C



22、《诸病源候论·目病诸候》“谓眼本无异,瞳子黑白分明,直不见物耳”指的是  
( )病

- A. 青盲
- B. 视瞻昏渺
- C. 聚星障
- D. 云雾移睛
- E. 暴盲

**【答案】** A

23、《眼科金镜》“盖因病后热留经络,壅闭玄府,精华不能上升荣养之故”,是对( )  
病因病机的描述

- A. 小儿青盲
- B. 暴盲
- C. 视瞻昏渺
- D. 云雾移睛
- E. 圆翳内障

**【答案】** A

24、治疗惊震内障的原则是

- A. 视功能正常时可定期检查观察,若视功能损伤严重应手术治疗,术后配合弱视训练
- B. 及时手术治疗
- C. 防止紫外线照射

D. 晶珠破损, 继发绿风内障, 应及时手术治疗

E. 继发绿风内障时可点用抗生素类和糖皮质激素类眼药水

【答案】D

25、眼前有黑影飘浮, 视物昏蒙, 视膏呈尘状絮状混浊, 兼见头重胸闷, 口苦心烦, 舌红苔黄腻, 脉濡数, 宜用

A. 知柏地黄丸

B. 龙胆泻肝汤

C. 三仁汤

D. 六君子汤

E. 丹栀逍遥散

【答案】C

26、消风散适用的白睛疾病是

A. 时复病

B. 暴风客热

C. 天行赤眼

D. 金疳

E. 火疳

【答案】A

27、患者 8 岁, 针眼红肿痛, 灼热疼痛, 白睛红赤肿胀嵌于睑裂, 舌红苔黄, 脉数, 宜采用下列何方加减治疗

- A. 银翘散
- B. 仙方活命饮
- C. 黄连解毒汤
- D. 普济消毒饮
- E. 以上都不是

**【答案】** B

28、眼之能够明视万物, 辨别颜色, 是赖

- A. 肾精充养
- B. 脾气温养
- C. 肝气条达
- D. 肝血升运
- E. 五脏六腑精气的滋养

**【答案】** E

29、患儿内眦部白睛暴露少, 似有“对眼儿”, 经下列哪项检查可排除内斜视

- A. 眼压正常
- B. 眼球转动不受限制
- C. 角膜映光正位
- D. 双眼视力对称
- E. 以上都不是

**【答案】C**

30、患者视近清楚,视远模糊,外眼检查未见异常,眼底或可见视网膜呈豹纹状改变,伴面色无华,神疲乏力,舌质淡,苔薄白,脉细弱。其证候为

- A. 气血不足
- B. 气滞血瘀
- C. 风热外袭
- D. 心阳不足
- E. 肝肾不足

**【答案】A**

31、眼内容物包括

- A. 房水. 玻璃体
- B. 房水. 晶状体. 视网膜
- C. 房水. 晶状体. 玻璃体
- D. 晶状体. 玻璃体. 脉络膜
- E. 房水. 晶状体

**【答案】C**

32、盘状角膜炎是由下列哪种病原微生物感染所致

- A. 绿脓杆菌
- B. 单纯疱疹病毒
- C. 沙眼衣原体

- D. 丝状真菌
- E. 以上都不是

**【答案】** B

33、治疗凝脂翳属里热炽盛证的主方是

- A. 银翘散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 四顺清凉饮子
- D. 大承气汤
- E. 新制柴连汤

**【答案】** C

34、五风内障的治疗以保存视功能为主要目的,首先要注意控制病人的

- A. 情绪
- B. 饮食
- C. 血压
- D. 眼压
- E. 出血

**【答案】** D

35、《眼科金镜》“盖因病后热留经络,壅闭玄府,精华不能上升荣养之故”,是对()病因病机的描述

- A. 小儿青盲

- B. 暴盲
- C. 视瞻昏渺
- D. 云雾移睛
- E. 圆翳内障

**【答案】** A

36、首次明确地提出了生食五辛. 夜读细书等眼病十九种病因的是

- A. 《外合秘要》
- B. 《备急千金要方》
- C. 《伤寒杂病论》
- D. 《诸病源候论》
- E. 《龙树眼论》

**【答案】** B

**【解析】**

37、患者视力渐降, 日久失明, 视盘色苍白, 面色无华, 唇甲色淡, 神疲乏力, 心悸气短; 舌淡苔薄白, 脉细无力。下列哪一方剂适用

- A. 四物五子丸
- B. 逍遥散
- C. 归脾汤
- D. 八珍汤
- E. 明目地黄汤

【答案】D

38、撞击伤目的常见病因为

- A. 球类. 棍棒. 拳头. 砖头. 石块. 皮带等钝器击伤
- B. 细小昆虫飞扑入目
- C. 金属碎屑. 玻璃细渣. 谷壳. 麦芒等溅入眼内
- D. 刀. 剪. 锥. 针. 钉. 铁丝. 木签等锐器刺破眼珠
- E. 使用紫外线灭菌灯. 太阳灯. 高能光源等防护不当

【答案】A

39、眼科常用的辛凉解表药有

- A. 桑叶. 菊花. 柴胡. 薄荷. 蝉蜕
- B. 荆芥. 防风. 白芷. 羌活. 细辛
- C. 金银花. 野菊花. 连翘. 大青叶. 板蓝根
- D. 夏枯草. 决明子. 青葙子. 密蒙花. 木贼草
- E. 生地. 丹皮. 赤芍. 黄芩. 黄柏

【答案】C

40、麦粒肿脓肿成熟, 脓头位于眼睑皮肤面者, 治疗应

- A. 切开排脓, 切口应与睑缘平行, 以免损伤眼轮匝肌
- B. 切开排脓, 切口应与睑缘垂直, 以免损伤提上睑肌
- C. 切开排脓, 充分挤压以使脓液完全排出

D. 切开排脓, 并于创口内注入 30%黄连液

E. 以上各项均可

**【答案】** A

41、高血压性视网膜病变的体征中, 下列哪项不是

A. 渗出

B. 棉絮斑

C. 出血

D. 视网膜水肿

E. 视网膜骨细胞样色素沉着

**【答案】** E

42、狭义的内障专指

A. 绿风内障

B. 青风内障

C. 圆翳内障

D. 高风内障

E. 黑风内障

**【答案】** C

43、患者, 女, 59 岁, 视物昏花, 晶体混浊, 精神倦怠, 肢体乏力, 面色萎黄, 食少便溏, 舌淡苔白, 脉缓或细弱。选何方为宜

A. 除风益损汤



- B. 千金托里散
- C. 驱风散热饮子
- D. 补中益气汤
- E. 竹叶泄经汤

**【答案】** D

44、近视是眼在调节松弛状态下,平行光线经眼的屈光系统的折射后焦点落在

- A. 视网膜周边部
- B. 视网膜黄斑区
- C. 视网膜之后
- D. 视网膜之前
- E. 视盘正中

**【答案】** D

45、脓漏眼相当于西医学的眼病是

- A. 真菌性角膜炎
- B. 病毒性结膜炎
- C. 细菌性结膜炎
- D. 化脓性角膜炎
- E. 超急性细菌性结膜炎

**【答案】** E

46、根据五轮学说,白睛属于

- A. 血轮
- B. 火轮
- C. 气轮
- D. 水轮
- E. 肉轮

**【答案】**C

47、下列哪种疾病属于眼外观无异常而致视物昏蒙的

- A. 聚星障
- B. 鸮眼凝睛
- C. 风赤疮痍
- D. 白涩症
- E. 视瞻昏渺

**【答案】**E

48、患者,女,58岁,眼前突然出现阴影,头目胀痛,眩晕耳鸣,急躁易怒,腰膝酸软,失眠健忘,舌质红,苔薄黄,脉弦数。宜选用何方

- A. 通窍活血汤
- B. 逍遥散
- C. 归脾汤
- D. 四物五子丸

E. 明目地黄汤

【答案】A

49、患者,女,58岁,眼前突然出现阴影,头目胀痛,眩晕耳鸣,急躁易怒,腰膝酸软,失眠健忘,舌质红,苔薄黄,脉弦数。宜选用何方

A. 通窍活血汤

B. 逍遥散

C. 归脾汤

D. 四物五子丸

E. 明目地黄汤

【答案】A

50、患者真睛破损,伤眼剧痛,视力剧降,头痛如裂,胞睑瘀血肿胀,白睛混赤,神水混浊,晶珠破损混浊。下列哪一方剂适用

A. 驱风散热饮子

B. 除风益损汤

C. 五味消毒饮

D. 退热散和五味消毒饮

E. 补中益气汤

【答案】D

51、两眦在五轮中称为

A. 火轮

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538122027075006036>