

2023 年江苏省成考（专升本）大学医学综合考试原题

一、单选题

1、具有横突肋凹的椎骨是（）

- (A) 骶骨
- (B) 尾骨
- (C) 胸椎
- (D) 颈椎
- (E) 腰椎

2、关于术后早期活动，不正确的选项为（）

- (A) 延缓切口愈合
- (B) 减少下肢静脉血栓形成
- (C) 减少肺部并发症
- (D) 改善血液循环
- (E) 减少腹胀及尿潴留

3、位于额中回后部的中枢是【】

- (A) 视区
- (B) 书写中枢
- (C) 听区
- (D) 运动性语言中枢
- (E) 感觉性语言中枢

4、有助于鉴别肾前性和肾后性急性肾衰竭的检查是（）

- (A) 肾穿刺活检
- (B) 血常规

(C)血尿素氮和肌酐

(D)磁共振水成像

(E)每小时尿量

5、患者血气分析报告：pH7.24，PaCO₂76mmHg，PaO₂55mmHg，HCO₃⁻ 32mmol/L，BE4.5mmol/L。应判定为()

(A)失代偿性代谢性酸中毒

(B)失代偿性呼吸性碱中毒

(C)代偿性呼吸性酸中毒

(D)失代偿性呼吸性酸中毒

6、男，18岁。因急性阑尾炎穿孔行阑尾切除术。术后3天切口红肿，有脓性分泌物，将缝线拆除后引出20ml脓液，10天后再次缝合而愈合。该患者切口愈合类型为()

(A)III/丙

(B)III/乙

(C)II/丙

(D)II/乙

7、腭扁桃体所在的位置是()

(A)鼻咽侧壁

(B)喉咽侧壁

(C)口咽侧壁

(D)喉前庭侧壁

8、不受动眼神经支配的眼肌是()

(A)下直肌

(B)上睑提肌

(C)上直肌

(D)内直肌

(E)外直肌

9、易出现奇脉的病症是（）

(A)急性渗出性心包炎

(B)多发性大动脉炎

(C)低血容量性休克

(D)左心衰竭

(E)动脉导管未闭

10、下列属于胸主动脉分支的是【】

(A)头臂干

(B)肺动脉

(C)冠状动脉

(D)肋间后动脉

(E)椎动脉

11、舌前 2/3 味觉障碍伴泪腺分泌障碍，可能损伤的神经是（）

(A)动眼神经

(B)面神经

(C)三叉神经

(D)上颌神经

(E)舌下神经

12、包被于肾实质表面的结构是【】

(A)肾筋膜

- (B) 肾纤维囊
- (C) 肾脂肪囊
- (D) 肾周围脂肪
- (E) 脏腹膜

13、腹部移动性浊音不正确的检查方法是 ()

- (A) 变换体位后继续原方向叩诊
- (B) 叩诊音变浊音后改变体位
- (C) 自腹中部沿脐水平面叩诊
- (D) 变换体位时板指不应移动
- (E) 受检者首先需采取平卧位

14、能作屈、伸、收、展和旋转运动的关节是【】

- (A) 距小腿关节
- (B) 肘关节
- (C) 桡腕关节
- (D) 膝关节
- (E) 肩关节

15、下列不属于急性上消化道出血临床表现的是 ()

- (A) 上腹部压痛阳性
- (B) 柏油便
- (C) 呕吐咖啡样物质
- (D) 听诊肠鸣音活跃
- (E) 可出现头晕、心悸

16、正常人平静呼气末胸膜腔内承受的压力是【】

- (A) 大气压—非弹性阻力
- (B) 大气压—弹性阻力
- (C) 大气压—肺回缩压
- (D) 大气压+表面张力
- (E) 大气压+肺回缩压

17、大量胸腔积液的典型体征是【】

- (A) 病变侧呼吸动度加大
- (B) 病变侧叩诊实音
- (C) 气管偏向患侧
- (D) 病变部位可闻及啰音
- (E) 语音共振增强

18、右锁骨中线与右肋弓交点稍下方的是【】

- (A) 胆囊管的体表投影
- (B) 胆囊颈的体表投影
- (C) 胆囊底的体表投影
- (D) 胆囊体的体表投影
- (E) 幽门的体表投影

19、输血应遵循的原则是()

- (A) 受血者红细胞不被供血者血清凝集
- (B) 供血者和受血者的凝集素含量应相等
- (C) 受血者红细胞不发生叠连
- (D) 供血者红细胞不被受血者血清凝集

20、卵巢动脉的起始部位是（）

- (A) 髂内动脉
- (B) 腹主动脉
- (C) 髂外动脉
- (D) 子宫动脉
- (E) 肾动脉

21、运动时产热量最大的器官是 ()

- (A) 皮肤
- (B) 骨骼肌
- (C) 心脏
- (D) 肝脏
- (E) 大脑

22、支配小腿后群肌的神经是 【】

- (A) 胫神经
- (B) 股神经
- (C) 腓浅神经
- (D) 闭孔神经
- (E) 腓深神经

23、根据烧伤早期补液的原则，第一个 8 小时内，应该输入第一天总液体量的 【】

- (A) 1 / 6
- (B) 1 / 3
- (C) 1 / 4
- (D) 1 / 5
- (E) 1 / 2

24、有关测量血压的叙述，正确的选项是【】

- (A) 听诊器胸件置于袖袋下
- (B) 血压计置于肘关节水平
- (C) 袖袋充气至日常血压水平放气
- (D) 取两次测得血压的高值
- (E) 检查前需休息 5 分钟以上

25、某心悸患者查体所见：脉率 89 次/分，心率 113 次/分，心律绝对不齐。最可能的诊断是（）

- (A) 房性期前收缩
- (B) 室上性心动过速
- (C) 心房颤动
- (D) 心室颤动
- (E) 室性期前收缩

26、幽门梗阻的患者，因长期呕吐常易发生的异常变化是【】

- (A) 高钾高氯性酸中毒
- (B) 低钾高氯性碱中毒
- (C) 高钾高氯性碱中毒
- (D) 高钾低氯性碱中毒
- (E) 低钾低氯性碱中毒

27、女，65 岁。因持续性心前区疼痛 5 小时就诊。心电图示：V1~V5 导联 ST 段呈弓背向上抬高与 T 波形成单向曲线，异常 Q 波形成。最可能的诊断是【】

- (A) 不稳定型心绞痛
- (B) 急性心肌梗死

- (C) 急性心肌炎
- (D) 急性肺栓塞
- (E) 急性心包炎

28、胆囊窝位于肝下面“H”形沟的部位是 ()

- (A) 右纵沟后部
- (B) 右纵沟前部
- (C) 左纵沟前部
- (D) 左纵沟后部
- (E) 横沟

29、某胸痛患者的心电图示：II、III、aVF 导联 ST 段抬高，T 波倒置，病理 Q 波形成。

最可能的诊断是 ()

- (A) 肥厚型梗阻性心肌病
- (B) 急性心包炎
- (C) 急性心肌梗死
- (D) 变异型心绞痛
- (E) 急性肺栓塞

30、两侧同时收缩，使脊柱后伸的肌是 ()

- (A) 背阔肌
- (B) 竖脊肌
- (C) 胸大肌
- (D) 斜方肌
- (E) 腹直肌

31、预激综合征的心电图表现是 ()

- (A)PR 间期正常，QRS 增宽，肢体导联 QRS 呈 S 型
- (B)PR 间期缩短，QRS 增宽，QRS 起始部 delta 波
- (C)PR 间期正常，QRS 增宽，V5R 增宽、顶峰粗钝
- (D)PR 间期正常，QRS 增宽，VV2 导联 QRS 呈 M 型
- (E)P 与 QRS 无关，QRS 增宽，房与室保持各自节律

32、关于外科感染，叙述不正确的是（）

- (A)疔是指一个毛囊及其皮脂腺的化脓性感染
- (B)急性蜂窝织炎是皮下、筋膜下蜂窝组织的化脓性感染
- (C)脓性指头炎是指手指末节掌面皮下组织的化脓性感染
- (D)痈是指多个不同部位散在的毛囊及其皮脂腺的化脓性感染
- (E)甲沟炎是指甲沟及其周围组织的急性感染

33、符合诊断急性呼吸窘迫综合征指标的是（）

- (A) $PaO_2/FiO_2 \leq 200\text{mmHg}$
- (B)一般吸氧治疗无效
- (C)胸片显示有广泛点、片状阴影
- (D)双肺可闻及湿啰音
- (E)呼吸频率逐渐加快

34、不含消化酶的消化液是()

- (A)胰液
- (B)胃液
- (C)胆汁
- (D)肠液

35、需长期肠外营养支持者，首选的穿刺血管是()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/545011213314011130>