

液透析科护理理论考试

1
1
1

一、单选题

1. 血液透析患者的营养管理主要目的在于预防和纠正（ ） [单选题] *

A. 蛋白质-能量消耗 ✓

B. 贫血

C. 微炎症状态

D. 心血管并发症

2. 血液透析患者（ ）降低是更可靠而可预测患者死亡的危险因素 [单选题]

A. 反应蛋白

B. 血红蛋白

C. 血清白蛋白 ✓

D. 白细胞

3. （ ）是造成透析患者生活质量下降、活动耐受能力减退的主要原因 [单选题] *

A. 贫血 ✓

B. 心力衰竭

C. 高血压

D. 营养不良

4. 引起透析患者心力衰竭的最重要因素是（ ） [单选题]

A. 高血压 ✓

B. 高血钾

C. 高血钾

D. 高血磷

5. 透析患者每日钙摄入量应达到 () [单选题]

A. 500-1000mg

B. 1000-1200mg ✓

C. 1000-2000mg

D. > 500mg

6. 透析过程中, 当溶质由血液侧跨膜向透析液侧传递时, 其溶质传质阻力主要在 () [单选题]

A. 血液侧 ✓

B. 半透膜

C. 透析液侧

D. 血液侧和透析液侧相同

7. () 方式的传质是溶质与溶剂分子热运动的结果, [单选题]

A. 对流

B. 弥散 ✓

C. 超滤

D. 吸附

8. 细菌的炎性产物部分可穿避透析膜进入血液侧, 导致 () 出现炎症反应 [单选题]

A. 致热源

B. 白细胞活化 ✓

C. 内毒素产生

D. 过敏

9 KoA是指透析器的（） [单选题 r

A 溶质转运系数 ✓

B. 超滤系数

C. 膜面积

D 超滤量

10. 备用血液透析机停用超过（），使用前应进行一次完整的水路消毒 [单选题] *

A. 24 /阳

B. 48 4|对 ✓

C. 72 小时

D. 1 周

11 . 透析治疗状态下，跨膜压的绝对报警下限为（） 1 单选感 r

A. 15mmHg

B 10mmHg

C. 20mmHg ✓

D. 25mmHg

12 . 透析用水中霉菌能形成一种叫（）的物质，使它附若在物体的表面很难清除 [单选题 r

A 真菌

B. 细菌及其释放和降解产物（内毒素）

C 生物段 V

D. 酵母菌

13. 每班患者开始前，需要对吸附床检测出水游离氯或总氯，合格指标为（） [单选题 r

A 游谢氨 $<0.5\text{mg/L}$ $<SM<0.25\text{mg/L}$

B. 游离氯 $<0.5\text{mg/L}$ / 或包氯 $<0.1\text{mg/L}$ ✓

C. 游离物 $<0.1\text{mg/L}$ / 或总氮 $<0.5\text{mg/L}$

D. 游离氯 $<0.25\text{mg/L}$ / 或总氯 $<0.5\text{mg/L}$

14 .对于工作大于 () , 机的透析机必须定期检置, 校对有关指标, 并记录在案 [单选题]

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. $5\infty 0$ ✓

15 .自体动岸脉内震狭窄的主要部位是 () 【单选题 r

A 流入道 ✓

B. 吻合口

C. 流出道

D. 中心静脉

16 .移植动静脉内屡狭窄的主要部位是 () [单选题 r

A. 动好脉吻合口

B. 瘻体

C. 躯端吻合口 ✓

D 中心济脉

17 .高输出量心力衰竭定义 () [单选题 T

A. 内瘦流量 2500ml/min

B. 内瘦流 1000ml/min

C. 内瘦流量 21500ml/min ✓

D 内瘦流量 22000ml / min

18 . 功能良好的内痛自然血流总是 () 【单选题 r

A. 200-300ml / min

B. 300-500ml / min

C. 500-800ml / min ✓

D. 600-1200ml / min

19 . 内度穿刺时，两穿刺点之间应相距 () cm 以上 [单选这) *

A. 2-4

B. 4-6

C. 6-8

D. 8-10 ✓

20 . 目前高通坦透析器是指 () [单选题 r

A. 超渡系数 >10ml / mmHg. h

B. 超速系数 > 15ml / mmHg. h

C. β 2微球蛋白清除 > 20ml / min ✓

D 水通透性高

E. 尿素总转运面积系数 (KoA) > 600

2L 透析管路预冲后必须 () 小时内使用，否则要更新预冲 [单选迤] *

A1

B. 2

C3

D. 4 ✓

22 .血液净化使用的体外循环管路*源器对人体来说是一种异物物质,长期频繁接触对人体()系统产生广泛的影响. [单选题 r

A. 免疫 V

B. 淋巴

C 消化

D 神经

23 .每个透析单元面积(),是空气隔离的有效措施【单选题 r

A, <3.2 N

B >3.2 in'

C. >2 m'

D ≥3.2m ✓

24 .高通量透析器在透析液的流出端可导致透析液向血腔的逆向超滤,有引发内毒素血症的风险,下列哪项措施可以消除这个不利因素() [单选题 r

A 绢根 TMP

B 降低超滤率

CjjMg feK ✓

D 透析液与血流方向一致

E 降低透析液流量

25 .透析器评价指标不包括() [单选题 T

A. 透析器清除率

B. 超滤系数

C. 膜面积

D. 生物相容性

E. 外观大小 ✓

26 . 关于医院内感染的概念，错误的是（） [单选题 r

医院内感染是指在医院内获得的感染

入院时处于潜伏期的痲疹一定不是医院内感染

病人出院之后发生的感染可能不是医院内感染

与上次住院有关的感染是医院内感染

E. 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院内感染 ✓

27 . 医院污物的处理原则错误的是（） [单选题] ■

A. 防止污染扩散

B. 分类收集

C. 分别处理

D. 少量医疗垃圾可与生活垃圾一同处理 ✓

E. 尽可能采用焚烧处理

28 . 关于洗手指征错误的是（） [单选题 T

A. 接触病人前后

B. 进行无菌操作前后

C. 戴口罩和穿、脱隔离衣前后

D. 接触血液、体液和被污染的物品前后

E. 脱手套后无需洗手 ✓

29 .有关医院内感染预防与控制的观念, 错误的是 () [单选题] *

A. 部分医院内感染是可以预防的

B. 洗手是预防医院内感染的主要措施

C. 医院内感行定是由于消毒隔离缺陷所致 V

D. 内源性医院内感染的主要原因

E. 滥用抗药药物可致二重感染

30 .下列有关护理工作的描述, 不正确的是 () 【单选题 r

A 各种治疗、护理、换药操作应按清洁伤口、感染伤口、隔离伤口依次进行

B. 起封抽吸的各种溶液超过 36 /J时不得使用, 最好采用大包装 V

C 无菌物品必须一人一用一灭菌

D. 灭菌物品提倡使用小包装, 无菌棉球或纱布槽一经打开, 使用时间不得超过 24 小时

E. 治疗室、处置室布局合理, 清洁区、污染区分区明确

31 .急性心肌梗死最突出的症状是 () [单选题] .

A. 休克

B 心前区疼痛 V

C 心搏失用

D. 充血性心力衰竭

E. 胃肠道症状

32 .代谢性酸中毒的临床表现为 () [单选题] *

A 呼吸快而浅

B 呼吸慢而浅

C. 尿液呈碱性

D. 钾离子进入细胞内

E. 呼吸深而快 ✓

33 . 床上擦浴适宜的水温是 () [单选 SS) .

A. 32℃-34℃

B. 36℃-40℃ ✓

C. 41℃-45℃

D. 47℃-50℃

E. 55℃-60℃

34 . 关于灌肠的注意事项, 下列哪项不正确 () [单选以 r

A 为病人解除便秘时, 液体应保留 5~10 分钟

B. 为病人降温时, 液体的温度宜为 4℃。CV

C. 保留灌肠宜保留一小时以上

D. 大量不保留灌肠的压力宜为 40~60cm

E 肝性 SS 病病人不能用肥皂水灌肠

35 . 心肺复苏 A、B、C 治疗法中的 A 是指 () [单选题] *

A. 心脏按压

B. 开放呼吸道 ✓

C. AI 呼吸

D. 止血

E. 转运病人

36 . 一病人吸氧的氧流量为 4L / min 其吸氧的浓度是 () [单选题]

- A. 40%
- B. 37% ✓
- C. 33%
- D. 27%
- E. 25%

37 .心脏褥烧人用力排便可引起的严无意.外是（） [单选须) “

- A. 肛裂
- B. 心脏赛停 V
- C. 直肠静脉曲张
- D. 便血
- E. 心房颤动

38 .口臭病人应选择的漱口液是（） [单选题] *

- A. 1%-4% 硅酸氯钠溶液
- B. 1%-3% 过氧化氢溶液 ✓
- C. 0. 1% 醋酸溶液
- D. 2%-3% 硼酸溶液
- E. 0. 02% 味喃西林溶液

39 .病人意识不清，伴有躁动不安、错觉、幻觉或胡言乱语等精神症状，属于（） [单选题 r

- A. 昏迷
- B. 退妄 ✓
- C. 妄想
- D. 暂睡

E. 昏厥

40 . 下列哪项违反手术进行中的无菌原则 () (单选题 r

A 洗手护士腰以下、背部和肩部以上都应视为有菌区

B. 下坠超过手术台边以下的器械不能用

C. 器械不能从手术背后传送

D. 手套接触非无菌区后应用乙醇消毒 ✓

E. 前臂或肘部碰触有菌地方应更换无菌手术衣或加套无菌袖套

41 . 破伤风病人最常见的死因是 () [单选题厂

A 强烈痉挛引起的骨折

B. 水、电解质代谢失常

C. 急性肾衰竭

D. 心力衰竭

E. 窒息 ✓

42 . 要素膳是 () [单选题 r

A. 低蛋白膳食

B. 化学配膳 ✓

U 胃肠道消化

D. 低脂肪、低糖膳食

E. 低蛋白膳食

43 . 铺备用床时下述哪项不必要 () [单选题] *

A. 评估同室病友有无进餐、治疗或换药

B. 按便于操作的原则收拾好各类用物

C. 按使用先后摆放好各单

D. 核对床号、姓名

E. 扫净床上涌屑

44 . 某病人补液 1000mL, 50 滴 / min 从上午 8 时 20 分开始, 估计何时可滴完 () 洋选蜀.

A. 上午 11 时

B. 中午 12 时 20 分

C. 下午 1 时 20 分

D. 下午 2 时

E. 下午 2 时 20 分

45 . 糖尿病最常见的神经病变是 () [单选题] *

A. 周围神经病变

B. 神经根褥变

C. 自主神经病变

D. 御腑变

E. 脑神经病变

46 . 决定中心静脉压高低的因素是 () [单选题] .

A. 血管容量和循环血量

B. 心脏射血能力和好脉回心血量

C. 动脉血压和静脉血压

D. 心脏射血能力和外周阻力

E. 外周静脉压和静脉血流阻力

47 . 育密素过敏性休克国 () [单选题] r

AJ 型超

B·H 蚰敏

C. II型超敏反应

DjV 型超敏反应

EV 型超敏反应

48 . 孕妇最易并发哪种贫血 () [单选题 T

A. 蛸弱血

B. 缺铁性茯血 ✓

C. 再生暗物性贫血

D. 溶血性贫血

E. 巨幼细胞贫血

49 . 暂空床的目的是 () [单颜 sr

A. 保持病室整洁, 准备病人住院

B. 便于接收和管理麻醉后未清醒病人群众

U 保持床单位整洁, 病人舒适

D. 供暂时高床活动的病人或新入院的病人使用 ✓

E. 保护被梅不被污染

50 . 对需要进行床上擦浴的病人进行心理状态评估应电点评估 () [单选题) *

A. 对疾病的态度

B. 住院后的心理反应

C. 对床上擦浴的心理口

D. 住院后的情绪状态

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/545014003110012122>