卫生系统招聘考试护理学专业知识(习题卷46)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共84题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]体重60公斤，血钠值为120mmol/L，肠外营养支持应补充：[补钠量=(正常血钠值140-实际血钠值)X20%体重/17]
A)12g氯化钠
B)14g氯化钠
C)13g氯化钠
D)16g氯化钠

2.[单选题]关于护士在紧急情况下的救助，下列说法错误的是（ ）
A)病人垂危、医师不能马上赶到时，护士应当先行实施必要的紧急救护
B)护士实施必要的抢救措施，要避免对患者造成伤害
C)遇有患者病情危急时，护士应立即通知医师
D)护士有权独立抢救危重病人

3.[单选题]男性，30岁。确诊哮喘入院治疗3周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生嘱咐 为巩固疗效，建议患者继续应用哪种药物控制气道炎症
A)丙酸倍氯米松气雾剂
B)溴化异丙托品气雾剂
C)特布他林气雾剂
D)酮替酚
E)氨茶碱

4.[单选题]流行性脑脊髓膜炎最常见的皮疹是
A)水疱疹
B)脓疱疹
C)鸡皮疹
D)瘀点和瘀斑
E)玫瑰色斑丘疹

5.[单选题]检查Hp的方法下列哪项不可行？
A)13C尿素呼吸试验
B)Warthin-Starry染色
C)GiEmsa染色
D)胃镜下观察
E)活检标本作尿素酶试验

6.[单选题]下列关于术前准备的叙述中，哪个不正确
A)术前应学会正确咳嗽和咯痰的方法
B)术前应练习在床上大、小便
C)对操作时间长的大手术，术前应预防性应用抗生素

D)术前4小时开始禁止饮水
E)有吸烟习惯的病人应于术前1周开始停止吸烟

7.[单选题]酊剂在贮存过程中出现沉淀应做哪项处理？()
A)过滤除去即可
B)在有效成分含量符合要求的情况下，才能过滤除去
C)在乙醇含量符合要求的情况下，才能过滤除去
D)在乙醇、有效成分含量均符合要求的情况下，才能过滤除去
E)不宜除去

8.[单选题]患儿男，早产儿。生后5小时出现进行性呼吸困难，发绀，三凹征.血气分析示氧分压降低，首优的护理诊断是
A)气体交换受损
B)营养失调
C)清理呼吸道无效
D)潜在并发症
E)有感染的危险

9.[单选题]血清甲胎蛋白（AFP）升高的是
A)肾癌
B)膀胱癌
C)睾丸肿瘤
D)前列腺癌
E)前列腺增生

10.[单选题]男，18岁，约半小时前不慎自约3m高处跌落，呼吸困难就诊。检查见明显呼吸急促，烦躁不安，紫绀，颈部及右胸部皮下气肿，右胸饱满，右肺呼吸音消失，气管左移，血压10.67/8kPa（80/60mmHg），心率120次/分，X线检查示右肺萎陷，右胸膜腔大量积气。应采取的急救措施是：
A)立即吸氧
B)气管插管
C)立即于右侧锁骨中线第2肋间穿刺排气
D)立即于右侧锁骨中线第6肋间穿刺排气
E)立即于右侧腋中线第6肋间插管闭式引流如经上述急救措施，病情无好转或好转后又恶化。

11.[单选题]女性生殖器的邻近器官，下列哪项应除外：
A)膀胱
B)输尿管
C)阑尾
D)乙状结肠
E)直肠

12.[单选题]容易出现体位性低血压的药物是：
A)利尿剂
B)β-受体阻滞剂
C)钙离子拮抗剂
D)ACEI
E)α1受体阻滞剂

13.[单选题]达到阿托品化后患者仍出现面部、四肢抽搐，进一步治疗应为
A)加大阿托品用量
B)重用胆碱能复活剂

C)输血
D)高渗脱水剂
E)镇静剂

14.[单选题]30岁女性，停经42天，右下腹疼痛伴不规则阴道流血10+天，刮出物送病检为子宫内膜蜕膜样改变，最大可能诊断是：
A)功血
B)流产
C)子宫内膜炎
D)异位妊娠
E)月经期

15.[单选题]男性，35岁，右腹股沟肿块10年，站立时明显，平卧后消失，有时可降入阴囊，可还纳。查:右腹股沟肿块，手拳大小还纳腹腔，外环容3指，压迫内环后肿块不再出现。该患者最容易出现的并发症
A)逆行性嵌顿
B)急性肠梗阻
C)感染性休克
D)嵌顿疝并绞窄性肠梗阻
E)以上均不是

16.[单选题]对护士在知情同意中的职责比较全面的描述是
A)监测者、代言人
B)协调者、促进者
C)监测者、协调者
D)监测者、代言人、协调者
E)监测者、代言人、协调者、促进者

17.[单选题]在肾病综合征并发的感染中，最常发生的是
A)上呼吸道感染
B)胃肠炎
C)原发性腹膜炎
D)脑膜炎
E)尿路感染

18.[单选题]女性 50 岁，因子宫颈癌行全子宫切除，术后当日无尿。术中出血不多，术前肾功能正常。因此诊断最大的可能为
A)肾功能衰竭
B)术中误扎双侧输尿管
C)盆腔肿瘤侵犯双侧输尿管
D)一过性无尿
E)以上都不是

19.[单选题]女，10岁，阵发性腹痛，黑便2天，双下肢散在出血点，双膝关节肿胀，腹软，右下腹压痛，白细胞12.5×10^9/L，血小板200×10^9/L，血红蛋白110g/L，尿常规蛋白质（+），红细胞（+）/HP，颗粒管型0-3个/HP如上述治疗无效可合用
A)环磷酰胺
B)甲氰米胍
C)维生素C
D)输血
E)阿托品

20.[单选题]妊娠合并糖尿病需使用药物治疗时应选用()
A)降糖灵
B)消渴丸
C)优降糖
D)胰岛素
E)逍遥丸

21.[单选题]应用硝酸甘油缓解心绞痛，正确的护理是
A)药物用温开水送服
B)药物置口中，立即咽下
C)舌下含化，药物被唾液溶解使吸收减少
D)含药时宜平卧以防低血压
E)观察头昏、血压偏高表现

22.[单选题]下列哪种情况为择期手术
A)甲亢服碘10天
B)胆囊结石嵌顿
C)黄疸、胆总管结石并感染
D)胃癌
E)十二指肠溃疡

23.[单选题]关于大面积严重烧伤早期处理，不正确的是：
A)尽量避免长途转运
B)可用止痛剂
C)最好就近输液抗休克
D)大量口服盐水
E)必要时做气管切开

24.[单选题]肾性水肿首先出现的部位是（ ）
A)上肢
B)下肢
C)腹腔
D)眼睑
E)头面部

25.[单选题]妊娠28周末，子宫底高度约
A)脐水平
B)脐上1横指
C)脐上3横指
D)剑突与脐之间
E)剑突下1横指

26.[单选题]在慢性肺心病的发生、发展过程中，导致肺血管阻力增加的最主要因素是
A)缺氧
B)高碳酸血症
C)呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
D)电解质紊乱
E)肺部感染

27.[单选题]红细胞渗透脆性试验开始溶血0.62%NaCl溶液，完全溶血0.44%,应考虑那种病？
A)遗传性球形细胞增多症

B)缺铁性贫血
C)阵发性睡眠性血红蛋白尿
D)运动红细胞性贫血
E)再生障碍性贫血

28.[单选题]男性，25岁，车祸致左锁骨骨折，行手法复位8字绷带固定术，术后5天复查X线示骨折移位明显，影响外观，最合理的治疗是:
A)手法复位，8字绷带固定
B)手法复位，双圈固定
C)切开复位钢丝内固定
D)切开复位钢板螺钉内固定
E)切开复位外固定架外固定

29.[单选题]下肢静脉曲张的主要并发症是
A)深静脉血栓形成
B)深静脉瓣功能不全
C)小腿溃疡
D)小腿丹毒
E)足部溃疡

30.[单选题]抢救急性有机磷农药中毒清洗皮肤时用
A)热水
B)乙醇
C)肥皂水
D)清水
E)苏打水

31.[单选题]下列关于急性硬膜外血肿错误的是
A)幕上急性硬膜外血肿以颞部多见
B)均出现所谓的"中间清醒期"
C)大多数合并有颅骨骨折
D)好发于青壮年
E)E在患者中间清醒期常有躁动不安

32.[单选题]髋关节后脱位
A)易发生肱动脉损伤
B)易发生腘动脉损伤
C)易发生缺血性骨坏死
D)易发生桡神经损伤
E)易发生坐骨神经损伤

33.[单选题]45岁肺结核患者，3天前开始咳嗽，痰中带血。今天上午突然大口咯血，量约100ml，查体未见异常。ECGⅡ、Ⅲ、AVF导联ST段下移＞0.5mV，T波低平对其治疗下列哪项不正确
A)快速静脉推注垂体后叶素
B)咳必清镇
C)配血以备急用
D)继续抗结核治疗
E)小剂量镇静剂

34.[单选题]从病因学角度分析，何项不是妊娠高血压疾病的好发因素：
A)多胎妊娠

B)葡萄胎
C)糖尿病
D)初孕妇
E)母儿血型不合

35.[单选题]沟通的基本因素除外
A)沟通的背景
B)信息发出者
C)信息内容
D)信息接受者
E)组织传播

36.[单选题]与传染性非典型肺炎患者密切接触者，隔离观察期限为( )
A)12天
B)14天
C)2天
D)10天
E)21天

37.[单选题]男性21，左阴囊胀痛活动后加重，平卧后疼痛消失可能的疾病是
A)隐睾
B)睾丸肿瘤
C)左肾肿瘤
D)左精索静脉曲张
E)左斜疝

38.[单选题]男性，45岁，查体发现肝硬化5年。3天前与朋友聚餐时出现呕血，鲜红色，量约1000ml.患者出现头晕、心慌、出冷汗等。经输血、补液和应用止血药物治疗后病情好转，血压和心率恢复正常。1天前出现睡眠障碍。并出现幻听和言语不清。化验检查示：血氨130μg/dl，血糖5.6mmol/L，尿素氮7.2mmol/L患者最可能的诊断是
A)尿毒症
B)脑血管意外
C)乙型脑炎
D)糖尿病酮症酸中毒
E)肝性脑病

39.[单选题]使瞳孔缩小的原因是（ ）
A)有机磷农药中毒
B)暗光刺激
C)交感神经兴奋
D)去氧肾上腺素
E)动眼神经麻痹

40.[单选题]下列哪种疾病是慢性盆腔炎疾患:
A)卵巢冠囊肿
B)输卵管卵巢囊肿
C)黄素囊肿
D)皮样囊肿
E)巧克力囊肿

41.[单选题]下列不符合炎症性增生的是
A)实质细胞增生

B)血管内皮细胞增生
C)纤维组织增生
D)异型性增生
E)淋巴组织增生

42.[单选题]肺源性心脏病主要的死亡原因是()
A)心力衰竭
B)心律失常
C)肝功能衰竭
D)肺性脑病
E)感染性休克

43.[单选题]患者女性，30岁。全身关节游走性疼痛，掌指关节肿胀，面部盘状红斑。诊断为系统性红斑狼疮。此患者发病与下列因素关系最密切的是
A)喜欢喝绿茶
B)每周游泳3次
C)经常旅游、登山
D)工作时间每天8小时
E)经常饮用红酒、啤酒

44.[单选题]最严重的输血反应是：
A)发热反应
B)过敏反应
C)溶血反应
D)循环超负荷
E)疾病传播

45.[单选题]梗死前心绞痛的哪一点与急性心肌梗死不同：
A)心电图ST段抬高
B)胸痛不能以硝酸甘油缓解
C)剧烈胸痛伴恶心呕吐和大汗
D)心电图未见病理性Q波
E)血压波动

46.[单选题]剖宫产术后2个月的哺乳期妇女，其避孕方法应首选
A)宫内节育器
B)口服避孕药
C)阴茎套
D)安全期避孕
E)闭经可不避孕

47.[单选题]下列哪条神经损伤后出现“腕下垂”()
A)尺神经浅支
B)桡神经浅支
C)桡神经深支
D)正中神经
E)尺神经深支

48.[单选题]急性肺水肿时，病人的体位应取（ ）
A)去枕平卧位
B)头低脚高位

C)俯卧位
D)半坐卧位
E)平卧位且头偏向一侧

49.[单选题]肿瘤病人化疗或放疗期间，最主要的观察项目是()
A)脱发程度
B)食欲不振
C)恶心呕吐
D)皮肤损害
E)血白细胞和血小板计数

50.[单选题]臂丛阻滞麻醉并发症除外
A)气胸
B)局麻药中毒
C)神经损伤
D)膈神经阻滞
E)以上都不是

51.[单选题]小儿生后生长发育最快的时期是
A)胎儿期
B)新生儿期
C)婴儿期
D)幼儿期
E)学龄期

52.[单选题]某高血压病患者，病程10年，血压166／106mmHg，伴有左室肥大，心功能III级，曾有过短暂性脑缺血发作，该病人血压属于
A)高血压2级，中危
B)高血压2级，高危
C)高血压3级，高危
D)高血压3级，中危
E)高血压2级，极高危

53.[单选题]局限性哮鸣音?
A)支气管哮喘
B)支气管扩张
C)慢性支气管炎、肺气肿
D)支气管肺癌
E)特发性肺间质纤维化

54.[单选题]三腔气囊管使用过程中发生窒息的原因是( )
A)食管气囊充气过多
B)牵引过紧
C)胃气囊阻塞咽喉
D)血液反流至气管
E)喉头水肿

55.[单选题]椎间隙感染的X线早期表现是:
A)椎间隙变窄
B)椎体间骨性融合
C)软骨下骨质硬化

D)椎体椎板进行性不规
E)椎间隙气球样改变

56.[单选题]诊断支原体肺炎的主要依据是
A)痰细菌培养阴性
B)血清冷凝集试验阳性
C)红霉素试验性治疗
D)临床表现
E)X线特异表现

57.[单选题]急性虹膜睫状体炎最重要的局部治疗方法
A)1%毛果芸香碱缩瞳
B)抗感染
C)1%阿托品扩瞳
D)使用高渗脱水药
E)抗病毒

58.[单选题]腹部术后给予半卧位的目的，不包括
A)利于呼吸和循环
B)防止膈下脓肿
C)减轻腹壁张力
D)预防肺部并发症
E)防止切口裂开

59.[单选题]4个月健康男婴，现采用人工喂养，此时护士应指导家长添加的辅食是
A)肉末
B)米饭
C)饼干
D)蛋黄
E)馒头

60.[单选题]临床最常选作动脉置管监测血压的动脉是
A)颈总动脉
B)肱动脉
C)桡动脉
D)股动脉
E)足背动脉

61.[单选题]倾斜床站立训练的优点之一是调节血管紧张性，其目的是为了
A)利于患者呼吸
B)防止直立性低血压
C)预防压疮
D)预防静脉血栓
E)增加腹压利于排便

62.[单选题]等渗性缺水时输入大量生理盐水可能出现
A)高钾血症
B)高钠血症
C)高氯血症
D)低钠血症
E)低钾血症

63.[单选题]上述哪一型食管癌梗阻程度较轻
A)缩窄型或硬化型
B)髓质型
C)溃疡型
D)蕈伞型
E)腔内型

64.[单选题]55岁，女性，双手不能紧握，腕关节痛，见“鹅颈征”，低热，咽痛，在外血WBC12×10^9/L，血小板430×10^9/L，血色素89g/L，未查RF。临床诊断类风湿关节炎。临床上所指“鹅颈征”，是指:
A)腕关节
B)手近指关节
C)手远指关节
D)第一跖趾关节
E)颈椎

65.[单选题]骨囊肿好发于:
A)长管骨干骺端
B)长管骨骨端
C)长管骨干部
D)短管骨骨端
E)短管骨干部

66.[单选题]下列做法中不违背护理伦理学不伤害原则的是
A)造成本可避免的患者自杀
B)因急于手术抢救患者，未有家属或患者签手术同意书
C)造成本可避免的残疾
D)发生故意伤害
E)造成本可避免的人格伤害

67.[单选题]一女性患者，反复呕吐20天，伴全身乏力5天，腹部隐痛。体查：脉搏114次/分，血压12/8kPa（90/60mmHg），浅静脉萎缩，心肺无异常。实验室检查：Hb186g/L，RBC6．4×1012/L，BUN6．5mmol/L。询问病史时下列那项为各型缺水所共有
A)头昏
B)尿量减少
C)呕吐
D)口渴
E)烦躁

68.[单选题]男性，45岁，右下腹隐痛4个月，近2个月来乏力、消瘦，常有低热，查体：结膜苍白，右侧腹部5cm×3cm肿块。化验：血红蛋白95g／L。为明确诊断，最有意义的检查方法是
A)直肠指检
B)腹部CT
C)X线钡剂灌肠
D)纤维结肠镜
E)X线气钡双重对比造影

69.[单选题]降低胃酸最有效的药物是
A)H2受体拮抗剂
B)抗胆碱药物
C)促胃液素受体拮抗剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/545202013023011211