

全科医学住院医师：外科测试题

1、单选 巴德-吉利亚阻塞综合征引起（）。

- A. 门静脉高压症的主要阻塞部位在窦前
- B. 门静脉高压症的主要阻塞部位在窦后
- C. 门静脉高压症的主要阻塞部位在窦后和肝窦
- D. 门静脉高压症（江南博哥）的主要阻塞部位在肝前
- E. 门静脉高压症的主要阻塞部位在肝后

正确答案：E

参考解析：门脉高压症分为肝前型、肝内型和肝后型三类。在肝内型又分为窦前阻塞、肝窦和窦后阻塞两种。

2、单选 患者，男，70岁，体重60kg，全胃切除术后5天，大量肠液自腹腔引流管引出，左上腹疼痛。查体：左上腹轻压痛，无肌紧张。该病人热量每天基本需要量是（）。

- A. 800kcal
- B. 1200kcal
- C. 1500kcal
- D. 2000kcal
- E. 2500kcal

正确答案：C

3、单选 低钾血症少见于（）。

- A. 长期进食不足
- B. 持续胃肠减压
- C. 碱中毒
- D. 急性肾衰竭
- E. 大量输入葡萄糖和胰岛素

正确答案：D

参考解析：低钾血症病因包括长期进食不足；应用速尿和利尿酸等利尿；补液患者长期接受不含钾盐的液体；静脉营养液中钾盐补充不足；呕吐、持续胃肠减压、禁食、肠痿、结肠绒毛状腺瘤和尿管乙状结肠吻合术等。

4、单选 男，52岁，车祸致骨盆骨折，脾破裂，脾切除术后胃瘫，给予静脉输入25%葡萄糖400ml和其他液体，术后10天患者出现皮肤、巩膜黄染，并进行性加重，化验血糖20.3mmol/L。出现黄疸的最可能的原因是（）。

- A. 复合伤导致肝功能失代偿
- B. 糖代谢紊乱导致肝功能损害
- C. 电解质紊乱导致肝功能损害
- D. 药物中毒导致肝功能损害
- E. 输血所致血管内溶血

正确答案：B

参考解析：本题无明确输血史可以排除 E，无应用其他损害肝功能药物史，排除 D，黄疸出现在伤后 10 天，故排除 A，虽提示有胃瘫，但没有电解质紊乱，排除 C，本题提示有输入 25%高浓度葡萄糖史，且化验血糖升高，故出现肝损害最可能的原因是血糖超负荷引起肝脂肪变性、黄疸。

5、填空题 单纯性甲状腺肿的病因可分为三类（）、（）、（）。

正确答案：甲状腺素原料缺乏；甲状腺素需要量增高；甲状腺合成和分泌障碍

6、填空题 肛瘘的主要症状是肛门周围的外瘘口不断有（），可刺激皮肤引起瘙痒。瘘一般由（）、（）、（）组成。

正确答案：脓性分泌物；内口；外口；瘘管

7、单选 低位肛瘘宜采用（）。

- A. 肛瘘切开术
- B. 肛瘘挂线疗法
- C. 肛瘘外口扩大术
- D. 药物保留灌肠治疗
- E. 肛瘘部分切开+肛瘘挂线术

正确答案：A

8、单选 患者男性，78 岁，1 天前因右腹股沟疝嵌顿手法回纳后，即感腹痛。现因腹痛加剧、腹胀、气促、呕吐而来就诊。查体：神志淡漠，四肢厥冷。脉细速 140 次 / 分，血压 60/40mmHg，腹胀，全腹压痛、反跳痛、肌紧张，以脐右最为明显，诊断肠坏死穿孔、弥漫性腹膜炎、中毒性休克。 应选择的处理方案为（）。

- A. 立即手术
- B. 非手术治疗
- C. 先观察视发展再决定治疗方案
- D. 积极抗休克治疗，并进行手术治疗
- E. 以上均不对

正确答案：D

9、单选 长期肠外营养支持者，应选择的穿刺血管是（）。

- A. 颈内静脉
- B. 大隐静脉
- C. 颈外静脉
- D. 足背静脉
- E. 头静脉

正确答案：A

参考解析：不超过 2 周的肠外营养，可通过周围静脉补给；长期的肠外营养应采用中心静脉插管补充，24 小时连续滴注。导管可经颈内静脉或锁骨下静脉放置到上腔静脉。

10、单选 男，32岁。于1年前出现尿频，尿急，尿痛，症状反复，抗感染治疗效果不明显，近2个月出现脓尿及终末肉眼血尿，膀胱刺激症状加重，伴有恶心，发热，左侧腰部胀痛。其诊断首先考虑（）。

- A. 泌尿系统肿瘤
- B. 泌尿系统结核
- C. 慢性前列腺炎急性发作
- D. 左侧上尿路结石伴感染
- E. 慢性肾盂肾炎

正确答案：B

11、多选 肛裂的治疗包括（）。

- A. 局部止血
- B. 彻底引流创面
- C. 软化大便
- D. 消除肛门括约肌痉挛
- E. 以上都是

正确答案：B, C, D

参考解析：肛裂治疗首先应软化大便，彻底引流创面，解除括约肌痉挛，中断恶性循环，促使溃疡创面愈合。

12、单选 女，50岁，因患短肠综合征，予全胃肠外营养（TPN）治疗。应用一周时病人出现昏迷，但尿内无酮体。病人既往曾有空腹血糖高（11mmol/L）。此病的发病机制是由于（）。

- A. 内源性胰岛素分泌不足
- B. 等渗性脱水
- C. 输液导管细菌滋生
- D. 肝功能损害
- E. 肾功能损害

正确答案：A

13、填空题 肠内营养给予的方式有：按时分次给予、（）、（）。

正确答案：间隙重力滴注；连续输注

14、填空题 急性腹膜炎根据原因分为（）和（）两种，以多见（）。

正确答案：原发性腹膜炎；继发性腹膜炎；继发性腹膜炎

15、填空题 病理上脾外伤分为（）、（）、（）。

正确答案：中央型破裂；被膜下破裂；真性破裂

16、多选 伤口放置引流物的适应证包括（）。

- A. 脓肿或积液部位切开后
- B. 感染较重、止血不彻底的创面
- C. 肝切除术后
- D. 脾切除术后

E. 胆道术后

正确答案：A, B, C, E

17、单选 应用全胃肠外营养时，氮和热量之比应为（）。

A. 1: (50~80) kcal

B. 1: (100~120) kcal

C. 1: (150~200) kcal

D. 1: (210~240) kcal

E. 1: 250kcal 以上

正确答案：C

18、填空题 肛管的下界为（），上界为（）。

正确答案：肛门缘；齿线

19、填空题 肛裂三联征是指（）、（）、（）。

正确答案：肛裂；肛乳头肥大；前哨痔

20、单选 男，27岁。反复尿频，尿急，尿痛伴终末肉眼血尿2年，大量使用抗生素治疗效果欠佳，且逐渐加重，尿常规检查：白细胞++，红细胞+++。现排尿超过30次/日。诊断考虑下列哪种疾病（）。

A. 慢性肾盂肾炎

B. 慢性前列腺炎

C. 膀胱结石

D. 肾结核

E. 膀胱肿瘤

正确答案：D

21、单选 维持机体体液平衡的主要器官是（）。

A. 肺

B. 缓冲系统

C. 肾

D. 皮肤

E. 肝

正确答案：C

参考解析：机体主要通过肾脏来调节体液平衡，而肾脏又受神经-内分泌的影响，通过肾素-醛固酮系统维持血容量。酸碱平衡主要通过缓冲系统、肺的呼吸和肾的调节来维持。

22、单选 乳腺癌术后皮下积液（）。

A. 不凝的血性液体

B. 黄绿色透明液体，无臭味

C. 稀脓性液体，略带臭味

D. 淡黄色透明液体

E. 黄绿色稠厚液体，带有粪便样特殊臭味
下列疾病的穿刺液分别是以上哪种液体

正确答案：D

23、单选 女，36岁，发现左乳肿物3个月，近期增大明显。检查左乳外上象限可及3cm×3cm肿块，质硬，活动差，左腋下未及肿大淋巴结。行乳腺细针穿刺活检为坏死组织。进一步处理为（）。

- A. 密切观察一段时间
- B. 换用粗针再穿刺活检
- C. 切取部分肿块组织做活检
- D. 完整切除肿物及其周围组织活检
- E. 以上都不正确

正确答案：D

参考解析：根据肿块的质地，怀疑为乳癌，细胞穿刺可能为肿瘤中央坏死组织，应切除做冷冻活检。

24、单选 男性，58岁。尿频，进行性排尿困难伴夜尿增多3年，尿流中断半年。下腹X线平片及B超检查：可见膀胱区2枚大小分别为3.5cm×2.5cm×2.5cm和2.5cm×2.0cm×2.0cm结石，上尿路未见异常改变。查尿常规白细胞满视野，应采取（）。

- A. 先留置导尿管，控制感染后再膀胱切开取石+前列腺摘除
- B. 立即膀胱切开取石
- C. 膀胱镜碎石
- D. 先留置导尿管抗感染后，再碎石
- E. 非手术治疗

正确答案：A

25、单选 机体处于应激如创伤、手术、感染等情况下，能量代谢的变化中，错误的是（）。

- A. 机体出现高代谢和分解代谢
- B. 脂肪动员加速
- C. 蛋白质分解加速
- D. 处理葡萄糖能力增强
- E. 机体处于负氮平衡

正确答案：D

参考解析：创伤、手术等应激状态下分解代谢旺盛。脂肪、蛋白分解增加，但机体对糖的利用率下降，容易出现高血糖、糖尿，负氮平衡。

26、多选 我国显微外科在下列哪些专科有很大进展（）。

- A. 整复外科
- B. 泌尿外科
- C. 心血管外科
- D. 肿瘤外科
- E. 普通外科

正确答案：A, C, E

27、填空题 腹膜炎的结局与患者全身和腹膜局部的（ ）有关；亦决定于（ ）的性质、数量和时间。

正确答案：中心静脉；周围静脉

28、填空题 脾破裂有三种形式，即（ ）、（ ）和（ ）。

正确答案：真性脾破裂；中央型脾破裂；迟发性（包膜下）脾破裂

29、单选 细胞外液中主要的阳离子是（ ）。

- A. K^+
- B. Na^+
- C. Ca^{2+}
- D. Mg^{2+}
- E. Fe^{2+}

正确答案：B

参考解析：细胞外液中主要的阳离子是 Na^{+} ，主要阴离子是 Cl^{-} 、 HCO_3^{-} 和蛋白质。细胞内液中主要的阳离子是 K^+ 和 Mg^{2+} 。

30、单选 肛周脓肿引起的肛瘘为（ ）。

- A. 括约肌间肛瘘
- B. 经括约肌肛瘘
- C. 括约肌上肛瘘
- D. 括约肌外肛瘘
- E. 以上都不是

正确答案：A

参考解析：瘘管只穿过内括约肌，常是肛周脓肿的结果，最常见。

31、多选 老年男性，65岁，既往有胆囊结石病史，因上腹痛4小时由家属送诊，查体：意识淡漠，血压90/50mmHg，右上腹部肌紧张。此时最恰当的治疗措施是（ ）

- A. 紧急完善术前准备，急诊手术
- B. 积极补液，抗休克治疗
- C. 同时行床旁B超检查
- D. 紧急化验血常规、肝功、胰酶
- E. 行腹部CT检查
- F. 行腹部平片检查

正确答案：A, B, C, D

32、单选 患者，男，15岁。足部刺伤2小时，已接受计划性混合疫苗注射，为预防破伤风，最重要的正确的处置是（ ）。

- A. 刺伤部切开不予缝合
- B. 注射TAT750U
- C. 注射TAT1500U

- D. 注射 TAT3000U
E. 注射破伤风类毒素 0.5ml

正确答案：E

参考解析：凡 10 年内做过自动免疫者，伤后仅需注射破伤风类毒素 0.5ml 即可预防破伤风。

33、单选 男，30 岁。2 年来反复尿频，尿急，尿痛，自服抗生素治疗后症状无明显改善，近 1 个月来，症状加重，尿频次数明显增加，约 30 次 / 日，伴有终末肉眼血尿，自服药物治疗无效。检查证实了诊断，并考虑有左肾轻度积水及膀胱挛缩，治疗首先应（ ）。

- A. 膀胱扩大术
B. 抗结核治疗
C. 继续抗感染治疗
D. 左肾造瘘术
E. 左输尿管皮肤造口

正确答案：B

34、单选 下肢深静脉血栓阻塞（ ）。

- A. Trendelenberg 试验（+）
B. Perthes 试验（+）
C. Pratt 试验（+）
D. Buerger 试验（+）
E. Trendelenberg 试验（-）

正确答案：B

35、单选 乳腺癌患者其乳腺包块大小约 5cm×5cm，病理诊断为：浸润性导管癌，查淋巴结见转移癌（8/20），肺部 X 线检查发现转移灶。此病变为哪一期（ ）。

- A. 0 期
B. I 期
C. II 期
D. III 期
E. IV 期

正确答案：E

36、单选 患者，男，34 岁，4 天前施工时右下肢被石板砸伤，X 线摄片，未见骨折，行清创缝合。现突然出现烦躁不安，伴恐惧感，大汗淋漓，自述右下肢伤处疼痛加重，胀裂感。体温 38.5℃，脉搏 128 次 / 分，血压 146/92mmHg，右小腿肿胀明显，大量浆液血性渗出物自切口渗出，皮肤表面呈大理石样花纹，渗出物有恶臭味。治疗上不恰当的是（ ）。

- A. 右下肢广泛、多处切开
B. 800 万 U 青霉素静脉注射

- C. 补充营养
- D. 右下肢截肢
- E. 高压氧疗法

正确答案：B

37、单选 男，53岁，肝硬化腹腔积液，近1周有发热，腹胀，稍有呼吸困难，腹腔积液较前有所增长，心率96次/分，应用利尿药治疗2天后出现沉默寡言，性格改变。下列哪项检查最可能正常（）。

- A. 血钾钠离子测定
- B. 血氨
- C. 脑电图
- D. 扑翼样震颤
- E. 腹腔积液常规

正确答案：C

38、单选 男，27岁。反复尿频，尿急，尿痛伴终末肉眼血尿2年，大量使用抗生素治疗效果欠佳，且逐渐加重，尿常规检查：白细胞++，红细胞+++。现排尿超过30次/日。还可以行什么检查以帮助明确诊断（）。

- A. 肾功能检查
- B. 膀胱功能检查
- C. 泌尿系统CT检查
- D. 泌尿系统血管造影检查
- E. 前列腺液常规检查

正确答案：C

39、单选 虽易引起败血症，但一般不发生转移性脓肿（）。

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 变形杆菌

正确答案：B

40、单选 便后肛门部肿物，疼痛明显者为（）。

- A. 内痔
- B. 外痔
- C. 肛裂
- D. 直肠息肉
- E. 直肠癌

正确答案：B

参考解析：

蹄铁型肛瘘指肛管左右侧均有外口，宜切开外口至两侧管道相通处，再用挂线疗法。4. 便后肛门部肿物疼痛明显，一般为外痔引起。及活组织检查（punchbiopsy）确诊。

41、填空题 腹膜刺激征是指（）、（）和（）。

正确答案：压痛；反跳痛；非自主性肌紧张

42、单选 男性，42岁。B超发现左肾结石1cm大小，平时无明显症状，偶有腰部酸胀不适感。既往体健，无排石史。上尿路结石最常见的症状是（）。

- A. 血尿+尿痛
- B. 腰痛+血尿
- C. 腰痛+脓尿
- D. 尿频+血尿
- E. 腰痛+尿痛

正确答案：B

43、多选 影响伤口愈合的局部因素有（）。

- A. 伤口内有血肿
- B. 伤口内有异物和坏死组织
- C. 术中广泛剥离，术后缝合过密
- D. 伤口包扎过紧
- E. 局部感染

正确答案：A, B, C, D, E

44、单选 男，18岁，右手背部深Ⅱ度烧伤10天，近一天出现乏力、头痛及张口困难，不恰当的诊治措施是（）。

- A. 手背部烧伤部位清创
- B. TAT2万U静脉注射
- C. 腰穿脑脊液检查
- D. 白蛋白20g静脉注射
- E. 10%水合氯醛30ml保留灌肠

正确答案：C

参考解析：患者有较深伤口，具有厌氧菌生长条件，近一天出现乏力、头痛及张口困难，考虑破伤风的可能性大，故应给予针对破伤风治疗：手背部烧伤部位清创，TAT2万U静脉注射，白蛋白20g静脉注射，10%水合氯醛30ml保留灌肠。

45、单选 患者，女，17岁，发热5天伴纳差2天急诊。检查：血压114/70mmHg，左脚趾甲沟部红肿破溃。血白细胞计数为 $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞为85%。经血培养证实金黄色葡萄球菌阳性。根据经验首选抗生素是（）。

- A. 丁胺卡那霉素
- B. 环丙沙星
- C. 红霉素

- D. 万古霉素
- E. 甲硝唑

正确答案：D

46、填空题 乳癌临床表现中，有特征性的是：早期（）；晚期（）。

正确答案：酒窝征；桔皮样改变

47、单选 患者，女，17岁，发热5天伴纳差2天急诊。检查：血压114/70mmHg，左脚趾甲沟部红肿破溃。血白细胞计数为 $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞为85%。经处理3天后病人体温升高，且血压和血小板计数下降，此时病人可能合并有（）。

- A. 丹毒
- B. DIC
- C. 感染性休克
- D. 多器官衰竭
- E. 菌血症

正确答案：E

48、单选 女，30岁。被人刺伤颈部。查体：患者除颈部伤口血肿外，还有声音嘶哑，可能存在的诊断是（）。

- A. 膈神经损伤
- B. 食管损伤
- C. 喉返神经损伤
- D. 副神经损伤
- E. 颈部交感神经损伤

正确答案：C

49、多选 老年男性，65岁，既往有胆囊结石病史，因上腹痛4小时由家属送诊，查体：意识淡漠，血压90/50mmHg，右上腹部肌紧张。可能采取的手术方式为（）。

- A. 胆囊切除
- B. 胃穿孔修补
- C. 肠切除吻合
- D. 胆管切开取石、T管引流
- E. 胰腺切除
- F. 胰、十二指肠切除

正确答案：A, D

50、单选 男性，46岁。右肾区疼痛，间歇性肾绞痛1个月。尿检：红细胞10~15个/HP，B超检查：左肾积水轻一中度，IVU检查：左输尿管上段有一1.0cm的结石，结石以上输尿管扩张1.2cm，双侧肾盂肾盏显影好。配合的治疗方法中，不正确的是（）。

- A. 应用解痉药
- B. 利尿药双氢克尿噻
- C. 多饮水每天排尿2000ml以上

D. 每天服用止痛药

E. 应用排石中药

正确答案：D

51、填空题 性乳腺炎手术治疗要求切口应（）乳房后脓肿可（）。

正确答案：沿乳管方向呈放射状；沿乳房下缘作弧形切口

52、单选 男，30岁。2年来反复尿频，尿急，尿痛，自服抗生素治疗后症状无明显改善，近1个月来，症状加重，尿频次数明显增加，约30次/日，伴有终末肉眼血尿，自服药物治疗无效。门诊首先应考虑诊断（）。

A. 慢性膀胱尿道炎

B. 慢性肾盂肾炎

C. 慢性前列腺炎

D. 膀胱结石

E. 肾结核

正确答案：E

53、单选 男，42岁。右颈前气管三角区可及多发肿大淋巴结，质硬，较固定，最常见的病因（）。

A. 急性扁桃体炎

B. 乳腺癌

C. 肺结核

D. 甲状腺癌

E. 肺癌

正确答案：D

54、多选 男，32岁。于1年前出现尿频，尿急，尿痛，症状反复，抗感染治疗效果不明显，近2个月出现脓尿及终末肉眼血尿，膀胱刺激症状加重，伴有恶心，发热，左侧腰部胀痛。患者就诊后，应最先选择以下哪些检查（）。

A. 静脉肾盂造影

B. 泌尿系统血管造影

C. 尿常规

D. 胸部X线检查

E. 尿沉渣查抗酸杆菌

F. 膀胱镜

正确答案：A, C, D, E

55、填空题 空腔器官破裂的临床表现主要为（）。

正确答案：腹膜炎征候群

56、填空题 胆道结石、感染、寄生虫病等治疗不及时可发生如下并发症（）、（）、（）、（）。

正确答案：胆囊和胆管穿孔；胆道出血；胆源性细菌性肝脓肿；胆管炎性狭窄

57、单选 男性病人，75 岁，突发左下肢冷、痛、麻木 8 小时。有心房纤维颤动史。体检：左小腿中下 1/3 以下皮温明显降低，足部发绀，患肢无肿胀。双侧股动脉搏动可扪及，左侧腘动脉、足背动脉、胫后动脉搏动均消失，右腘动脉、足背和胫后动脉搏动好。该病人的初步诊断是（）。

- A. 左下肢血栓性闭塞性脉管炎
- B. 左下肢静脉血栓形成
- C. 左下肢动脉栓塞
- D. 左下肢大隐静脉曲张
- E. 雷诺综合征

正确答案：C

58、单选 男性病人，75 岁，突发左下肢冷、痛、麻木 8 小时。有心房纤维颤动史。体检：左小腿中下 1/3 以下皮温明显降低，足部发绀，患肢无肿胀。双侧股动脉搏动可扪及，左侧腘动脉、足背动脉、胫后动脉搏动均消失，右腘动脉、足背和胫后动脉搏动好。应该进行何种处理方式（）。

- A. 肌筋膜间隔切开术
- B. 截肢术
- C. 导管溶栓术
- D. 静脉取栓术
- E. 动脉取栓术

正确答案：E

59、单选 不能引起特异性感染的是（）。

- A. 破伤风杆菌
- B. 结核杆菌
- C. 绿脓杆菌
- D. 真菌
- E. 梭状芽孢杆菌

正确答案：C

参考解析：特异性感染指破伤风杆菌、梭状芽孢杆菌、真菌、结核杆菌等感染。

60、单选 男性，42 岁。B 超发现左肾结石 1cm 大小，平时无明显症状，偶有腰部酸胀不适感。既往体健，无排石史。患者的治疗可采取（）。

- A. 肾盂切开取石
- B. 经皮肾镜取石
- C. 口服排石药物
- D. 体外冲击波碎石
- E. 溶石治疗

正确答案：D

61、单选 脓液有甜腥臭味的是（）。

A. 大肠杆菌

- B. 拟杆菌
- C. 绿脓杆菌
- D. 溶血性链球菌
- E. 金黄色葡萄球菌

正确答案：C

62、单选 男，33岁。2周前开始出现牙痛，牙龈肿胀，20小时前突然出现左颈部肿胀、剧痛，伴高热。查体：左颈部肿胀，张力大，压痛，无结节。处理原则是（）。

- A. 长期抗生素治疗
- B. 穿刺引流
- C. 不可行气管切开
- D. 早期切开引流
- E. 避免手术治疗

正确答案：D

63、单选 女，32岁，主诉右乳胀痛，与月经周期有关，检查乳房有多个结节状肿块，边界不清，可推动，诊断首先考虑（）。

- A. 乳腺癌
- B. 乳房纤维腺瘤
- C. 乳房囊性增生病
- D. 乳管内乳头状瘤
- E. 乳房肉瘤

正确答案：C

参考解析：几种常见的乳房肿块的鉴别：

①纤维腺瘤 20~25岁多见，病程缓慢，无疼痛，单发肿块，边界清，活动度良好，无转移，无脓肿。

②乳房囊性增生 20~40岁多见，病程缓慢，周期性疼痛，多数成串，边界不清，活动度良好，无转移，无脓肿。

③乳管内乳头状瘤 40~50岁多见，病程缓慢，无疼痛，单发肿块，边界清，活动度良好，无转移，无脓肿。

④乳癌 40~60岁多见，病程快，无疼痛，单发肿块，边界不清，活动度不良，局部淋巴结肿大，无脓肿。

⑤肉瘤 40~50岁多见，病程快，无疼痛，单发肿块，边界清，活动度良好。

64、多选 清创时伤口的处理原则是（）。

- A. 去除异物，切除失去生机的组织
- B. 尽量保留头、面、手部皮肤组织
- C. 较大的游离骨片，清创后放回原处
- D. 受伤的肌腱、神经尽量恢复
- E. 体腔部位的伤口原则上一期缝合

正确答案：A, B, C, D, E

65、单选 下肢大隐静脉瓣膜功能不全（）。

- A. Trendelenberg 试验（+）
- B. Perthes 试验（+）
- C. Pratt 试验（+）
- D. Buerger 试验（+）
- E. Trendelenberg 试验（-）

正确答案：A

66、单选 女，50岁，因患短肠综合征，予全胃肠外营养（TPN）治疗。应用一周时病人出现昏迷，但尿内无酮体。病人既往曾有空腹血糖高（11mmol/L）。此病人的诊断是（）。

- A. 高渗性非酮性昏迷
- B. 肝性昏迷
- C. 导管感染败血症
- D. 糖尿病昏迷
- E. 代谢性酸中毒

正确答案：A

67、单选 患者，女，9岁，右足底被铁锈钉刺伤1周，突然出现张口困难，继之出现苦笑面容，角弓反张，声响及触碰病人可诱发上述症状，病人神志清楚，不发热。该病属于（）。

- A. 毒血症
- B. 菌血症
- C. 败血症
- D. 脓血症
- E. 脓毒血症

正确答案：A

68、填空题 甲状腺术后饮水呛咳是因为（）。

正确答案：喉上神经损伤

69、填空题 直肠下端有数个纵形皱襞称为（）。

正确答案：肛柱

70、填空题 Charcot 三联征包括（）、（）、（）。

正确答案：腹痛；黄疸；畏寒发热

71、单选 判断血管有无痉挛应做（）。

- A. 肢位位置试验（Buerger 试验）
- B. 硫酸镁静脉滴注试验
- C. 交感神经阻滞试验
- D. 下肢动脉搏动试验
- E. 动脉造影

正确答案：C

参考解析：施行腰交感神经阻滞试验，如阻滞皮肤测温升高超过 $1\sim 2^{\circ}\text{C}$ ，提示痉挛因素占主要。

72、填空题 腹内器官组织损伤可能有（）、（）和（）三种病变。

正确答案：有腔器官破裂；实质器官破裂；血管破裂

73、单选 女，50岁，因患短肠综合征，予全胃肠外营养（TPN）治疗。应用一周时病人出现昏迷，但尿内无酮体。病人既往曾有空腹血糖高（ 11mmol/L ）。此病的预防主要是（）。

- A. 开始一周内注意葡萄糖输注的浓度、速度和与胰岛素的比例
- B. 加强保肝
- C. 加强导管护理、无菌操作
- D. 纠正水和电解质紊乱，预防酸中毒发生
- E. 保护肾功能

正确答案：A

74、单选 男，70岁，上唇一个毛囊尖处出现红肿、疼痛的结节，中央部有灰黄色小脓栓形成，错误的处置是（）。

- A. 休息
- B. 外敷鱼石脂膏
- C. 挤出脓栓，以利引流
- D. 应用抗生素
- E. 湿热敷

正确答案：C

参考解析：面部危险三角区的疖，因挤压结肿可能引起化脓性海绵状静脉窦炎，导致生命危险。故应避免挤压。

75、填空题 实质器官和血管破裂主要以（）为主要表现。

正确答案：急性失血征候群（失血性休克征候群）

76、单选 肛周脓肿（）。

- A. 不凝的血性液体
 - B. 黄绿色透明液体，无臭味
 - C. 稀脓性液体，略带臭味
 - D. 淡黄色透明液体
 - E. 黄绿色稠厚液体，带有粪便样特殊臭味
- 下列疾病的穿刺液分别是以上哪种液体

正确答案：C

77、多选 开放性损伤的伤口分类是（）。

- A. 清洁伤口
- B. 污染伤口
- C. 感染伤口

D. 新鲜伤口

E. 陈旧伤口

正确答案：A, B, C, D

78、填空题 肠外营养根据输入途径可分为经（）肠外营养和经（）肠外营养。

正确答案：防御能力；污染细菌

79、单选 男性，70岁。排尿困难2年。腹部平片提示膀胱区有2.0cm椭圆形致密影。患者典型的临床症状是（）。

A. 膀胱刺激症状

B. 进行性排尿困难

C. 血尿

D. 腰痛、血尿、脓尿

E. 尿流中断，改变体位后好转

正确答案：E

80、填空题 发生绞窄性肠梗阻的原因为（）、（）、（）等。

正确答案：肠系膜血管受压；血栓形成；栓塞

81、单选 肝炎后肝硬化引起（）。

A. 门静脉高压症的主要阻塞部位在窦前

B. 门静脉高压症的主要阻塞部位在窦后

C. 门静脉高压症的主要阻塞部位在窦后和肝窦

D. 门静脉高压症的主要阻塞部位在肝前

E. 门静脉高压症的主要阻塞部位在肝后

正确答案：C

参考解析：门脉高压症分为肝前型、肝内型和肝后型三类。在肝内型又分为窦前阻塞、肝窦和窦后阻塞两种。

82、单选 患者，女，9岁，右足底被铁锈钉刺伤1周，突然出现张口困难，继之出现苦笑面容，角弓反张，声响及触碰病人可诱发上述症状，病人神志清楚，不发热。对机体威胁最大的是（）。

A. 肌肉断裂

B. 骨折

C. 尿潴留

D. 持续的呼吸肌痉挛

E. 营养障碍

正确答案：D

83、单选 结肠破裂修补术后5天，病人血钠136.0mmol/L，血钾6.8mmol/L，血pH值7.3，近24小时尿量520ml，应诊断为（）。

A. 低渗性脱水

B. 高渗性脱水

- C. 低钾血症
- D. 高钾血症
- E. 低钾合并等渗性脱水

正确答案：D

参考解析：血钾超过 5.5mmol/L 即可诊断为高钾血症。

84、单选 患者，女，9岁，右足底被铁锈钉刺伤1周，突然出现张口困难，继之出现苦笑面容，角弓反张，声响及触碰病人可诱发上述症状，病人神志清楚，不发热。该病致病菌属于（）。

- A. 革兰染色阴性大肠杆菌
- B. 革兰染色阴性厌氧拟杆菌
- C. 革兰染色阴性变形杆菌
- D. 革兰染色阳性梭形芽孢杆菌
- E. 革兰染色阳性厌氧芽孢杆菌

正确答案：E

85、多选 感染伤口的处理原则是（）。

- A. 控制感染
- B. 清创后延期缝合
- C. 加强换药
- D. 清创缝合
- E. 全身支持疗法

正确答案：A, B, C, E

86、单选 男性，32岁，既往健康，有烟酒嗜好。1年前发现左上肢“红线”，伴肿硬，压痛。5个月前感觉右下肢凉、怕冷，麻木，行走200米出现小腿疼痛。近1个月症状加重，出现夜间疼痛。查体：右下肢发绀，皮温凉，右股动脉弹性好，足背胫后动脉搏动未触及。诊断应考虑为（）。

- A. 右下肢血栓性浅静脉炎
- B. 下肢静脉曲张
- C. 动脉硬化闭塞症
- D. 血栓闭塞性脉管炎
- E. 下肢深静脉血栓

正确答案：D

参考解析：患者1年前发现左上肢“红线”，伴肿硬、压痛，是血栓性浅静脉炎的表现，而目前出现间歇性跛行。

87、多选 腹外疝嵌顿的原因包括（）。

- A. 腹内压力突然升高
- B. 疝环小
- C. 粪便嵌顿
- D. 腹壁肌肉紧张收缩内环

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/545211304341011211>