

## 第二章 女性生殖系统解剖与生理

### 一、选择题

#### A<sub>1</sub>型题

1.受雌激素影响而发生周期性脱落的子宫组织结构是（ ）

A . 黏膜层    B . 肌层    C . 浆膜层    D . 基底层    **E . 功能层**

2.正常骨盆的形态是（ ）

A . 骨盆的三个假想平面均呈纵椭圆形

B . 骨盆的三个假想平面均呈横椭圆形

C . 骨盆的入口和中骨盆平面为纵椭圆形，出口平面呈两个不同平面的三角形

**D . 骨盆入口平面呈横椭圆形，中骨盆平面呈纵椭圆形，出口平面呈两个不同平面的三角形**

E . 骨盆入口及出口平面呈横椭圆形，中骨盆呈纵椭圆形

3.保持正常子宫前倾位置的主要韧带是（ ）

A . 阔韧带    **B . 圆韧带**    C . 主韧带    D . 宫骶韧带    E . 骶结节韧带

5.成年妇女宫体与宫颈的比例为( )

A. 1:1    B. 1:2    C. 1:3    **D. 2:1**    E. 3:1

6.患者女性, 月经规则, 月经史: 13 5/26, 排卵时间一般在月经周期的( )

A. 第5天    **B. 第12天**    C. 第14天    D. 第16天    E. 第19天

7. 患者女性, 初潮13岁, 周期24~28天, 经期4~5天, 应简写为( )

**A. 13 (4~5) / (24~28) 天**    B. 13 (24~28) / (4~5) 天

C. 13 (4~5) / (24~28) 天    D. 13 / (24~28) (4~5) 天

E. (24~28) / (4~5) 13 天

(8~11 共用备选答案)

A. 主韧带    B. 阔韧带    C. 圆韧带    D. 宫骶韧带    E. 骶结节韧带

8.起自子宫角前面, 终止于大阴唇前段的韧带是( C )

9.起自子宫侧缘, 终止于骨盆壁的韧带是( B )

10.横行于宫颈两侧和骨盆侧壁之间的韧带是( A )

11.起自宫颈侧后方，终止于第 2、3 骶椎前的韧带是（ D ）

### 第三章妊娠期妇女的护理

#### 一、选择题

1.下列不属于胎儿的附属物是（ C ）

A . 胎盘    B . 脐带    C . 蜕膜    D . 羊水    E . 胎膜

2.妊娠期孕妇的循环及血液系统变化，下列描述正确的是（ A ）

A . 出现生理性贫血    B . 血浆减少    C . 红细胞减少    D . 心排出量减少    E . 心率减慢

3.关于胎盘的防御功能，下列哪项是正确的（ D ）

A . 胎盘的屏障功能是很强的    B . 结核菌、疟原虫不能进入胎儿体内

C . 流感、风疹等病毒不能感染胎儿    D . IgG 可以通过胎盘传给胎儿

E . 药物不能通过胎盘而影响胎儿或致畸

4 . 妊娠 24 周末，宫底高度位于（ A ）

A . 脐上一横指    B . 脐下一横指    C . 剑突与脐连线的中间位置

D . 脐上二横指      E . 剑突下三横指

5.左枕前位时，胎儿的枕骨在母体骨盆的（ A ）

A . 左前方   B . 右前方   C . 左侧   D . 右侧   E . 左后方

6.初孕妇初次能感觉胎动的时间是（ C ）

A . 14~16周   B . 15~18周   C . 18~20周   D . 20~24周   E . 24周以上

7.下列有关早妊娠的辅助诊断，哪项最可靠（ B ）

A . 妊娠尿试验阳性   B . B超检查可见胎心搏动、胎囊   C . 黄体酮试验阴性

D . 基础体温高温相超过3周不下降      E . 双合诊检查子宫增大

8. 子宫峡部于妊娠后拉长变薄形成子宫下段，最长可达（ E ）

A . 2~3cm   B . 3~5cm      C . 5~7cm      D . 6~8cm      E . 7~10cm

9.妊娠12周后，孕妇尿频症状消失是因为（ B ）

A . 孕妇饮水减少   B . 增大的子宫出盆腔   C . 使用药物治疗   D . 胎位异常   E . 水钠潴留

10.孕妇出现尿频、尿急现象，正确的处理措施是（ E ）

A 嘱孕妇保证充足的睡眠    B 嘱孕妇多饮水    C 给予抗感染药物口服

D 给予抗利尿药物口服    E 是妊娠期正常的生理变化，不必处理

11.某孕妇产前检查时，宫高为剑突下 2 横指，则该孕妇的妊娠周数大约为（ D ）

A . 满 24 周    B . 满 28 周    C . 满 32 周    D . 满 36 周    E . 满 40 周

12.孕妇，27 岁。末次月经 2007 年 3 月 14 日，该孕妇的预产期是（ B ）

A . 2007 年 11 月 21 日    B . 2007 年 12 月 21 日    C . 2007 年 10 月 21 日

D . 2007 年 11 月 28 日    E . 2007 年 12 月 28 日

13 . 27 岁妇女，平时月经周期规律，现停经 48 天，近几天晨起恶心、厌油，有尿频症状，诊断为（ ）C

A. 病毒性肝炎    B.肾盂肾炎    C.早期妊娠    D.妊娠剧吐    E.继发性肝炎

## 第四章分娩期妇女的护理

### 一、选择题

1.子宫收缩起始于两侧宫角部，迅速向子宫底中线集中，再向子宫下段扩散，并均匀协调地遍及整个子宫。这种特性称为子宫收缩的（ C ）

A . 极性    B . 节律性    C . 对称性    D . 缩复作用    E . 间歇性

2.下列不属于软产道组成成分的是 ( E )

A . 子宫颈    B . 阴道    C . 骨盆底软组织    D . 子宫下段    E . 尿道

3.第二产程新生儿娩出后，首先的护理措施为 ( D )

A . 保暖    B . APgA r 评分    C . 系手圈    D . 清理呼吸道    E . 体格检查

4.在第二产程中，宫缩时，可协助胎先露在骨盆腔内完成内旋转及仰伸的力量是( D )

A 子宫收缩力    B . 腹肌收缩力    C . 膈肌收缩力    D . 肛提肌收缩力    E . 盆底肌肉收缩力

5.在分娩过程中，因产妇的精神心理因素不会带来的改变是 ( E )

A . 产程延长    B . 血压升高    C . 胎儿窘迫    D . 呼吸急促    E . 胎位异常

6.骨盆的出口横径的是指 ( C )

A 髂棘间径    B 髂嵴间径    C 坐骨结节间径    D 坐骨棘间径    E 骶耻外径

7.产妇送入产房准备接生的指征正确的是 ( E )

A 初产妇、经产妇有规律收缩时    B 初产妇宫口开至 3 ~ 4cm 经产妇宫口开大 10cm

且宫缩好

C 初产妇宫口开至 3~4cm，经产妇宫口开大 3~4cm 且宫缩好

D 初产妇宫口开至 10cm，经产妇宫口开大 10cm 且宫缩好

E 初产妇宫口开至 10cm，经产妇宫口开大 3~4cm 且宫缩好

8. 一产妇，G<sub>1</sub>P<sub>1</sub>，孕 40 周，因羊水Ⅲ度粪染产钳分娩，新生儿出生 1 分钟时心率 90 次/分，呼吸 20 次/分，不规则，四肢屈肌张力略小，吸痰有喉反射，肤色青紫，正确的 APGAR 评分应是 ( C )

A. 4 分    B. 5 分    C. 6 分    D. 7 分    E. 8 分

9. 产妇 29 岁，孕 39 周，头位，胎膜未破，宫口开全，S+2，胎心 120 次/分，宫缩 4~5 分钟一次，持续 30 秒，强度稍差，骨盆正常，胎儿估计 3200g，下列哪项处理不恰当。( D )

A. 静脉点滴缩宫素    B. 吸氧    C. 人工破膜    D. 肌肉注射派替啶    E. 胎心监护

10. 胎头最大的横径是 ( A )

A. 双顶径    B. 枕额径    C. 枕下前凶径    D. 枕颞径    E. 枕上前凶径

## 第五章 产褥期管理

## 一、选择题

1.产后腹部检查时，如果扪不到子宫底部，此产妇大约在产后的（ E ）

A . 第 1 天    B . 第 3 天    C . 第 5 天    D . 第 7 天    E . 第 10 天

2 . 产后如恶露呈持续性深红色恶露，应怀疑（ D ）

A . 宫腔感染    B . 胎盘残留    C . 会阴软组织裂伤    D . 宫缩乏力    E . 凝血功能障碍

3.会阴伤口部位有硬结发生时用（ E ）

A . 1 : 2000 新洁尔灭溶液擦洗    B . 95%酒精或 50%硫酸镁湿热敷

C . 远红外灯照射    D . 切开    E . 大黄、芒硝外敷

4.下列措施中有促进乳汁分泌作用的是（ A ）

A . 吸吮刺激    B . 孕激素刺激    C . 大量雌激素    D . 前列腺素    E . 甾体激素

5.预防产后乳房胀痛，不正确的措施是（ C ）

A . 分娩后马上吸吮    B . 确保正确的含接姿势    C . 坚持按时喂哺

D . 做到充分有效的吸吮    E . 按需哺乳



6.产后子宫基本完成修复的时间是产后 ( A )

A . 6周    B . 5周    C . 4周    D . 3周    E . 2周

7.产妇产后 4~6 小时应排尿的原因是 ( D )

A 利于伤口恢复    B 利于产妇舒适    C 利于产妇活动    D 利于子宫收缩    E 利于乳汁分泌

8 . 某产妇 , 产后第 8 天 , 乳汁分泌良好 , 并母乳喂养 , 请问此时间新生儿吃到的是 ( ) C

A.初乳    B.成熟乳    C.过渡乳    D.前奶    E.后奶

## 第六章 高危妊娠管理

### 一、选择题

1.下列因素中哪一个不属于高危儿的高危因素 ( B )

A 孕龄 < 37 周或 ≥ 42 周    B 出生体重 2500g    C .产时有感染    D.手术产儿    E.大于孕龄儿

2.妊娠图中最主要的曲线为 ( E )

A . 体重    B . 血压    C . 腹围    D . 双顶径值    E . 宫底高度

3.正常胎心率为 ( C )

A.少于 100 次 / 分 B.少于 120 次 / 分 C.120 ~ 160 次 / 分

D . > 160 次 / 分 E . > 180 次 / 分

( 4 ~ 6 共用备选答案 )

A . 药物治疗 B . 清理呼吸道 C . 评价 D . 维持正常循环 E . 建立呼吸

4.新生儿窒息 ABCDE 复苏程序中,“B”是指 ( E )

5. 新生儿窒息 ABCDE 复苏程序中,“C”是指 ( D )

6. 新生儿窒息 ABCDE 复苏程序中,“D”是指 ( A )

## 第七章 妊娠期并发症妇女的护理

### 一、选择题

1.下列可以导致胎盘早剥的情况是 ( D )

A . 缩宫素引产 B . 孕妇左侧卧位 C . 孕妇行走时间过长 D . 脐带过短 E . 妊娠水肿

2.引起输卵管妊娠的常见原因是 ( C )

A.输卵管发育不良 B.内分泌失调 C.输卵管炎 D.输卵管功能异常 E.神经精神功能紊乱

3.输卵管妊娠最常见的部位是 ( B )

A.输卵管间质部 B.输卵管壶腹部 C.输卵管伞端 D.输卵管峡部 E.输卵管伞底部

4.护士在对输卵管妊娠患者进行护理评估时，下列叙述正确的是 ( E )

A.患者月经过期，说明患者有停经史 B.阴道后穹穿刺阴性说明不存在输卵管妊娠

C.阴道流血不多说明腹腔内出血量也不多 D.腹腔内大量出血患者需行腹腔镜进一步检查

E.出血增多、腹痛加剧、肛门坠胀感明显是患者病情发展的指征

5.关于胎盘早剥，下列叙述正确的是 ( D )

A.阴道流血量与病情严重程度呈正比 B.以无诱因、无痛性反复阴道流血为特点

C.是妊娠早期的一种严重并发症起病急进展快 D.胎盘早剥孕妇的子宫硬如板状有压痛

E.确诊后可选择期待疗法或终止妊娠

6.妊娠期高血压综合征的治疗原则是（ E ）

A . 降压、解痉、镇静、合理扩容及利尿，适时终止妊娠

B . 镇静、解痉、降压、合理扩容及利尿，适时终止妊娠

C . 合理扩容及利尿、解痉、降压、镇静，适时终止妊娠

D . 适时终止妊娠，解痉、降压、镇静、合理扩容及利尿

E . 解痉、降压、镇静、合理扩容及利尿，适时终止妊娠

7.前置胎盘孕妇，产科检查的结果是（ A ）

A . 子宫大小与停经月份一致，胎方位清楚，先露高浮

B . 子宫大于停经月份，胎方位清楚，先露高浮

C . 子宫大于停经月份，胎方位清楚，先露已入盆

D . 子宫小于停经月份，胎方位清楚，先露高浮

E . 子宫小于停经月份，胎方位清楚，先露已入盆

8.针对异位妊娠接受非手术治疗患者护理要点不妥的是（ E ）

A . 指导卧床休息，避免腹部压力增大    B . 禁止性生活    C . 摄入清淡易消化饮食

D . 严密监测生命体征    E . 阴道出血量多提示腹腔内出血量也多，需要立即手术

9.胎盘早剥的主要病理变化是（ B ）

A . 全身小动脉痉挛    B . 底蜕膜出血    C . 子宫异常收缩    D . 胎膜早破    E . 羊水过多

10.羊水过多但仍为正常胎儿者，正确的处理方法是（ D ）

A . 缩宫素引产    B . 立即剖宫产    C . 胎吸引产

D . 应根据羊水过多的程度与胎龄决定处理方法    E . 顺其自然，无需处理

11.硫酸镁的中毒现象首先表现为（ A ）

A 膝反射减弱或消失    B 呼吸减慢    C 心率减慢    D 尿量减少    E 血压下降

12.前置胎盘的主要临床症状是（ B ）

A 妊娠期腹痛、阴道流血    B 妊娠晚期或临产时，发生无诱因、无痛性反复阴道流血

C 妊娠期无诱因、无痛性反复阴道流血

D 妊娠晚期或临产时，发生无诱因、无痛性反复阴道流血、伴腹痛

E 妊娠晚期或临产时阴道流血

13. 某产妇，停经 50 天出现阴道少量流血，伴轻微下腹痛。妇科检查发现该产妇宫颈口关闭，子宫增大，约孕 50 天大小，妊娠试验阳性。该孕妇最可能的诊断是 ( D )

A . 难免流产    B . 不全流产    C . 习惯性流产    D . 先兆流产    E . 完全流产

14. 孕妇，妊娠 36 周，主诉头晕、头痛、视物模糊、恶心。查血压 160/110mmHg，尿蛋白 6g/24h，诊断可能性最大为 ( D )

A . 轻度妊高征    B . 中度妊高征    C . 妊娠水肿    D . 先兆子痫    E . 子痫

15. 孕妇，妊娠 37 周，无诱因性阴道出血约 200ml，腹部检查：腹软无压痛，胎位清楚，胎心 158 次/分，阴道可见少量活动性出血，最可能的诊断是 ( C )

A . 胎盘早剥    B . 早产    C . 前置胎盘    D . 妊娠期高血压疾病    E . 凝血功能障碍

16. 孕妇，妊娠 38 周，突然感到剧烈腹痛，并伴少量阴道流血。检查：血压 150/110mmHg，子宫似足月妊娠大小，硬如板，有压痛，胎位不清，最可能的诊断是 ( E )

A . 见红    B . 临产    C . 前置胎盘    D . 早产    E . 胎盘早剥

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/546022113240010043>