

## 2024 年甘肃省《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库及答案【名校卷】

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1.（2017 年真题）有较强刺激性服药时不可嚼碎的泻药是（）

- A: 双歧杆菌
- B: 硫酸镁
- C: 干酵母
- D: 比沙可啶

答案：D

2.（2019 年真题）正常剂量氯化钾的妊娠毒性分级是

- A: B 级
- B: A 级
- C: C 级
- D: X 级

答案：B

3.对服用抗蠕虫药后出现腹痛或口吐蛔虫的严重感染患者，应加服

- A: 噻嘧啶
- B: 枸橼酸哌嗪
- C: 伊维菌素
- D: 甲苯咪唑

答案：A

4. 可中和碘类物质中毒的洗胃液是

- A: 3%鞣酸溶液
- B: 活性炭混悬液
- C: 1: 5000 高锰酸钾
- D: 淀粉溶液

**答案: D**

5. 具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类似物是

- A: 普通胰岛素
- B: 预混胰岛素
- C: 低精蛋白锌胰岛素
- D: 甘精胰岛素

**答案: D**

6. 依据生物钟规律，适宜清晨服药的是

- A: 抗过敏药
- B: 抗忧郁药
- C: 调节血脂药
- D: 平喘药

**答案: B**

7. 糖尿病合并肾病者应首选的药物是

- A: 格列喹酮
- B: 阿卡波糖
- C: 二甲双胍
- D: 罗格列酮

**答案: A**

8. 对目标适应证患者的治疗作用的初步评价是指

- A: II 期临床试验
- B: I 期临床试验
- C: III 期临床试验
- D: 临床预试验

**答案：A**

9. (2019 年真题) 患者，男，68 岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天入院。查体：体温 39.1℃，血压 138/80mmHg，心率 102 次/分，呼吸 32 次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数  $11.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A: 衣原体
- B: 铜绿假单胞菌
- C: 肺炎链球菌
- D: 支原体

**答案：B**

10. 孕妇、绝经后女性及骨质疏松患者可适当选服

- A: 复合营养素
- B: 复合维生素
- C: 中草药制剂
- D: 钙剂

**答案：D**

11. 属于浓度依赖性抗菌药，评估此类药物的 PK / PD 参数主要有  $C_{max} / MIC$  或  $AUC_{0 \sim 24} / MIC$ ，提高此类抗菌药物疗效的策略主要是提高  $C_{max}$ ，一般推荐日剂量单次给药方案的药物是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- A: 利奈唑胺
- B: 左氧氟沙星
- C: 头孢克洛
- D: 氨茶碱

**答案：B**

12. 真菌引起阴道炎（）

- A: 甲硝唑
- B: 聚甲酚磺醛
- C: 咪康唑
- D: 庆大霉素

**答案：C**

13. 对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

- A: 17 $\beta$  一雌二醇
- B: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片
- C: 雌二醇一屈螺酮片
- D: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片

**答案：D**

14. 水杨酸、萘甲唑啉等局部用药可引起中毒，即

- A: 药物代谢
- B: 药物吸收
- C: 药物中毒
- D: 药物分布

**答案：B**

15. 主要用于吗啡、哌替啶急性中毒解救的是

- A: 谷胱甘肽
- B: 盐酸烯丙吗啡
- C: 亚硝酸钠
- D: 双解磷

**答案：B**

16. 接种乙肝疫苗可产生哪种抗体( )。

- A: HBeAg
- B: HBsAg
- C: HBsAb
- D: HBeAb

**答案：C**

17. S-1 兰索拉唑在体内代谢的主要肝药酶是

- A: CYP2C8
- B: CYP2C9
- C: CYP2C19
- D: CYP1A2

**答案：C**

18. 柔道运动员使用后，可在短时间内急速降低体重，因此按兴奋剂管理的药物是

- A: 利血平
- B: 依那普利
- C: 阿替洛尔
- D: 氢氯噻嗪

**答案：D**

19. 静脉滴注阿昔洛韦的适宜溶媒是

- A: 复方氯化钠注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 0.9%氯化钠注射液
- D: 5%葡萄糖注射液

**答案：C**

20. 与烟酸合用可能引起横纹肌溶解症的是

- A: 辛伐他汀
- B: 卡那霉素
- C: 吲哚美辛
- D: 万古霉素

**答案：A**

21. 以下对"发热的指标"的叙述中，不正确的是

- A: 腋下温度超过 37.0℃
- B: 直肠温度超过 37.6℃
- C: 腋下温度超过 36.6℃
- D: 口腔温度超过 37.3℃

**答案：C**

22. 患者，女，20岁，长期服用对乙酰氨基酚缓解痛经，为降低药物的肝毒性，可联合使用

- A: N-乙酰半胱氨酸
- B: 青霉胺
- C: 纳洛酮
- D: 亚甲蓝

**答案：A**

23. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A: 毛花苷丙

B: 硝普钠

C: 卡托普利

D: 阿替洛尔

**答案：A**

24. 与两性霉素 B 合用在体外有拮抗作用

A: 链霉素

B: 酮康唑

C: 碳酸氢钠

D: 强心苷

**答案：B**

25. 患者，女，23 岁，正在服用短效复方口服避孕药，但避孕失败，怀疑与服用的其他药物有关，可能造成这种结果的药物是

A: 卡马西平

B: 克拉霉素

C: 胺碘酮

D: 伊曲康唑

**答案：A**

26. 华法林不会在乳汁中出现的机制是

A: 解离度大

- B: 呈弱碱性
- C: 呈弱酸性
- D: 在母体血浆中处于结合状态

**答案：D**

27. 治疗胃食管反流病，铝碳酸镁的正确服药时间是

- A: 早餐前 30min
- B: 症状发作时、餐后 1.5h 和睡前
- C: 三餐前 30min
- D: 餐后、睡前

**答案：B**

28. 可致驾驶员排尿增多、视力改变的是

- A: 阿米洛利
- B: 东莨菪碱
- C: 阿司匹林
- D: 氯苯那敏

**答案：A**

29. 夜间咳嗽宜选用的药品是

- A: 右美沙芬
- B: 羧甲司坦
- C: 苯丙哌林
- D: 可待因

**答案：A**

30. 同时患有滴虫及念珠菌性阴道炎应首选的药品是

- A: 甲硝唑

B: 硝酸咪康唑

C: 制霉菌素

D: 曲古霉素

**答案：D**

31. 治疗癌症疼痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘，可选择的药物是

A: 乳果糖

B: 硫酸镁

C: 比沙可啶

D: 东莨菪碱

**答案：A**

32. 与硫酸亚铁合用，可减少铁吸收的药物是

A: 克拉维酸钾

B: 苯丝肼

C: 叶酸

D: 奥美拉唑

**答案：D**

33. 属于超短效的胰岛素制剂是

A: 精蛋白锌胰岛素

B: 甘精胰岛素

C: 赖脯胰岛素

D: 低精蛋白锌胰岛素

**答案：C**

34. 痛经症状严重者可选用的处方药为

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 布洛芬
- C: 贝诺酯
- D: 可待因

**答案：D**

35. 患者，女，45 岁，身高 160cm，体重 75KG，临床诊断 2 型糖尿病，实验室检查，空腹血糖 5.7mmol/L(参考值范围 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 15.1mmol/L(正常值<7.6mmol/L)，糖化红蛋白 7.1%(正常值 4.8%~6.0%)，经饮食控制、规律锻炼、血糖控制认为达到理想水平。

- A: 胰岛素+二甲双胍
- B: 二甲双胍
- C: 格列齐特
- D: 胰岛素

**答案：B**

36. 患者，男，56 岁，以发热、左侧胸廓剧痛就诊。查体：体温 38.8℃，左侧沿第四肋走向有簇集性水疱。

- A: 阿昔洛韦
- B: 恩替卡韦
- C: 奥司他韦
- D: 利巴韦林

**答案：A**

37. II 期临床试验很难发现“低于 1%发生频率”的不良反应，缘于

- A: 病例数目少
- B: 考察不全面
- C: 观察时间短

D: 管理漏洞

**答案: A**

38. 可出现痤疮样皮疹的是 ( )

A: 吉非替尼

B: 阿霉素

C: 氟尿嘧啶

D: 博来霉素

**答案: A**

39. 属于非核苷类逆转录酶抑制剂的是

A: 利托那韦

B: 齐多夫定

C: 依非韦伦

D: 利巴韦林

**答案: C**

40. 以餐后血糖升高为主，伴有餐前血糖轻度升高可以应用

A:  $\alpha$ -糖苷酶抑制剂

B: 胰岛素增敏剂

C: 磺酰脲类

D: 胰岛素注射液

**答案: A**

41. 哺乳期妇女使用，易诱发新生儿胆红素脑病的药物是 ( )

A: 依那普利

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 复方炔诺酮

D: 胰岛素

**答案：B**

42. (用药与尿液检查异常)阿司匹林可能引起

A: 尿肌酐

B: 尿血红蛋白

C: 尿酮体

D: 尿沉渣结晶

**答案：B**

43. (抗高血压药物的不良反应)，服用维拉帕米可能引起

A: 免疫失调

B: 直立性低血压

C: 房室传导阻滞

D: 多毛症

**答案：C**

44. 对肾功能不全患者的给药方案调整，说法正确的是

A: 可采用延长给药间隔法，即每次给药剂量不变而用药间隔延长，但该方法很难达到有效血药浓度

B: 尽可能选用经肝消除的药物，肝毒性大的药物不必减量

C: 必须使用具有明显肾毒性药物时，宜进行血药浓度监测，实行个体化给药

D: 可采用减量法给药，即每次剂量减少而用药间隔不变，但该法的血药浓度波动幅度较大

**答案：C**

45. 可提示肝细胞性黄疸的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- A:  $>342 \mu\text{mol/L}$
- B:  $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- C:  $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- D:  $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

**答案：C**

46. (2018 年真题) 患者, 女, 34 岁, 因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊, 化验结果显示 TSH 增高 FT<sub>3</sub>、FT<sub>4</sub> 减低, 临床诊断为甲状腺功能减退使用左甲状腺素钠  $100 \mu\text{gqd}$  治疗。药师对该患者的用药指导, 正确的是 ( )

- A: 早餐前半小时, 顿服
- B: 睡前顿服
- C: 早餐后半小时, 顿服
- D: 晚餐后顿服

**答案：A**

47. 某女性, 19 岁, 2 年前因上呼吸道感染后逐渐出现甲状腺肿大, 伴多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁, 根据血 T

- A: 亚急性甲状腺炎
- B: 单纯性甲状腺肿
- C: 甲状腺功能亢进
- D: 甲状腺功能减退

**答案：C**

48. 可引起驾驶员视力模糊的药物是

- A: 东莨菪碱
- B: 阿米洛利
- C: 双嘧达莫

D: 抗过敏药

**答案：A**

49. 普通胰岛素的作用峰时为()。

A: 6~12 小时

B: 0.6~1.5 小时

C: 1.5~4 小时

D: 0.25~0.5 小时

**答案：C**

50. 验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

A: I 期临床试验

B: III 期临床试验

C: 临床预试验

D: II 期临床试验

**答案：B**

51. 救治磷化锌中毒，不能应用的催吐药是

A: 阿扑吗啡

B: 硫酸镁

C: 硫酸铜

D: 硫酸钠

**答案：A**

52. 适宜清晨服用的是

A: 阿司匹林

B: 普伐他汀

C: 呋塞米

D: 格列美脲

**答案：C**

53. 下列药物中服用后可在乳汁中分泌较多的是

A: 头孢呋辛

B: 地西洋

C: 青霉素 G

D: 华法林

**答案：B**

54. (2016 年真题) 患者，男，45 岁，患有高血压，因感冒发热，咽痛，流鼻涕到药店买药，药师不应推荐其使用的药物是 ( )。

A: 维 C 银翘片

B: 速克感冒片

C: 复方酚咖伪麻胶囊

D: 速感宁胶囊

**答案：C**

55. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

A: 碳青霉烯类

B: 青霉素

C: 氯霉素

D: 头孢菌素

**答案：C**

56. 不能受潮的药品是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- A: 复方甘草合剂
- B: 阿卡波糖片
- C: 头孢曲松钠
- D: 硝酸甘油

**答案：B**

57. 根据中国营养学会推荐，老年人在每日饮食之外，应补充的元素钙剂量为 (??)

- A: 500—600mg
- B: 2000—4000mg
- C: 50mg
- D: 100mg

**答案：A**

58. 融合抑制剂

- A: 依非韦伦
- B: 利巴韦林
- C: 齐多夫定
- D: 利托那韦

**答案：B**

59. 长期应用苯二氮 (卞卓) 类药物不能突然停止使用，因其存在

- A: 后遗效应?
- B: 戒断症状?
- C: 首剂效应?
- D: 毒性反应?

**答案：B**

60. 药物警戒涉及与药品相关的研究和活动，但不包括

- A: 疫苗的不良反应
- B: 处方调配错误
- C: 药物的有效成分鉴定
- D: 药品超说明书用药

**答案：C**

61. 运输过程中应避免振荡，否则药物结构发生改变，可引起纯红细胞再生障碍性贫血的药物是

- A: 利巴韦林
- B: 人促红素
- C: 阿昔洛韦
- D: 脂肪乳

**答案：B**

62. 是否基于试验结果是评价

- A: 结果
- B: 摘要
- C: 讨论
- D: 前言

**答案：C**

63. 治疗结核病的患者的注意事项错误的是

- A: 口服抗结核药可自行决定饭后服用
- B: 患者所用食具应于餐后煮沸消毒
- C: 充分了解抗结核药物服用中可能出现的不良反应，一旦出现要及时报告医生
- D: 增强体质增加高蛋白和维生素的摄入，日光浴

**答案：A**

64. 关于药物 II 期临床试验，叙述正确的是

- A: 试验样本数一般为 20~30 例，试验对象为健康志愿者
- B: 治疗作用的初步评价阶段。初步评价药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性。试验对象为目标适应证患者，试验样本数多发病不少于 300 例，其中主要病种不少于 100 例，要求在 3 个及 3 个以上医院进行
- C: 治疗作用的初步评价阶段。初步评价药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性。试验对象为目标适应证患者，多发病不少于 300 例，其中主要病种不少于 100 例，要求在同一个医院进行
- D: 试验样本数常见病不少于 2000 例，考察药品在广泛使用条件下的疗效和不良反应。此期不限定单一用药

**答案：B**

65. 患者，男，60 岁，呈典型的“面具脸”“慌张步态”及“写字过小征”表现，确诊为帕金森病患者同时患有消化道溃疡，不宜选用的治疗药物是

- A: 氟西汀
- B: 卡马西平
- C: 多奈哌齐
- D: 左旋多巴

**答案：D**

66. 以下抗抑郁药物的合理使用中，叙述不正确的是（）

- A: 尽可能单一用药
- B: 显效慢即换药
- C: 个体化用药

D: 从小剂量开始

**答案: B**

67. 静滴 50%葡萄糖注射液 100ml+胰岛素 20U, 用于

A: 解救硝西泮中毒

B: 解救丙咪嗪中毒

C: 解救乙醇中毒

D: 解救可待因中毒

**答案: C**

68. 可以迅速缓解哮喘症状, 起效快的药品是

A:  $\beta$ -受体阻断剂

B: 吸入型糖皮质激素

C: 非甾体抗炎药

D: 短效  $\beta$ 2-受体激动剂

**答案: D**

69. 胃食管反流病的患者应避免使用的药物是

A: 阿仑膦酸钠

B: 阿司匹林

C: 特拉唑嗪

D: 美托洛尔

**答案: A**

70. 关于新型抗凝药物, 下列说法不正确的为

A: 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节

B: 需监测 INR

C: 与食物和药物相互作用小

D: 达比加群酯直接作用于凝血酶（IIa 因子）

**答案：B**

71. 能早期发现患者伤害、尽快地采取干预措施的是

A: 计算机检测方法

B: 直接观察

C: 岗位工作问责

D: 病历审查

**答案：A**

72. 美金刚的作用机制为（）

A: 钙通道阻滞剂

B: 脑循环改善剂

C: 抑制胆碱酯酶

D: 抑制 N-甲基天冬氨酸受体

**答案：D**

73. 可升高红细胞，用于肾性及非肾性贫血的是

A: 维生素 B12

B: 重组人促红素

C: 非格司亭

D: 硫酸亚铁

**答案：B**

74. 只能采用注射方式给药的药物是

A: 磷结合剂

B: 维生素 D

C: 促红细胞生成素

D: 铁剂

**答案: C**

75. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别头孢曲松属于药物妊娠毒性分级

A: A 级

B: C 级

C: B 级

D: D 级

**答案: C**

76. 曲唑酮的作用机制为 ( )

A: 抑制 NE 再摄取

B: 抑制 5-HT 和 NE 的再摄取

C: 抑制单胺氧化酶

D: 抑制 5-HT 受体拮抗和再摄取

**答案: D**

77. 可影响幼儿软骨发育，导致承重关节损伤的药物是

A: 头孢唑林

B: 阿米卡星

C: 诺氟沙星

D: 米诺环素

**答案: C**

78. 癌症患者采用伊立替康化疗后出现水样腹泻时，应立即给予

A: 双歧杆菌

B: 小檗碱

C: 昂丹司琼

D: 洛哌丁胺

**答案: D**

79. 原发性失眠首选 ( )

A: 劳拉西泮

B: 苯巴比妥

C: 佐匹克隆

D: 水合氯醛

**答案: C**

80. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。

日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞  $8.0 \times 10$

A: 糖尿病

B: 感染性疾病

C: 肝炎

D: 高脂血症

**答案: A**

81. 以下有关项目中，可作为药品外观质量检查的主要内容是

A: 药品性状

B: 药品内包装

C: 药品外包装

D: 药品中包装

**答案: A**

82. 合并闭角型青光眼的前列腺增生患者不宜选用的药物是 ( )

A: 非那雄胺

- B: 坦索罗辛
- C: 多沙唑嗪
- D: 托特罗定

**答案：D**

83. 某女性，45 岁，肥胖多年，自觉口渴、消瘦 5 个月，尿糖阳性，空腹血糖 8.9mmol/L，餐后两小时血糖 15.1mmol/L

- A: 肥胖症
- B: 2 型糖尿病
- C: 1 型糖尿病
- D: 甲状腺功能亢进症

**答案：B**

84. 某患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊。临床处方：阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

- A: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片
- B: 特拉唑嗪片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片
- C: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液
- D: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他汀片

**答案：C**

85. 患者，女，35 岁，部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫病情控制不佳，提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊。患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

- A: 低血糖
- B: 牙龈增生
- C: 视物模糊
- D: 共济失调

**答案：A**

86. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 Hb < 90g / L。

- A: 右旋糖酐铁
- B: 维生素 C
- C: 叶酸
- D: 富马酸亚铁

**答案：C**

87. 《药物事实与比较》属于

- A: 药品不良反应
- B: 药物综合信息
- C: 药品标准
- D: 药物相互作用

**答案：B**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

88. 患者，女，55 岁，因反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸、胃灼热、间断积食来诊，食管测压提示食管下括约肌压力小于 6mmHg，结合胃镜检查检查结果，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑 20mgqd 强化抑酸治疗。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/546031230100011030>