

2024 年广西壮族自治区巴马瑶族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题完整版完整版

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。目前体检：身高 160cm，体重 70kg。实验室检查：白细胞 $8.0 \times 10^9 / L$ ，红细胞 $4.0 \times 10^{12} / L$ ，总胆红素 $11 \mu mol / L$ ，总胆固醇 $6.0 mmol / L$ ，空腹血糖 $7.6 mmol / L$ 。

- A: 心力衰竭
- B: 低血糖
- C: 肌痛
- D: 乳酸性酸中毒

答案：D

2. 关于新型抗凝药物，下列说法不正确的为

- A: 达比加群酯直接作用于凝血酶（IIa 因子）
- B: 需监测 INR
- C: 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节
- D: 与食物和药物相互作用小

答案：B

3. 有双侧肾动脉狭窄的高血压患者不宜选用

- A: 多沙唑嗪
- B: 哌唑嗪
- C: 维拉帕米

D: 卡托普利

答案：D

4. 血常规是最常用的医学检查指标，血常规异常可提示人们罹患某些疾患荨麻疹患者常出现的血常规检查异常是

A: 血小板计数增多

B: 中性粒细胞增多

C: 血红蛋白减少

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：D

5. 适用于高血压伴前列腺增生症的高血压患者服用的药物是

A: 阿替洛尔

B: 氢氯噻嗪

C: 阿利吉仑

D: 多沙唑嗪

答案：D

6. 提示并不存在风险，目前不需采取措施的信号属于

A: 驳倒的信号

B: 部分确认信号

C: 尚不确定的信号

D: 确认的信号

答案：A

7. 轻症、慢性疾病适宜选用的给药途径是

A: 腔道给药

B: 肌肉注射

C: 口服给药

D: 外用给药

答案：C

8. (2019 年真题) 患者，男，60 岁，坏死性胰腺炎剖腹探查术术后 2 年，恢复良好。进食油炸食品后出现轻度腹泻。宜选用的药物是

A: 干酵母片

B: 蒙脱石散

C: 复方阿嗪米特肠溶片

D: 奥美拉唑肠溶胶囊

答案：C

9. 药品不良反应的诱因主要是药物因素与患者因素。预防不良反应须采取多项措施

A: 注意特殊人群用药

B: 注意 ADR 症状，尤其是迟发反应

C: 注意定期监测器官功能

D: 了解患者及其家族的过敏史

答案：D

10. (致畸药物的种类与危害) 可能导致胎儿泌尿生殖系统异常、指趾畸形的是

A: 孕激素

B: 氮芥类

C: 沙利度胺

D: 雄激素

答案：B

11. 患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用 4 小时后，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，排除其他疾病可能，该病例用药与不良反应因果关系评价结果是

- A: 很可能？
- B: 肯定？
- C: 可能？
- D: 可能无关？

答案：A

12. （2017 年真题）下列药物使用方式，正确的是（）

- A: 氧氟沙星滴眼液打开使用后，继续使用 3 个月
- B: 酵母片在餐后整片用水送服
- C: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用冰水送服
- D: 乙酰半胱氨酸泡腾片用 100ml 温开水浸泡溶解后服用

答案：D

13. （2018 年真题）可以引起视物模糊、红绿色视野受限的药物是（）

- A: 对氨基水杨酸钠
- B: 异烟肼
- C: 乙胺丁醇
- D: 链霉素

答案：C

14. 为比较不同质子泵抑制剂治疗十二指肠溃疡的经济性，将药物治疗的成本与产生的效用指标以货币进行评估，此药物经济学评价方法是（）

- A: 成本-效益分析
- B: 成本-效果分析
- C: 成本-效用分析

D: 最小成本分析

答案：A

15. 为保证用药安全，一些药物应用前需要实施皮肤敏感试验。一些权威性较高的二次文献中记载的需进行皮肤敏感试验的药品是

- A: 链霉素注射剂
- B: 玻璃酸酶注射剂
- C: 青霉素钠注射剂
- D: 鱼肝油酸钠注射剂

答案：B

16. 不属于处方前记内容的是()。

- A: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量
- B: 医疗、预防、保健机构名称
- C: 患者姓名、性别、年龄
- D: 门诊或住院病历号、日期

答案：A

17. (2021 年真题) 治疗非心源性栓塞性缺血性脑卒中，宜选用的药物是()

- A: 达比加群酯
- B: 氯吡格雷
- C: 依诺肝素钠
- D: 尿激酶

答案：B

18. 65 岁及以上老年人用于骨质疏松症防治时，维生素 D 剂量可为

- A: 8001200IU (20~30 μ g) / d

B: 600IU (15 μ g) / d

C: 2000~4000IU (50~100 μ g) / d

D: 400IU (10 μ g) / d

答案：A

19. ADR 与用药时间相关性不密切，反应表现与已知该药 ADR 不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现；可评价为

A: 可能无关

B: 待评价

C: 可能

D: 很可能

答案：A

20. 可升高红细胞，用于肾性及非肾性贫血的是

A: 维生素 B12

B: 硫酸亚铁

C: 重组人促红素

D: 非格司亭

答案：C

21. 可导致手、足、脸以及内部器官不正常发育的兴奋剂是

A: 人生长激素

B: B 受体阻断剂

C: 蛋白同化激素

D: 精神刺激剂

答案：A

22. 一些权威性较高的二次文献中，记载应做皮肤敏感试验的药品中，维生素 B1 注射剂的皮试药液浓度是

- A: 5mg/ml
- B: 1mg / ml
- C: 2mg / ml
- D: 3mg / ml

答案：A

23. 切勿嚼碎、咀嚼，宜在进餐时用水吞服，不宜睡前吞服的 IBS 治疗药物是

- A: 环孢素 A
- B: 地芬诺酯
- C: 匹维溴铵
- D: 蒙脱石散

答案：C

24. 药师审核后判定为合理处方，应该

- A: 拒绝调配处方
- B: 拒绝调配处方，联系处方医师并进行干预
- C: 调配处方并发药
- D: 拒绝调配处方，并依照有关规定报告

答案：C

25. 以下抗生素中，最适宜小儿使用的是

- A: 青霉素
- B: 米诺环素
- C: 氯霉素
- D: 链霉素

答案：A

26. 下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是

- A: 急性脑梗死的溶栓时间窗是 48 小时
- B: 甘油果糖脱水作用较甘露醇强且快
- C: 应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林
- D: 血小板计数 $<100 \times 10^9/L$ 时应禁用溶栓药

答案：D

27. 处方正文书写的内容是

- A: 医师签名
- B: 药师签名
- C: 患者姓名
- D: 药品通用名

答案：D

28. 国际标准化比值是血栓性疾病患者实施抗凝治疗的依据，其正常参考区间是

- A: 2
- B: <0.8
- C: $0.8 \sim 1.5$
- D: >1.5

答案：C

29. 下列疾病中，WHO 视为艾滋病最常见机会性感染的是

- A: 卡波西肉瘤
- B: 肺炎
- C: 结核病

D: 腹泻

答案: C

30. 容易水解的药物是

A: 阿朴吗啡、水杨酸钠

B: 胃蛋白酶

C: 青霉素类、头孢菌素类

D: 牛痘菌苗

答案: C

31. 骨髓增生病

A: 白细胞增多

B: 血小板增多

C: 淋巴细胞增多

D: 红细胞沉降率减慢

答案: B

32. 正常人的体温在 37℃ 左右，但各个部位的温度不尽相同，内脏温度最高，头部次之，皮肤和四肢末端的温度最低。发热是指人体体温升高，超过正常范围。发热是人体对致病因子的一种全身性防御反应，是患病时常伴发或主要表现的一种症状。

A: 退热用药可能导致肝、肾脏损伤

B: 退热用药可能发生皮疹、哮喘等反应

C: 退热属对症治疗，可能掩盖病情，影响疾病诊断

D: 退热用药可能引起胃肠道的损伤

答案: C

33. 护士用药咨询的内容是

- A: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品
- B: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- C: 抗菌药物的合理使用
- D: 减肥、补钙、补充营养素

答案：A

34. 以下联合用药中，依据“作用相加或增加疗效”机制的是

- A: 磺胺甲噁唑（SMZ）联用甲氧苄啶（TMP）
- B: 氢溴酸山莨菪碱联用哌替啶
- C: 阿托品联用吗啡
- D: 阿托品联用普萘洛尔

答案：A

35. 重度癌性疼痛宜选用的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 吗啡
- C: 可待因
- D: 多奈哌齐

答案：B

36. 审核发现用药失误的处方，药师应该

- A: 拒绝调配此处方
- B: 依照此处方调配药品、发出药品
- C: 修改、调配此处方并发出药品
- D: 拒绝调配此处方，并依照有关规定报告

答案：D

37. 新生儿应用氯霉素可引起

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 高胆红素血症
- B: 新生儿溶血
- C: 灰婴综合征
- D: 核黄疸

答案：C

38. 药师对药品不良事件、新药上市后被召回或撤市的案例应及时掌握，不能松懈

- A: 替加色罗
- B: 塞来昔布
- C: 钆贝葡胺
- D: 培高利特

答案：A

39. 茶碱类支气管平滑肌松弛剂治疗慢阻肺疾病的主要不良反应是

- A: 失眠
- B: 水肿
- C: 尿频
- D: 口渴

答案：A

40. 解救铅中毒的是（）

- A: 盐酸戊乙奎醚
- B: 依地酸钙钠
- C: 单价抗毒血清
- D: 二巯丙醇

答案：B

41. 禁止与单胺氧化酶抑制剂联用的药物不包括

- A: 苯二氮
- B: 5-HT
- C: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂
- D: 三环类药物

答案：A

42. 患者，男，66 岁，帕金森病史 3 年，服用复方左旋多巴控制病情，药师对患者及其家属进行的用药指导错误的是

- A: 为达到治疗效果，应小剂量滴定增量
- B: 应避免同时进食蛋白质类食物，应隔开 2~3h
- C: 不能自行停药或随意改变剂量
- D: 早、中餐应高蛋白饮食，减少碳水化合物的摄入

答案：D

43. 在有关与药物使用的内容中，属于医师用药咨询的主要内容是

- A: 合理用药信息
- B: 注射剂配制溶媒、浓度
- C: 首次剂量、维持剂量以及每日用药次数、间隔与疗效
- D: 用药后预计起效时间、维持时间及疗效

答案：A

44. 降低痰液黏度，使痰液易于排出的药品是

- A: 可待因
- B: 右美沙芬
- C: 苯丙哌林
- D: 羧甲司坦

答案：D

45. (2021 年真题) 静脉滴速过快，易致红人综合征的药物是 ()

- A: 美罗培南
- B: 克拉霉素
- C: 头孢哌酮
- D: 万古霉素

答案: D

46. 归属专业学术机构网站的是

- A: www.merck.com
- B: www.cmt.com.cn
- C: www.ashp.org
- D: [www.google](http://www.google.com)

答案: C

47. 患者，男，28 岁，主诉：发作性四肢抽搐 2 年，加重 2 月，化验结果显示 TSH 增高，FT3，FT4 减低，临床诊断为甲状腺功能减退，欲使用左甲状腺素钠治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是

- A: 100mg，qd，睡前顿服
- B: 100mg，qd，晚餐后顿服
- C: 100 μ g，qd，早餐后半小时，顿服
- D: 100 μ g，qd，早餐前半小时，顿服

答案: D

48. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

- A: 血糖不降
- B: 低血糖症状
- C: 血压升高
- D: 过敏反应

答案：B

49. 婴幼儿腹泻，服用地衣芽孢杆菌活菌制剂，正确的使用方法是()

- A: 清晨服用
- B: 舌下含服
- C: 用温水调服
- D: 应同时碱化尿液

答案：C

50. (2017 年真题) 治疗滴虫性阴道炎首选的药物是 ()

- A: 伏立康唑片
- B: 莫匹罗星软膏
- C: 甲硝唑栓
- D: 吡哆美辛栓

答案：C

51. 引起"苯妥英钠半衰期为 30~40h，羟化酶缺乏者一半剂量即出现神经毒性"是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

A: 遗传因素

B: 性别

C: 年龄

D: 基础疾病

答案：A

52. 让患者感觉信任和不受干扰的是

- A: 适当隐私
- B: 位置标志明确
- C: 环境舒适
- D: 配备必备设备

答案：C

53. (2016 年真题) 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

- A: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药
- B: 酚麻美敏口服液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药
- C: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药
- D: 酚麻美敏口服液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚，应避免重复用药

答案：B

54. 患者，男，60 岁，身高 170cm，体重 85kg。既往有伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、糖尿病、高脂血症及心肌梗死病史。近日因夜间咳嗽并伴有粉红色泡沫样痰就诊。查体：心率 100 次 / 分、血压 160 / 100mmHg，血总胆固醇及三酰甘油均高于正常。诊断：伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、心力衰竭。

- A: 140 / 80mmHg
- B: 130 / 80mmHg
- C: 140 / 90mmHg
- D: 150 / 100mmHg

答案：B

55. 服用维生素 B

- A: 食盐
- B: 酒
- C: 脂肪
- D: 食醋

答案：B

56. (2019 年真题) 能改善眼部干燥症状，缓解视疲劳的药物是

- A: 可的松滴眼液
- B: 硫酸锌滴眼液
- C: 聚乙烯醇滴眼液
- D: 山莨菪碱滴眼液

答案：C

57. (2016 年真题) 与左旋多巴合用，可提高疗效的是 ()。

- A: 克拉维酸钾
- B: 苧丝肼
- C: 奥美拉唑
- D: 叶酸

答案：B

58. 患者，男，35 岁。血压 180/100mmHg，经服硝苯地平及血管紧张素转化酶抑制剂治疗 3 周后血压降至 120/80mmHg，关于停药的问题应是
- A: 继续服药，血压平稳控制 1~2 年后再逐渐减少剂量至停药 1 种药，如血压不稳定，即表明需长期服用能保持血压稳定的最小剂量
- B: 停药后血压增高再服
- C: 为避免血压下降过低，应停药
- D: 可以停药降压药

答案：A

59. 误服药物、服药过量以及滥用药物均可引起药物中毒。常见的致中毒药物包括西药、中药和农药。随着化学制药工业的不断发展，如果管理和解救措施跟不上，药物中毒的危害即将越来越严重。
- A: 早期、足量、重复给药
- B: 早期、足量、单次给药
- C: 早期、适量、联合给药
- D: 早期、足量、联合给药

答案：A

60. (2016 年真题) 缓解视疲劳可选用的药物是 ()。

- A: 色甘酸钠滴眼液
- B: 氧氟沙星滴眼液
- C: 酞丁安滴眼液
- D: 羟甲基纤维素钠滴眼液

答案：D

61. 男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 病理性骨折

B: 下肢深静脉血栓形成

C: 下肢动脉栓塞

D: 肺动脉栓塞

答案：B

62. 抗结核治疗中，细胞内外均有杀菌作用，且单一杀菌力最强的药物是

A: 乙胺丁醇

B: 吡嗪酰胺

C: 利福平

D: 异烟肼

答案：D

63. 有一肺炎球菌感染患者，对青霉素过敏，宜选用的有效抗菌药物是

A: 多西环素

B: 阿米卡星

C: 左氧氟沙星

D: 阿莫西林

答案：C

64. 属于 HIV 蛋白酶抑制剂的是

A: 奈韦拉平

B: 沙奎那韦

C: 恩夫韦替

D: 扎西他滨

答案：B

65. 老年人服用可能出现认知功能受损、谵妄、跌倒的药物是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 苯二氮革类药
- C: 哌替啶
- D: 双嘧达莫

答案：B

66. 1 天给药 1 次；需要立即达到治疗浓度，可首剂加倍针对

- A: 半衰期大于 30 小时
- B: 半衰期小于 30 分钟
- C: 半衰期大于 24 小时
- D: 半衰期 8~24 小时

答案：C

67. 患者，女，48 岁，身高 158cm，体重 72kg。最近因感觉易疲劳、怕冷、嗜睡、记忆力逐渐减退等情况前来就医。医生检查发现，患者眼睑和手部皮肤水肿，声音嘶哑、毛发稀落。实验室检查示：血清 TSH 水平升高。确诊为甲状腺功能减退症。

- A: 早餐前 60min，空腹，1 日 1 次
- B: 与消胆胺同服，可增强疗效
- C: 可降低降糖药疗效
- D: 初始治疗宜采用最小剂量

答案：B

68. 苯二氮（𠂇卓）类药物中毒的特异性治疗药物为

- A: 氟马西尼
- B: 醒脑静
- C: 纳洛酮
- D: 去甲肾上腺素

答案：A

69. 不需要睡前服用的他汀类药物为

- A: 普伐他汀
- B: 辛伐他汀
- C: 洛伐他汀
- D: 阿托伐他汀

答案：D

70. 用二甘醇替代丙二醇所致的假药事件是

- A: 关木通事件
- B: 欣弗事件
- C: 亮菌甲素事件
- D: 鱼腥草事件

答案：C

71. 血管扩张剂、 α 受体阻滞剂、抗抑郁药等可能会诱发或加重的反应是

- A: 心血管系统与维持水电解质平衡的内环境稳定功能减弱，易发生体位性低血压
- B: β 受体阻滞剂普萘洛尔等减慢心率的作用亦钝化
- C: 对异丙肾上腺素的敏感性降低
- D: 肝脏合成凝血因子能力下降，对肝素及华法林非常敏感

答案：A

72. 在检查尿沉渣的项目中，最能提示是肾实质性病变的证据的是

- A: 尿沉渣结晶
- B: 尿沉渣白细胞

C: 尿沉渣管型

D: 尿沉渣磷酸盐

答案：C

73. 交代患者用药期间应禁止摄入酒精，以免加深中枢神经抑制的是

A: 枸橼酸铋钾

B: 米索前列醇

C: 氟西汀

D: 胰岛素注射剂

答案：C

74. 运动员参赛时禁用的药品是

A: 雷尼替丁

B: 人促红素

C: 氨氯地平

D: 多潘立酮

答案：B

75. 用药咨询是药师应用所掌握的药学知识和药品信息，承接公众对药物治疗和合理用药的咨询服务，对临床合理用药有关键性作用。根据药物咨询对象的不同，可以将其分为患者、医师、护士和公众的用药咨询。

A: 新药信息

B: 自我保健

C: 药品适应证

D: 治疗药物监测

答案：C

76. 布噻嗪属于

- A: 血管扩张药
- B: 抗组胺药
- C: 利尿剂
- D: 镇痛药

答案：C

77. 能显示药师的文献评价能力和技巧的是

- A: 对问题进行确定并归类
- B: 随访了解效果，并建立档案
- C: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- D: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

答案：D

78. 新生儿血红蛋白(Hb)正常参考区间是

- A: 170~200g / L
- B: 180~220g / L
- C: (5.0~12.0)X10⁹ / L
- D: (15.0~20.0)X10⁹ / L

答案：A

79. 肾脏的功能主要是分泌和排泄尿液、废物、毒物和药物，调节和维持体内环境的平衡。变态反应、感染、肾血管病变、代谢异常、先天性疾病、全身循环和代谢性疾病、药物、毒素对肾脏的损害均可影响肾功能。

- A: 27~62 μmol/L
- B: 53~97 μmol/L
- C: 45~84 μmol/L

D: $18 \sim 35 \mu\text{mol/L}$

答案：D

80. (2018 年真题) 患者, 男, 65 岁, 诊断为持续性心房纤颤, 医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症, 目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况, 药师提出的合理化药物治疗建议, 不包括 ()

- A: 患者在复律成功后, 尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗
- B: 因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用, 建议换成氨氯地平 CCB 降压药
- C: 胺碘酮可以显著抑制 CYP2D6, 减慢美托洛尔的代谢, 应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量
- D: 胺碘酮能增加华法林的抗凝活性, 在逐渐降低胺碘酮剂量的时候, 注意随时根据 INR 值调整华法林的剂量

答案：B

81. 可能导致 γ -谷氨酰转移酶升高的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 胰岛素
- C: 氯氮平
- D: 阿司匹林

答案：A

82. 属于质子泵抑制剂的是 ()

- A: 多潘立酮
- B: 铝碳酸镁
- C: 法莫替丁

D: 埃索美拉唑

答案：D

83. 患者，女，36 岁。餐后出现恶心、呕吐，可选用的药物是

A: 鞣酸蛋白

B: 甲氧氯普胺或多潘立酮片

C: 维生素 C

D: 二甲硅油制剂

答案：B

84. （2016 年真题）患者，男，45 岁，患有高血压，因感冒发热，咽痛，流鼻涕到药店买药，药师不应推荐其使用的药物是（）。

A: 速感宁胶囊

B: 复方酚咖伪麻胶囊

C: 维 C 银翘片

D: 速克感冒片

答案：B

85. 冠心病患者如不能耐受 ACEI，可考虑给予

A: 地高辛

B: β 受体激动剂

C: α 受体拮抗剂

D: AR

答案：D

86. 常见老年人 ADR 的药物类别，硝苯地平可出现面部潮红、心慌、头痛等反应

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 抗生素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/546144231101011030>