

2024 年广西壮族自治区平乐县《执业药师之西药学专业二》考试完整版附答案 AB 卷

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 青霉素 G

- A: 对 G+、G-球菌，特别是对 G-杆菌有效
- B: 对 G+、G-球菌及螺旋体等有效
- C: 对支原体有效
- D: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效

答案：B

2. 局部应用杀灭疥虫的药物中，疗效最佳的是()

- A: 苯甲酸苄酯
- B: 克罗米通
- C: 林旦霜
- D: 硫黄软膏

答案：C

3. 患者，男，66 岁。BMI24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次/分。临床诊断为：（1）心绞痛急性发作；（2）心功能不全、心功能 III 级；（3）高血压病 3 级；（4）高脂血症。

A: 硝酸甘油片被吞服，而不是舌下含服

- B: 硝酸甘油片单次剂量不足，次数不足
- C: 硝酸甘油片已经过期
- D: 贝那普利、阿托伐他汀等拮抗硝酸甘油的疗效

答案：D

4. 克林霉素与红霉素合用()

- A: 后者血药浓度升高，不良反应增加
- B: 后者血药浓度下降，药效降低
- C: 药理作用拮抗
- D: 不良反应叠加

答案：C

5. 抑制磷酸二酯酶，增加细胞内的 cAMP 含量，缓解慢性心力衰竭症状()

- A: 硝普钠
- B: 氨力农
- C: 地高辛
- D: 多巴酚丁胺

答案：B

6. 可抑制细菌的 DNA 依赖性 RNA 多聚酶的是()。

- A: 替考拉宁
- B: 舒巴坦
- C: 磷霉素
- D: 利福平

答案：D

7. 洋地黄中毒时的信号为

- A: 胃肠道症状
- B: 定向力丧失
- C: 色觉障碍
- D: 眩晕

答案：A

8. 对曲霉属无效的药物是()

- A: 氟康唑
- B: 两性霉素 B
- C: 伏立康唑
- D: 伊曲康唑

答案：A

9. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

- A: 乙酰唑胺
- B: 氨苯蝶啶
- C: 托拉塞米
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

10. 用于慢性活动性肝炎的是

- A: 复方氨基酸注射液(3AA)
- B: 复方氨基酸(18AA)
- C: 精氨酸
- D: 赖氨酸

答案：A

11. 具有较强抗铜绿假单胞菌作用的头孢菌素是()

- A: 头孢克洛
- B: 头孢他啶
- C: 头孢唑林
- D: 头孢孟多

答案：B

12. 属于组胺 H₂ 受体阻断剂是

- A: 法莫替丁
- B: 氯苯那敏
- C: 奥美拉唑
- D: 多潘立酮

答案：A

13. 肾上腺糖皮质激素类药物对电解质的影响是

- A: 抑制钠的排泄
- B: 抑制磷的排泄
- C: 抑制钙的排泄
- D: 抑制钾的排泄

答案：A

14. 高血压合并脑血管功能不全不宜选用

- A: 氢氯噻嗪
- B: 普萘洛尔
- C: 胍乙啶
- D: 肼屈嗪

答案：C

15. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡(A1 期)伴出血。13C 呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1U，静脉滴注，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，15 服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 埃索美拉唑钠
- B: 克拉霉素
- C: 胶体果胶铋胶囊
- D: 硝苯地平缓释片

答案：A

16. (2015 年真题) 属于多巴胺 D2 受体阻断剂的是 ()。

- A: 多潘立酮
- B: 法莫替丁
- C: 奥美拉唑
- D: 氯苯那敏

答案：A

17. 妊娠期妇女合 8 岁以下儿童禁用的抗生素是

- A: 大环内酯类
- B: 四环素类
- C: 头孢菌素类
- D: 青霉素类

答案：B

18. 某患者，突发高热、呕吐、惊厥，数小时后出现面色苍白、四肢厥冷、脉搏细速、血压下降至休克水平。经实验室检查诊断为暴发型流脑所致的感染中毒性休克，应采取的抗休克药物为()

- A: 阿托品
- B: 糖皮质激素
- C: 酚妥拉明
- D: 右旋糖酐

答案：B

19. 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 口服补液盐 II 是等渗性口服补液盐
- B: 口服补液盐使用方便、价格低廉，发生腹泻时如能口服，应尽早使用
- C: 口服补液盐是复方制剂，II、II 代表不同的配方
- D: 腹泻导致重度脱水时首选静脉补液，情况稳定后可更换为口服补液盐治疗

答案：A

20. 患儿，女，10 岁，体重 35kg，因发热、咳嗽 10 日而入院。体温波动于 38.5℃~39.5℃之间，咳嗽为刺激性干咳，少痰，以清晨及夜间为著。于外院先后静点青霉素及头孢类抗生素共 6 日，病情无明显好转。查体：一般状态良，双肺呼吸音粗糙，余无阳性体征。血常规正常，结核菌素试验阴性，X 线胸片示右肺中叶大片状阴影。临床诊断考虑为支原体肺炎。

- A: 10 日

B: 12 日

C: 5 日

D: 7 日

答案：D

21. (2018 年真题) 不能减小前列腺的体积, 也不能降低 PSA 水平, 但可松弛前列腺平滑肌, 缓解膀胱和下尿道急性症状的药物是 ()

A: 西地那非

B: 他达拉非

C: 坦索罗辛

D: 非那雄胺

答案：C

22. 正在使用单胺氧化酶抑制剂的患者不宜选择

A: 磷霉素

B: 利奈唑胺

C: 夫西地酸

D: 头孢唑林

答案：B

23. 用于功能性子宫出血、妊娠早期先兆流产、习惯性流产的是

A: 米非司酮

B: 绒促性素

C: 噻啉啉

D: 硝苯地平

答案：B

24. 羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂简称为他汀类药，其与羟甲基戊二酰辅酶 A 的结构相似，且对羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶（HMG—CoA 还原酶）的亲合力更大，对该酶产生竞争性的抑制作用，结果使血总胆固醇（TC）、低密度脂蛋白（LDL）和载脂蛋白（Apo）B 水平降低，对动脉粥样硬化和冠心病的防治产生作用。

- A: 普伐他汀
- B: 瑞舒伐他汀
- C: 辛伐他汀
- D: 阿托伐他汀

答案：C

25. 强效（使 LDL-ch 水平降低 $\geq 50\%$ ）的他汀类调血脂药

- A: 小剂量氟伐他汀
- B: 大剂量阿托伐他汀
- C: 小剂量阿托伐他汀
- D: 依折麦布

答案：B

26. （2018 年真题）患者，女，28 岁，因“多汗、心慌、消瘦、易怒半月余”就诊，实验室检查显示 FT4 和 FT3 均升高，TSH 降低，甲状腺 I 度肿大，心率 92 次/分，诊断为“甲状腺功能亢进症”简称甲亢”。给予甲巯咪唑片 10mg，一日 3 次盐酸普萘洛尔片 10mg，日 3 次。患者 1 月后复查，FT3 和 FT4 恢复正常，但出现膝关节疼痛。

- A: 可以妊娠，选择适当的抗甲状腺药物以最小剂量维持
- B: 不可停药妊娠，应手术切除甲状腺后再准备妊娠
- C: 甲状腺激素水平恢复正常后即可停药准备妊娠
- D: 妊娠期间应将甲状腺功能维持在正常下限

答案：A

27. 用于预防绝经期妇女骨质疏松的治疗药()

- A: 雷洛昔分
- B: 地塞米松
- C: 黄体酮
- D: 米非司酮

答案: A

28. 属于毛细血管止血药的是

- A: 氨甲环酸
- B: 艾曲泊帕乙醇胺
- C: 甲萘氢醌
- D: 酚磺乙胺

答案: D

29. 可为患者提供一定的能量，对于长期昏迷的患者尤为适用的药物是

- A: 螺内酯
- B: 阿米洛利
- C: 甘露醇
- D: 甘油果糖

答案: D

30. (2018 年真题) 低致吐性化疗药物所引起的恶心呕吐, 宜选用的止吐治疗方案是 ()

- A: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦, 化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松
- B: 化疗前使用昂丹司琼, 化疗后不需要继续使用止吐药

C: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

D: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

答案: B

31. 下列硝酸酯类药物起效最快的是

A: 硝酸甘油

B: 单硝酸异山梨酯

C: 戊四醇酯

D: 硝酸异山梨酯

答案: A

32. 关于地西泮的叙述, 错误的是

A: 是一种长效镇静催眠药物

B: 在临床上可用于缓解炎症引起的反射性肌肉痉挛

C: 抗癫痫作用强, 可用于治疗癫痫小发作

D: 抗焦虑作用时间长, 是临床上常用的抗焦虑药之一

答案: C

33. 属于孕激素类的是()

A: 睾酮

B: 己烯雌酚

C: 甲地孕酮

D: 他莫昔芬

答案: C

34. 治疗勃起功能障碍药的是

A: 他达拉非

B: 达那唑

C: 左炔诺孕酮

D: 氯地孕酮

答案: A

35. 唑来膦酸静脉给药输注的时间应在

A: 60 分钟以上

B: 15 分钟以上

C: 5 分钟以上

D: 30 分钟以上

答案: B

36. 呋塞米与抗组胺药合用时

A: 耳毒性增加

B: 利尿作用减弱

C: 低氯性碱中毒机会增加

D: 引起电解质紊乱的概率增加

答案: A

37. 鱼精蛋白可用于救治()。

A: 华法林过量导致的出血

B: 异烟肼中毒导致的神经毒性

C: 吗啡过量导致的呼吸抵制

D: 肝素过量导致的出血

答案: D

38. 关于 ARB 药物的叙述，错误的是

A: 所有的 ARB 蛋白结合率大于 96%

- B: 除厄贝沙坦和替米沙坦外，其他药的口服生物利用度都较低
C: 所有的 ARB 起效时间在 2 小时左右
D: ARB 药物多在体内代谢后排出

答案：D

39. 严重心衰首剂可出现低血压反应的药物是

- A: 地高辛
B: 氨氯地平
C: 卡托普利
D: 硝酸甘油

答案：C

40. 属于植物制剂，用于治疗前列腺增生的药物是

- A: 普适泰
B: 十一酸睾酮
C: 非那雄胺
D: 哌唑嗪

答案：A

41. 属于前列腺素 FP 受体激动剂的是

- A: 9%硼酸冰片滴耳液
B: 曲伏前列素
C: 1%碘甘油
D: 四环素

答案：B

42. 呋布西林()

- A: 抗菌作用强，对厌氧菌有效

B: 特别对铜绿假单胞菌有效

C: 对 G

D: 对 G

答案: B

43. 以降低三酰甘油为主要治疗目标时，首选的调血脂药是

A: 依折麦布

B: 辛伐他汀

C: 非诺贝特

D: 瑞舒伐他汀

答案: C

44. 为高渗溶液，静脉给药后可提高血浆渗透压的药物是

A: 甘露醇

B: 甘油果糖

C: 阿米洛利

D: 螺内酯

答案: A

45. 与西地那非合用，可导致严重低血压的药品是()。

A: 甲睾酮

B: 硝酸甘油

C: 丙酸睾酮

D: 非那雄胺

答案: B

46. 是碘与表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮经反应生成的复合物。含有效碘 9%~12%。从载体中释出碘，可直接卤化菌体蛋白质，与细菌蛋白质的氨基酸结合，破坏菌体的蛋白质和酶，使微生物代谢功能发生障碍而死亡的广谱强效杀菌药是

- A: 氯己定
- B: 聚维酮碘
- C: 依沙吖啶
- D: 过氧乙酸

答案：B

47. 不属于维生素 B2 缺乏临床表现的是

- A: 脚气病
- B: 口角炎
- C: 阴道炎
- D: 白内障形成

答案：A

48. 适用于各型高血压，对原发性或肾性高血压均有效的是

- A: 拉贝洛尔
- B: 氢氯噻嗪
- C: 肼屈嗪
- D: 卡托普利

答案：D

49. 氢氯噻嗪降血压的作用机制主要是

- A: 排钠利尿，造成体内 Na
- B: 抑制醛固酮分泌
- C: 排钠，使细胞内 Na

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 降低血浆肾素活性

答案: C

50. 竞争性抑制胃肠道的 α 葡萄糖苷酶活性, 减慢肠道内多糖、寡糖或双糖的降解从而延缓单糖的吸收, 可降低餐后血糖的药物是 ()

- A: 格列吡嗪
- B: 吡格列酮
- C: 伏格列波糖
- D: 二甲双胍

答案: C

51. 不宜口服给药的药物是

- A: 硝苯地平
- B: 硝酸甘油
- C: 普萘洛尔
- D: 洛伐他汀

答案: B

52. 关于氢氧化镁的叙述正确的是

- A: 中和胃酸作用强而迅速
- B: 对溃疡面有保护作用
- C: 不影响排便
- D: 口服易吸收

答案: A

53. (2021 年真题) 患者，女，70 岁，BMI 21kg/m^2 ，45 岁时绝经，10 年前开始，经常出现腰背部疼痛，活动后加重，但未就诊，平日外出活动较少，近 5 年身高降低，驼背明显。10 天前患者不慎摔倒，上肢活动受限、疼痛，就诊后检查结果：血钙 1.97mmol/L ，血磷 1.7mmol/L ，右上肢 X 光检查提示：右桡骨远端骨折。骨密度检查结果：T 值 (-2.9)。

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 双醋瑞因
- C: 地塞米松
- D: 秋水仙碱

答案：A

54. 没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是()。

- A: 可待因
- B: 苯丙哌林
- C: 右美沙芬
- D: 氯化铵

答案：B

55. 口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物是

- A: 磺胺米隆
- B: 柳氮磺吡啶
- C: 磺胺嘧啶
- D: 磺胺甲

答案：B

56. 可使尿酸浓度升高，引起关节痛的药物是

- A: 红霉素

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 异烟肼

C: 乙胺丁醇

D: 吡嗪酰胺

答案：D

57. 属于磷酸二酯酶抑制剂的平喘药是

- A: 沙美特罗
- B: 布地奈德
- C: 孟鲁司特
- D: 多索茶碱

答案: D

58. 下述不能用于治疗痤疮的药物是

- A: 克霉唑
- B: 过氧苯甲酰
- C: 阿达帕林
- D: 壬二酸

答案: A

59. 以下药物肾结石患者禁用的是

- A: 别嘌醇
- B: 秋水仙碱
- C: 苯溴马隆
- D: 非布司他

答案: C

60. (2017 年真题) 药师在急诊药房值班时, 接听病房咨询电话, 得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者, 出现高热、肺纹加重, 患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 头孢哌酮
- B: 头孢曲松
- C: 阿米卡星

D: 替考拉宁

答案: D

61. 用药过程中需注意监护心脏毒性的是()

A: 丝裂霉素

B: 甲氨蝶呤

C: 多柔比星

D: 伊立替康

答案: C

62. 下列可用于治疗哮喘的是

A: 氮革斯汀

B: 氯雷他定

C: 氯苯那敏

D: 孟鲁司特

答案: D

63. 过量使用,会导致大量的中间代谢产物 N-乙酰对苯醌亚胺堆积,引起严重肝毒性的药物是()

A: 塞来昔布

B: 阿司匹林

C: 双氯芬酸

D: 对乙酰氨基酚

答案: D

64. 患者,男,68岁。发热伴咳嗽1周,表情淡漠、气急。近2天全身散在出血点及淤斑,血压60/40mmHg,血红蛋白120g/L,白细胞 $12 \times 10^9/L$

- A: 低分子量肝素
- B: 鱼精蛋白
- C: 维生素 K
- D: 维生素 C

答案：B

65. 属于白三烯受体阻断剂的是

- A: 福莫特罗
- B: 异丙托溴
- C: 乙酰胆碱
- D: 孟鲁司特

答案：D

66. (2018 年真题) 能使凝血因子 I 降解为纤维蛋白单体的药物是 ()

- A: 鱼精蛋白
- B: 卡巴克络
- C: 甲萘氢醌
- D: 蛇毒血凝酶

答案：D

67. 下列药物中，不能增强他莫西芬活性和疗效的是

- A: 氟尿嘧啶
- B: 甲氨蝶呤
- C: 长春新碱
- D: 西咪替丁

答案：D

68. 静脉注射抢救糖尿病酮症酸中毒和高血糖高渗性昏迷患者的是 ()

- A: 甘精胰岛素
- B: 地特胰岛素
- C: 谷赖胰岛素
- D: 短效胰岛素

答案：D

69. 具有抑制胃酸分泌作用的药物是

- A: 莫沙必利
- B: 碳酸氢钠
- C: 奥美拉唑
- D: 西沙必利

答案：C

70. 属于一线抗结核分枝杆菌的药物是

- A: 莫西沙星、卡那霉素、卷曲霉素
- B: 异烟肼、利福平、莫西沙星
- C: 异烟肼、阿米卡星、对氨基水杨酸
- D: 异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇

答案：D

71. 患者，女，12岁，身高140cm，体重32kg，因"脊柱侧弯"入院。入院后完善相关检查，拟行"脊柱侧弯截骨矫形檀骨融合内固定术"。既往有头孢类过敏史。

- A: 左氧氟沙星
- B: 克林霉素
- C: 万古霉素
- D: 替考拉宁

答案：C

72. 存在高度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A: 奥沙利铂
- B: 泼尼松
- C: 顺铂
- D: 吉西他滨

答案：C

73. 按作用时间分类，属于速效的胰岛素的是()

- A: 短效胰岛素
- B: 地特胰岛素
- C: 甘精胰岛素
- D: 谷赖胰岛素

答案：D

74. 与脊髓上水平的中枢镇痛、欣快感和依赖性有关的受体

- A: δ 受体
- B: K 受体
- C: $\mu 1$ 受体
- D: $\mu 2$ 受体

答案：C

75. (2019 年真题) 老年患者长期大剂量使用可引起骨折的药物是 ()

- A: 替普瑞酮
- B: 复方碳酸钙
- C: 胶体果胶铋
- D: 奥美拉唑

答案：D

76. 属于头孢二代的是

- A: 头孢唑林
- B: 头孢呋辛
- C: 头孢曲松
- D: 拉氧头孢

答案：B

77. (2021 年真题) 某患者新诊断为退行性膝关节炎, 既往有磺胺过敏史, 不宜选用的非甾体抗炎药是 ()

- A: 双氯芬酸
- B: 布洛芬
- C: 塞来昔布
- D: 吲哚美辛

答案：C

78. (2018 年真题) 关于奥司他韦作用特点的说法, 错误的是 ()

- A: 应严格掌握奥司他韦适应证, 不能用于流感的预防
- B: 1 岁以上儿童可以使用奥司他韦
- C: 奥司他韦可用于甲型和乙型流感的治疗
- D: 治疗流感时, 首次使用奥司他韦应当在流感症状出现后的 36 小时以内

答案：A

79. 早产系指妊娠在多少周之间结束者

- A: 28~38 周
- B: 28~37 周
- C: 25~37 周

D: 18~37 周

答案: B

80. 关于法莫替丁用药注意事项的说法, 错误的是

A: 肾功能不全患者需要减少给药剂量或延长给药间隔

B: 与西咪替丁相比, 对性激素的影响较轻

C: 抑制肝脏细胞色素 P450 酶的活性, 从而影响茶碱、华法林、地西泮等药物的代谢

D: 以原形从肾脏排泄, 肾功能不全患者易造成药物在体内蓄积

答案: C

81. 属于长效和强效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂的是

A: 阿法骨化醇

B: 奥利司他

C: 阿仑膦酸钠

D: 鲑降钙素

答案: B

82. 患者, 女, 66 岁, 5 天前无明显诱因出现发热, 最高 39℃, 伴寒战; 无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善, 遂转入院治疗。入院查体: T38. 8℃, R21 次, BP110 / 70mmHg, HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软, 咽不红、双扁桃体不大; 双肺呼吸音清, 无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$, 中性粒细胞 82. 1%, 胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0. 59, 每 6 小时一次。

A: 定期复查血常规、肝肾功能

B: 如发生转氨酶升高, 应考虑氟康唑的肝毒性

C: 侵袭性真菌感染疗程较长, 患者出院后仍需口服氟康唑

D: 出院后如发生过敏症状，可使用抗过敏药特非那定

答案：D

83. 噻嗪类与类噻嗪类利尿药可升高的项目是

A: 血钾

B: 血氨

C: 血氯

D: 血钠

答案：B

84. 毒性低，但胃肠刺激症状较常见的药物是()

A: 对氨基水杨酸

B: 异烟肼

C: 吡嗪酰胺

D: 利福平

答案：A

85. (2015 年真题) 属于超强效的外用糖皮质激素是 ()。

A: 卤米松

B: 曲安奈德

C: 地塞米松

D: 氢化可的松

答案：A

86. 一般剂量长期疗法

A: 变态反应性疾病

B: 湿疹

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 中毒性感染和休克

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/546145000101011030>