

护理理论知识测试试题与答案

1、医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，应当在多长时间内向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告。正确的是（）

- A、8 小时
- B、12 小时
- C、24 小时
- D、48 小时
- E、72 小时

答案：D

2、最严重的心律失常类型是（）

- A、期前收缩
- B、室性心动过速
- C、心房颤动
- D、心室颤动
- E、房室传导阻滞

答案：D

3、李某，男，30 岁。因拟诊“人禽流感”住院治疗，对该病人实施的预防控 制措施属于（）

- A、甲类传染病按甲类处理
- B、乙类传染病按乙类处理
- C、丙类传染病按丙类处理
- D、甲类传染病按乙类处理
- E、乙类传染病按甲类处理

答案：E

4、病人，女，68 岁，既往有风湿性心脏瓣膜病病史。近一个月来经常于活动 后出现呼吸困难，休息后缓解。昨夜突然咳粉红色泡沫痰，强迫端坐位。该病人 发生了（）

- A、支气管哮喘
- B、支气管肺炎
- C、急性左心衰竭
- D、急性右心衰竭
- E、支气管扩张症

答案：C

5、脑室引流管的护理不正确的是（）

- A、70%乙醇
- B、20%~30% 乙醇
- C、50%硫酸镁
- D、生理盐水
- E、普鲁卡因

答案：B

45、目前执行的《湖南省医疗机构护理文书书写规范》开始实施于（）年

- A、2013
- B、2015
- C、2017
- D、2019
- E、2021

答案：B

46、清除物品上除芽孢以外的所有致病微生物的方法称为：（）

- A、灭菌
- B、无菌
- C、消毒
- D、清洁
- E、抑菌

答案：C

47、下列不属于灭菌剂的是？（）

- A、环氧乙烷
- B、过氧乙酸
- C、含氯消毒剂
- D、2%戊二醛

答案：C

48、范女士，35岁，因颅内压增高，行脑室引流术后2h，引流管内无脑脊液流出，不正确的处理措施是（）

- A、报告医生
- B、将引流瓶袋放低
- C、将引流管轻轻旋转
- D、生理盐水缓慢冲洗

答案：D

49、男性，42岁，患重型急性胰腺炎，并发休克36小时，经抗休克治疗后行胰腺

和其周围坏死组织清除、腹腔引流术。术后心率 106 次/分，血压 96/60mmHg，中心静脉压 10cmH₂O，呼吸 22 次/分，动脉血氧分压 66mmHg，尿量每小时少于 20ml，尿比重 1.002。考虑病人已发生（）

- A、心功能不全
- B、肺功能衰竭
- C、肾衰竭
- D、血容量不足
- E、体内抗利尿激素分泌过多

答案：C

50、患者男性，28 岁，因高处坠落致伤头伴意识障碍 4 小时入院，呼唤无应答，疼痛刺激可睁眼、对疼痛刺激可定位，不能言语，该患者意识状态为（）

- A、嗜睡
- B、模糊
- C、浅昏迷
- D、昏迷
- E、深昏迷

答案：C

51、为昏迷患者进行口腔护理，防止误吸的措施是（）

- A、使用开口器协助患者张口
- B、由外向内擦洗牙齿各面
- C、协助患者漱口
- D、血管钳夹紧棉球，挤出多余液体
- E、检查口腔粘膜

答案：D

52、符合超声雾化吸入特点的是（）

- A、雾量恒定，方便使用
- B、雾滴颗粒大小不一
- C、雾滴随呼吸可以达到肺泡
- D、雾滴的直径可以在 5mm 以上
- E、产生气雾温度低，治疗后不易着凉正确

答案：C

53、断指再植手术距外伤的时间一般以多长为限（）

- A、2~4 小时
- B、6~8 小时

C、10~12 小时

D、14~15 小时

E、20 小时

答案：B

54、青年女性患者，于某受凉淋雨后突发寒战、高热、胸痛、气急，咳铁锈色痰。体检左下肺有实变体征及湿性啰音，治疗用药应首选（）

A、安乃近

B、地塞米松

C、青霉素

D、棕色合剂

E、氨茶碱

答案：C

55、. 王某，70 岁，感染新型冠状病毒后出现呼吸困难和低氧血症。缺氧会对人体各组织器官造成损害，以下人体器官中对缺氧最敏感的是（）

A、心脏

B、肝脏

C、脑组织

D、肾脏

E、肺

答案：C

56、（17~20 题共用题干）盛先生，40 岁，因急性胆管炎入院治疗。治疗过程中发现病人神志淡漠、口唇发绀，呼吸急促。体格检查：T 39.4℃，P 142 次/分，R 32 次/分，BP 62/40mmHg。若病人在治疗过程中出现呼吸困难、发绀，PaO₂ 持续降低，应采取的措施是（）

A、加速补液速度

B、提高吸氧浓度

C、加大糖皮质激素剂量

D、气管插管行机械通气

E、应用血管活性药物

答案：D

57、[单选题]（三）A3 型题（3-4 题共用题干）26 床，王某，脑外伤后综合征入院 20 天，既往糖尿病史。陪护告知值班护士需要注射早餐前胰岛素后，前往配餐间。护士携带胰岛素到病房，没有查对，注射在 27 床李某身上。李某家属返回病房后，前往护士站询问。值班护士才发现胰岛素注射错误。下列哪项不是三查八对

的内容（）

- A、床号、姓名
- B、时间、用法
- C、有效期
- D、药物、浓度、剂量
- E、用药后反应

答案：E

58、（28~30 题共用题干）黄先生, 75 岁, 已婚男性。在家里突然昏倒, 立即被送入医院, 诊断为脑血管意外。黄先生的妻子告诉护士, 黄先生在发病前, 一直自服降压药以控制他的高血压。黄先生意识恢复, 但左侧肢体不能自主活动, 出现偏瘫。当病人的妻子询问病人痊愈的情况时, 护士恰当回答的选项是（）

- A、很难说, 但多数病人至少需要一年以上才能痊愈
- B、你好像对是否能恢复过去的生活方式很焦虑
- C、担心是否能痊愈是很正常的. 康复需要时间, 进程会稍慢一些
- D、你有些焦虑是正常的, 但没有办法可以估计你丈夫的恢复情况
- E、不要急, 王先生很快就会恢复如常的

答案：C

59、张女士, 63 岁, 因右上腹阵发性绞痛, 伴寒战高热、黄疸 12 小时入院, 诊断为急性梗阻性化脓性胆管炎, 急诊行胆囊切除+胆总管探查+T 管引流术术后 T 管引流的作用, 下列不妥的是（）

- A、防止胆汁性腹膜炎
- B、引流胆汁
- C、防止胆管狭窄、梗阻等并发症
- D、支撑胆道
- E、防止胆道出血

答案：E

60、（3~5 题共用题干）患者, 男, 18 岁, 电击伤后心搏骤停, 予以心肺复苏术和简易呼吸器进行抢救。现场心肺复苏包括 A、B、C 三个步骤, 其中人是（）

- A、人工循环
- B、人工呼吸
- C、开放气道
- D、除颤
- E、补液

答案：C

61、（7~10 题共用题干）患者, 男, 50 岁, 饮酒史近 20 年, 昨天与同事一起

聚餐饮白酒 6 两后出现言语含糊不清，视物模糊、步态不稳。判断患者最可能为（）

- A、急性胰腺炎
- B、痛症
- C、呼吸衰竭
- D、脑疝
- E、酒精中毒

答案：E

62、（24~27 题共用题干）病人，男性，45 岁。患十二指肠溃疡，突然出现呕血，面色苍白，脉搏 120 次/分，血压 60/45mmHg，医嘱输血 400ml，输血时出现皮肤瘙痒，眼睑、口唇水肿。导致此反应的原因可能是（）

- A、病人是过敏体质
- B、输入了异型血液
- C、快速输入低温库血
- D、病人出现了并发症
- E、血液被致热原污染

答案：A

63、杨某，男，24 岁。突然出现意识丧失，全身抽搐，眼球上翻，瞳孔散大，牙关紧闭，大小便失禁，持续约 2 分钟，清醒后对发病过程全无记忆该病人首要的急救处置是（）

- A、遵医嘱从速给药、控制发作
- B、注意保暖，避免受凉
- C、急诊做 CT，查找病因
- D、安全护理，防止外伤
- E、保持呼吸道通畅，防止窒息

答案：E

64、病人王某，35 岁，因急性阑尾炎合并穿孔，急诊在硬膜外麻醉下，行阑尾切除术。术后第二天病人主诉切口处疼痛，查体温为 38.2℃，此时护士为病人安置的体位是（）

- A、右侧卧位
- B、屈膝仰卧位
- C、头高足低位
- D、端坐位
- E、半坐卧位

答案：E

65、（11~16 题共用题干）李先生，45 岁，体重 60kg，因食管癌进食困难 1 个

月。主诉乏力，极度口渴，尿少而色深。体格检查 T36.7℃, BP80/50mmHg, 眼窝明显凹陷，唇干舌燥，皮肤弹性差。该病人目前主要的护理诊断/问题是（）

- A、体液过多
- B、体液不足
- C、活动无耐力
- D、有皮肤完整性受损的危险
- E、有受伤的危险

答案：B

66、二、A4型题（40题）2. 刘某，男，72岁，因慢性阻塞性肺气肿住院治疗。今早9时起开始静脉输入5%葡萄糖溶液500ml及0.9%氯化钠溶液500ml。滴速为70滴/分。10点钟左右，当护士来巡房时，发现病人咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，呼吸急促、大汗淋漓。护士首先应做的事情是（）

- A、立即通知医生
- B、给病人吸氧
- C、安慰病人
- D、立即停止输液
- E、协助病人取端坐卧位，两腿下垂

答案：D

67、二、A3型题（30题）（-3题共用题干）病人包某，男，24岁。因“风心病、房颤”入院，主诉心悸、头晕、胸闷、四肢乏力。护士为其切脉时发现脉搏细速、不规则，同一单位时间内心率大于脉率，听诊心率快慢不一，心律完全不规则，心音强弱不等。正确测量脉搏的方法是（）

- A、先测脉率，再测心率
- B、护士测脉率，医生测心率
- C、一人同时测脉率和心率
- D、一人听心率，一人测脉率，同时测1分钟
- E、一人测脉率，一人计时

答案：D

68、“（13~15题共用题干）患者，女，头部外伤昏迷3h，曾呕吐数次，入院时测血压150/80mmHg，脉搏70/min，呼吸15/min考虑”脑挫裂伤”使用上述药物时错误的一项是：（）”

- A、静滴时不与其他药物混合使用
- B、心功能不全及急性肺水肿病人禁用
- C、可用作肌肉注射

D、密切观察病人的血压、脉搏和呼吸，以防出现心功能不全

E、冬季时使用前检查是否有结晶

答案：C

69、（16~19 题共用题干）何某，女，38 岁，育有一子，长期采用药物避孕，居住北京，有哮喘史，无其它慢性病史，“十一”期间全家驾车去西藏旅游，由丈夫驾车。返回时因赶时间中途未休息，6 小时突然发生呼吸困难、气促、胸痛，立即到附近医院就诊。实验室检查：血浆 D-二聚体 900ug/l。如果医生的判断正确，下列选项中导致此病人出现呼吸困难的原因不可能是（）

A、心排出量降低导致混合静脉血氧饱和度下降

B、栓塞区和非栓塞区血流量改变致通气和血流灌注比例失调

C、左心房区升高使功能性闭合的卵圆孔重新开放

D、栓塞部位肺泡表面活性物质分泌减少致肺泡塌陷

E、炎性介质和血管活性物质释放引起肺泡毛细血管通透性增高

答案：C

70、（21~24 题共用题干）陈先生，40 岁，同种异体肾移植术后第 2 日，尿量 650ml/h。体格检查：T36.9℃，P84 次/分，BP138/87mmHg，CVP9cmH₂O。根据上述病情，该病人首先应考虑发生了（）

A、多尿期

B、肾动脉血栓形成或栓塞

C、急性排斥反应

D、急性肾衰竭

E、急性肾小管坏死

答案：A

71、患者，男性，80 岁，患有阿尔兹海默症，于上午 11:30 分在家属外出买饭后离开病房，12:00 家属返回病房发现患者不在，询问值班护士，护士立即采取相应措施后经多部门协助，于 12:15 在一楼楼梯口找到患者，安返病房。患者走失的主要原因有（）

A、环境因素

B、人为因素

C、疾病因素

D、管理因素

E、以上均对

答案：E

72、【A3 型题】（1~3 题共用题干）李某，女，2 个月，体温 38.3℃，新型冠状病毒核酸阳性，影像学显示双侧或多肺叶浸润，静息状态下，血液饱和度（SPO₂

93%) 出现呻吟、三凹症。儿童重型、危重型临床预警指标 ()

- A、外周血淋巴细胞下降
- B、呼吸窘迫
- C、D-二聚体升高
- D、精神反应差,嗜睡
- E、乳酸进行性下降

答案: D

73、(14T5 题共用题干) 患者男性, 45 岁。反复发生夜间呼吸困难 1 个月, 加重 1 天就诊, 体格检查: 血压 180/110mmHg, 呼吸急促, 双肺散在哮鸣音, 双肺底细湿啰音, 心率 130 次/分。在没有确诊支气管哮喘还是心源性哮喘情况下, 不宜应用的药物是 ()

- A、呋塞米
- B、吗啡
- C、氨溴索
- D、氨茶碱
- E、糖皮质激素

答案: B

74、(23~25 题共用题干) 病人王某, 女, 68 岁, 以呼吸困难嘴唇发绀、烦躁不安而急诊入院, 入院诊断为风湿性心脏病合并心力衰竭。次日, 病人出现烦躁不安, 为防止病人受伤, 护士应为其采取的保护措施是 ()

- A、使用绷带
- B、使用双套结固定肢体防止自伤
- C、使用双侧床档防止坠床
- D、使用双膝固定防止坠床
- E、使用肩部约束带防止碰伤

答案: C

75、患者女性, 85 岁, 输注维生素组液体速度约 70 滴每分, 输液过程中突然出现血压 190/120mmHg、心率 160 次/分, 呼吸困难, 咳嗽痰液为粉红色泡沫痰等状况。作为当班护士, 你怀疑患者出现了 () 情况

- A、过敏性休克
- B、急性左心衰
- C、输液反应
- D、原有病情加重
- E、急性呼吸衰竭

答案: B

76、（11~16 题共用题干）李先生, 45 岁, 体重 60kg, 因食管癌进食困难 1 个月。主诉乏力, 极度口渴, 尿少而色深。体格检查 T36.7℃, BP80/50mm]Hg, 眼 窝明显凹陷, 唇干舌燥, 皮肤弹性差。估计该病人丢失的液体占体重的比例是 ()

- A、1%~3%
- B、4%~6%
- C、7%~10%
- D、11%~15%
- E、16%~20%

答案: B

71、（12~14 题共用题干）病人江某, 男, 35 岁。持续高热 5 天, 精神萎靡, 每晨 9am 测得口腔温度 39.2° C 左右, 下午 4Pm 测得口腔温度 39.8° C 左右。此热型称为 ()

- A、稽留热
- B、弛张热
- C、间歇热
- D、不规则热
- E、异常热

答案: A

78、【A4 型题】（1~3 题共用题干）患者, 女性, 65 岁, 发热、咳嗽 3 天, 昏迷 2 小时急诊入院。患者近 1 个月来口干、多饮、多尿, 既往有冠心病病史。体格检查: 呼吸有烂苹果气味。辅助检查: 血糖 36mmol/L, 血钠 158mmol/L, 尿糖 (++++), 尿酮体 (++) , 血酮 17.8mmol/L。血气分析结果: pH 7.25, 血 HCO₃⁻ 14mmol/L。首要采取的措施是 ()

- A、吸氧
- B、心电监护
- C、静脉输液
- D、留置胃管
- E、留置导尿

答案: C

79、（ 28~29 题共用题干）张某, 男, 75 岁。因左侧股骨颈骨折入院, 术后生活不能自理。护士为其进行床上擦浴。擦浴过程中, 病人出现寒战、面色苍白、脉速, 护士应 ()

- A、请家属协助擦浴
- B、加快速度尽快完成擦浴
- C、嘱病人深呼吸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/546205240025010050>