

主治医师（全科医学）-儿科疾病(A1/A2 型题 1)

1、怀疑肠套叠的病人，可考虑选择以下哪项检查确诊

- A. 腹部 CT
- B. 腹部 MRI
- C. 腹部 B 超
- D. 腹部 X 线平片
- E. 肠镜

2、关于肠套叠的描述，不正确的是

- A. 好发于 2 岁以前男孩
- B. 属于单纯性肠梗阻
- C. 以腹痛、便血、腹部肿块为特征
- D. 幼儿肠套叠 48 小时内者可试行空气灌肠复位
- E. 慢性复发性肠套叠为手术适应证之一

3、早期肠套叠最佳的治疗方法是

- A. 颠簸疗法
- B. 口服植物油
- C. 手术切除套叠部分
- D. 空气灌肠
- E. 胃肠减压、解痉、镇痛

4、10 个月女孩，因频繁吐奶、排血样便 2 次就诊，诊断为肠套叠，经空气灌肠复位症状消失，半天后又排血样便，无呕吐，此时应如何处理

- A. 手术切除坏死肠段
- B. 口服止血药物
- C. 抗感染
- D. 第二次空气灌肠复位
- E. 向家人解释为正常情况，无需处理

5、急性肾炎的主要临床表现有

- A. 水肿，蛋白尿，高血压，少尿
- B. 高血压，水肿，少尿
- C. 少尿，血尿，蛋白尿，低蛋白血症
- D. 血尿，水肿，高血压，程度不同的肾功能损害
- E. 血尿，少尿，水肿

6、急性肾炎患者在病程早期突然发生惊厥，以下情况哪项可能性最大

- A. 高热惊厥
- B. 低钙惊厥
- C. 低钠综合征

D. 高血压脑病

E. 低血糖

7、急性肾炎小儿恢复上学的指标是

A. 尿蛋白消失

B. 血沉正常

C. 镜下血尿消失

D. ASO 正常

E. 阿迪计数正常

8、急性肾小球肾炎的常见致病菌是

A. 溶血性链球菌

B. 葡萄球菌

C. 肺炎链球菌

D. 柯萨奇病毒

E. 草绿色链球菌

9、急性肾小球肾炎治疗初期使用抗生素的目的是

A. 治疗疾病本身

B. 预防复发

C. 预防并发感染

D. 彻底清除体内残存细菌

E. 治疗并发感染

10、肾炎性肾病与单纯性肾病的主要鉴别点是

- A. 大量蛋白尿
- B. 血尿，高血压
- C. 高胆固醇症
- D. 低蛋白血症
- E. 高度水肿

11、以下哪项不是肾病综合征的并发症

- A. 肾静脉栓塞
- B. 原发性腹膜炎
- C. 低钙抽搐
- D. 低血容量
- E. 循环充血

12、原发肾病综合征饮食治疗正确的是

- A. 严格限制水的摄入量以免加重水肿
- B. 水肿阶段给予低盐饮食
- C. 低蛋白饮食以免加重蛋白尿
- D. 低热量饮食以免出现脂肪肝
- E. 低钙饮食以免肾结石

13、癫痫发作不包括

- A. 强直-阵挛发作
- B. 强直性发作
- C. 失神发作
- D. 精神症状发作
- E. 不典型发作

14、单纯局灶性发作特点是

- A. 无意识丧失，也无发作后不适
- B. 持续时间平均 30~40 分钟
- C. 一过性短暂意识障碍
- D. EEG 有典型的全脑同步 3Hz 棘慢复合波
- E. 全身肌肉强直痉挛

15、关于癫痫的病因，以下哪项是不正确的

- A. 特发性癫痫是由遗传因素决定的
- B. 特发性癫痫占癫痫总数的大部分
- C. 继发性癫痫常有脑内结构异常
- D. 隐源性癫痫很可能为症状性癫痫
- E. 遗传因素相关者占 20%~30%

16、在癫痫的保健指导中以下哪项是不正确的

- A. 培养良好生活习惯，保持精神愉快
- B. 发作次数减少时可减少药量
- C. 发作次数增多时可加大药量
- D. 定期检查肝、肾功能，钠、磷、碱性磷酸酶等
- E. 癫痫是不治之症

17、以下哪项不支持脑瘫诊断

- A. 运动发育落后
- B. 肌张力异常
- C. 姿势异常
- D. 反射异常
- E. 病变呈进行性加重

18、近年国内外一致认为脑瘫的主要病因是

- A. 早产和低出生体重
- B. 脑缺氧缺血
- C. 胚胎早期阶段的发育异常
- D. 胆红素脑病
- E. 产伤

19、对脑瘫儿的训练护理措施以下哪项是不正确的

- A. 定期检查外周血象
- B. 感知觉训练
- C. 加强语言训练
- D. 加强日常生活活动的训练
- E. 根据智力和瘫痪情况安排训练日程

20、婴幼儿化脓性脑膜炎最常见的病原菌是

- A. 脑膜炎双球菌及大肠杆菌
- B. 脑膜炎双球菌、肺炎双球菌及流感嗜血杆菌
- C. 金黄色葡萄球菌及流感嗜血杆菌
- D. 金黄色葡萄球菌及铜绿假单胞菌
- E. 以上都不是

21、化脓性脑膜炎的健康指导哪项不正确

- A. 保持病房安静、空气清新、卧床休息
- B. 保持皮肤干洁、被服勤换、防止压疮
- C. 给予营养丰富的流质或半流质饮食
- D. 鼻饲时头正位以防呕吐物呛入
- E. 注意口腔卫生，少量多次饮水

22、化脓性脑膜炎处理中哪项不正确

- A. 肺炎链球菌常规用青霉素

- B. 脑膜炎球菌一般首选头孢菌素
- C. 金黄色葡萄球菌选用万古霉素
- D. 对肺炎链球菌抗生素疗程 10~14 天
- E. 对革兰阴性杆菌抗生素疗程应在 21 天以上

23、典型化脓性脑膜炎的脑脊液特点

- A. 外观混浊，可呈脓样，蛋白显著增高，糖减少
- B. 清亮至微浊，白细胞正常至数百，以淋巴细胞为主
- C. 糖和氯化物正常，压力升高
- D. 脑脊液墨汁染色阳性
- E. 毛玻璃样，糖和氯化物减少

24、以下哪项不是化脓性脑膜炎的并发症和后遗症

- A. 硬脑膜下积液
- B. 脑室管膜炎
- C. 抗利尿激素异常分泌综合征
- D. 脑积水
- E. 心功能衰竭

25、以下哪种疾病不属于自身免疫性疾病

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 幼年性特发性关节炎

C. 地中海贫血

D. 过敏性紫癜

E. 川崎病

26、川崎病时皮肤黏膜表现中最具有特征性的改变是

A. 皮疹

B. 指（趾）端变化

C. 眼球结膜充血

D. 杨梅舌

E. 唇红干燥、皲裂

27、以下哪一项不是应用激素的指征

A. 类风湿病伴心包炎

B. 风湿性心肌炎

C. 川崎病伴冠状动脉瘤

D. 系统性红斑狼疮

E. 过敏性紫癜有消化道症状

28、以下哪种抚养习惯有利于先天性髋关节脱位自然复位

A. 背篋背孩子使髋部保持外展屈曲位

B. 把婴儿下肢伸直包于襁褓内

C. 让婴儿自然体位

D. 让婴儿头部靠向大人的肩膀，下肢呈下垂位

E. 斜抱婴儿，髋关节屈曲位

29、先天性髋关节脱位是

A. 股骨头和颈部发育正常

B. 髋关节关节囊和韧带紧张

C. 夏天多见

D. 与胎儿体位无关

E. 髋臼先天发育不良和关节囊松弛而引起股骨头脱位

30、先天性髋关节脱位新生儿期治疗方法是

A. 手法整复

B. 支具辅助的自然复位

C. 手术

D. 理疗

E. 不需干预

31、先天性髋关节脱位复位的正确体位是

A. 髋关节保持伸直、外展、外旋位

B. 髋关节保持伸直、内收、内旋位

C. 髋关节保持屈曲、外展、外旋位

D. 髋关节保持屈曲、内收、内旋位

E. 自然体位

32、关于新生儿先天性髋关节脱位以下哪项是不正确的

A. 治愈率低

B. 需要复查

C. 治疗简单

D. 多预后良好

E. 漏诊率高

33、我国流行性脑脊髓膜炎流行的主要菌群是

A. A 群

B. B 群

C. C 群

D. D 群

E. E 群

34、流行性脑脊髓膜炎的主要临床特征是

A. 急起高热、头痛、呕吐、昏迷、脑膜刺激征

B. 急起高热、头痛、呕吐、昏迷、呼吸衰竭

C. 急起高热、惊厥、呼吸衰竭

D. 缓慢起病，发热不明显、头痛剧烈，无休克

E. 急起高热、头痛、呕吐、皮肤黏膜瘀点瘀斑、脑膜刺激征

35、确诊流行性脑脊髓膜炎的主要依据是

- A. 脑脊液呈化脓性
- B. 血清特异性抗体检测阳性
- C. 皮肤黏膜瘀点瘀斑
- D. 当地有流脑流行
- E. 血液、脑脊液涂片镜检或培养发现脑膜炎双球菌

36、流行性脑脊髓膜炎的病原治疗首选以下哪种药物

- A. 磺胺类
- B. 氯霉素
- C. 青霉素
- D. 链霉素
- E. 头孢菌素

37、麻疹的出疹时间与发热的关系是

- A. 发热 2~3 日出疹，出疹时仍发热
- B. 发热 1~2 日出疹，热退疹出
- C. 发热 3~4 日出疹，出疹期热更高
- D. 发热 3~4 日出疹，热退疹出
- E. 发热 5~6 日出疹，出疹时可以发热

38、麻疹前驱期最有诊断价值的表现是

- A. 皮肤红色斑丘疹
- B. 上呼吸道卡他症状
- C. 口腔麻疹黏膜斑
- D. 结膜炎
- E. 高热

39、典型的麻疹皮疹最先出现的部位是

- A. 耳后、颈部
- B. 面部
- C. 躯干部
- D. 上肢
- E. 下肢

40、初次接种麻疹减毒活疫苗的适宜年龄是

- A. 出生后第 2 天
- B. 生后 2 个月
- C. 生后 4 个月
- D. 生后 8 个月
- E. 生后 1 岁

41、与麻疹相比较，风疹的临床特点是

- A. 前驱期短，卡他症状轻微，出疹和消退进程更快，疹退无色素沉着
- B. 前驱期短，低热和不发热，皮疹 2 日内出齐，疹退无色素沉着
- C. 前驱期短，卡他症状轻微，皮疹出齐至掌跖部，疹退细小脱屑和无色素沉着
- D. 前驱期短，卡他症状轻微，出疹和消退进程更快，疹退轻微色素沉着
- E. 前驱期短，低热和不发热，皮疹 1 日内出齐，疹退糠麸样脱屑

42、风疹的出疹特点是

- A. 发热 3~4 小时开始，自耳后、发际、颌面、颈出疹，渐及躯干及四肢，最后见于手足心
- B. 发热 1~2 天开始，最早见面颊部，迅速扩展至躯干和四肢，24 小时内布满全身，但手足心通常无皮疹
- C. 高热退出疹
- D. 发热数小时到 1 天出疹，分批出现，向心性分布，以躯干、头、腰部多见
- E. 玫瑰红色融合性斑丘疹，先分布于鼻翼两侧，1~2 天蔓延至全身

43、风疹的隔离期通常是

- A. 出疹后 5 天，亦可以不隔离
- B. 出疹后 7 天

- C. 出疹后 10 天
- D. 并发肺炎者，出疹后 10 天
- E. 并发肺炎者，出疹后 2 周

44、风疹疫苗的注射时间是

- A. 生后 24 小时
- B. 1 月龄
- C. 6 月龄
- D. 8 月龄
- E. 1 岁以上

45、治疗肺炎链球菌性肺炎首选抗生素为

- A. 红霉素
- B. 庆大霉素
- C. 林可霉素
- D. 青霉素
- E. 卡那霉素

46、小儿肺炎吸氧指征为

- A. 呼吸困难、口唇发绀、烦躁不安
- B. 咳嗽剧烈
- C. 高热

- D. 并发脓胸
- E. 可闻及较多湿啰音

47、小儿肺炎合并中毒性脑病时治疗包括

- A. 静注甘露醇
- B. 利尿剂
- C. 地塞米松
- D. 能量合剂
- E. 以上都对

48、重症肺炎常存在的酸碱平衡紊乱是

- A. 呼酸
- B. 代酸
- C. 呼碱
- D. 代碱
- E. 呼酸加代酸

49、2 月男婴，因腹泻 1 周来到儿科门诊，大便稀水样，带奶瓣，无发热，吃奶好。体检：营养发育可，无脱水貌，心肺正常，腹平软，无触痛。化验：大便 WBC(-)，RBC(-)，脂肪球(++)。此患儿最不可能出现的情况为

- A. 生理性腹泻

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/547045116164006156>