

一、单选题

1. 输液部位出现疼痛，伴红肿，可触及条索状静脉。上述情况根据 INS 静脉炎分级可诊断为几级：(C)
 - A. 1 级
 - B. 2 级
 - C. 3 级
 - D. 4 级
 - E. 5 级
2. 开放性气胸发生纵隔摆动的原因 (B)
 - A. 伤侧胸膜腔内的压力超过大气压
 - B. 吸气与呼气时两侧胸膜腔内压力差的改变
 - C. 伤侧肺不张
 - D. 纵隔移向健侧
3. 食管癌术后最严重的并发症 (D)
 - A. 乳糜胸
 - B. 脓胸
 - C. 血胸
 - D. 吻合口瘘
4. 下列描述正确的是 (D)
 - A. 小细胞肺癌发生率较鳞癌低,以周围型肺癌出现
 - B. 肺癌以肺泡细胞癌最常见
 - C. 腺癌的发生率比鳞癌低,但预后比鳞癌好
 - D. 小细胞肺癌对放疗和化疗敏感,但恶性程度高
5. 食管癌的主要转移途径是 (B)
 - A. 血行转移
 - B. 淋巴转移
 - C. 种植转移
 - D. 直接蔓延
6. 收到护士执业注册申请的卫生主管部门应当自收到申请之日起多少个工作日内作出决定准予注册或不予注册 (A)
 - A. 20
 - B. 30
 - C. 40
 - D. 50
7. 患者发生胸管脱出后，应立即 (A)
 - A. 立即捏紧伤口处皮肤
 - B. 做好心理护理
 - C. 嘱卧床休息
 - D. 通知医师给予换药
8. 胸部骨折后可出现反常呼吸的是 (A)
 - A. 多根多处肋骨骨折
 - B. 开放性气胸
 - C. 闭合性气胸
 - D. 张力性气胸

9. 护士申请延续注册的时间应为 (B)
- A. 有效期届满前半年
 - B. 有效期届满前 30 日
 - C. 有效期届满后 30 日
 - D. 有效期届满后半年
10. 护士在紧急情况下为抢救患者生命实施必要的紧急救护, 应该做到以下几点, 但除外 (B)
- A. 必须依照诊疗技术规范
 - B. 必须有医师在场指导
 - C. 根据患者的实际情况和自身能力水平进行力所能及的救护
 - D. 避免对患者造成伤害
11. 以下哪项不属于专科护士的职能 (D)
- A. 提供某一领域的临床护理服务
 - B. 开展专科领域的护理研究
 - C. 对同业的护理人员提供专科领域的信息和建议
 - D. 对专科疾病的诊断和治疗提供建议和指导
12. 护士执业注册的有效期为 (B)
- A. 2 年
 - B. 5 年
 - C. 8 年
 - D. 10 年
13. 申请注册的护理专业毕业生, 应在教学或综合医院完成临床实习, 其时限至少为 (B)
- A. 6 个月
 - B. 8 个月
 - C. 10 个月
 - D. 12 个月
14. 《护士条例》的根本宗旨是 (A)
- A. 维护护士合法权益
 - B. 促进护理事业发展, 保障医疗安全和人体健康
 - C. 规范护理行为
 - D. 保持护士队伍稳定
15. 护士发现医师医嘱可能存在错误, 但仍然执行错误医嘱, 对病人造成严重后果, 该后果的法律责任承担者是 (C)
- A. 开写医嘱的医师
 - B. 执行医嘱的护士
 - C. 医师和护士共同承担
 - D. 医师和护士无需承担责任

16. 取得以下哪种法律文书，则代表持有者具备护士执业资格，可以从事护理专业技术活动 (A)
- A. 《护士执业证书》
 - B. 高等学校护理学专业毕业证书
 - C. 《专科护士培训合格证书》
 - D. 《护理员资格证书》
17. 医疗废物达到包装袋或者锐器盒多少时，采用鹅颈式封口，分层封扎 (A)
- A. 四分之三
 - B. 三分之二
 - C. 三分之一
 - D. 二分之一
18. 积极参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊等活动，主动开展公众健康教育，体现了《医疗机构从业人员行为规范》的 (C)
- A. 优质服务， 医患和谐
 - B. 严谨求实， 精益求精
 - C. 乐于奉献， 热心公益
 - D. 尊重患者， 关爱生命
19. 病区对护理不良事件进行分析，制定整改措施，追踪评价至少 (B)
- A. 5
 - B. 4
 - C. 3
 - D. 6
20. 枕骨大孔疝与小脑幕切迹疝主要鉴别点在于 (E)
- A. 头痛剧烈
 - B. 呕吐频繁
 - C. 脉搏加快， 血压升高
 - D. 躁动不安
 - E. 呼吸骤停在早期出现
21. 硬膜外血肿常见部位是 (D)
- A. 顶部
 - B. 后颅窝
 - C. 双额部
 - D. 额颞部
22. 下列哪种肿瘤属于神经上皮肿瘤 (B)
- A. 垂体瘤
 - B. 脉络丛乳头状瘤
 - C. 神经鞘瘤
 - D. 脑膜瘤
 - E. 颅咽管瘤
23. 心脏骤停时最迅速有效的处理是 (E)
- A. 口对口人工呼吸
 - B. 纯氧人工呼吸
 - C. 胸外按压
 - D. 胸内心脏按压

- E. 胸外按压同时行人工呼吸
24. 确定深昏迷最有价值的体征是 (B)
- A. 对外界环境无反应
 - B. 深浅反射消失
 - C. 呼之不应
 - D. 眼球固定
 - E. 血压下降, 呼吸浅快
25. 加速康复外科建议无胃肠道动力障碍患者术前禁食 固体饮食? (A)
- A. 6 h
 - B. 8 h
 - C. 10 h
 - D. 4 h
26. 骨科手术前特别重视的准备是 (C)
- A. 选择麻醉方式
 - B. 胃肠道准备
 - C. 手术区皮肤准备
 - D. 药物过敏试验
27. 骨科手术后疼痛控制在 (A)
- A. ≤ 4
 - B. ≤ 3
 - C. ≤ 5
 - D. 小于 4
28. 关节置换术后最严重的并发症是 (B)
- A. 脱位
 - B. 感染
 - C. 功能障碍
 - D. 失眠
29. 快速康复理念预计手术时间多久, 可以不留置尿管 (B)
- A. $> 2h$
 - B. $< 2h$
 - C. $\leq 2h$
 - D. $< 3h$
30. 股骨颈骨折的典型表现 (B)
- A. 患肢髋屈曲, 外展外旋
 - B. 患肢缩短, 外旋畸形
 - C. 患肢内旋、内收
 - D. 以上均不是
31. 全身活动范围最大的关节是 (C)
- A. 肩锁关节
 - B. 胸锁关节
 - C. 肱盂关节
 - D. 肘关节
32. 以下不是股骨颈骨折的治疗原则 (B)
- A. 牵引

- B. 患肢制动
 - C. 人工股骨头置换
 - D. 全髋关节置换
33. 脊柱手术后患者易采用的饮食 (B)
- A. 高热量、低蛋白
 - B. 高蛋白、高维生素
 - C. 高维生素、低蛋白
 - D. 高脂肪、高蛋白
34. 三人搬运患者, 甲乙丙三位护士应注意 (D)
- A. 三人两腿直立, 两臂弯曲
 - B. 三人分别站立两侧同时抬起
 - C. 一人固定颈部放置弯曲
 - D. 三人合力抬起, 患者身体向护士倾斜
35. 以下哪项不是一级护理服务标准分级依据 (D)
- A. 病情趋向稳定的重症患者
 - B. 病情不稳定或随时可能发生变化的患者
 - C. 手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者
 - D. 自理能力中度依赖的患者
36. 复岗培训是指休病假、事假、产假、探亲假及陪护假或外出学习、考察等脱离工作岗位连续 (D) 天及以上的护理人员
- A. 15
 - B. 30
 - C. 60
 - D. 90
37. 关于交叉配血标本送检不正确的是 (B)
- A. 普通常规输血 30 分钟
 - B. 普通常规输血 60 分钟
 - C. 紧急输血 10 分钟
 - D. 急症输血 15 分钟
38. 下列属于危急值项目的是 (A)
- A. 术后体温 38□
 - B. 消化道出血
 - C. 心包填塞
 - D. 急性坏死性胰腺炎
39. 以下不是骨折的特有体征 (B)
- A. 畸形
 - B. 弹性固定
 - C. 反常活动
 - D. 骨擦音
40. 骨折的早期并发症是 (A)
- A. 骨筋膜室综合征
 - B. 骨化性肌炎
 - C. 创伤性关节炎
 - D. 缺血性骨坏死

41. 骨筋膜室综合征最常见的部位是 (D)
- A. 肘部
 - B. 手指
 - C. 腕部
 - D. 小腿和前臂
42. 胆管每日分泌胆汁量是多少? (A)
- A. 800 1200ml
 - B. 600 800ml
 - C. 500 800ml
 - D. 300 500ml
43. 抽出的药液和配置好的静脉输注用无菌液体, 放置时间不应超过 (B)
- A. 2h
 - B. 4h
 - C. 6h
 - D. 8h
44. 以下移植方法哪一类存活率最高 (A)
- A. 自体移植
 - B. 同质移植
 - C. 充分配型后移植
 - D. 同种异体移植
 - E. 异种异体移植
45. 肾移植术后最容易发生的感染是 (B)
- A. 尿路感染
 - B. 肺部感染
 - C. 手术切口感染
 - D. 移植肾感染
 - E. 败血症
46. 移植肾一般放置的位置为 (A)
- A. 髂窝
 - B. 原位
 - C. 盆腔
 - D. 腹部
 - E. 腰部
47. 肾移植早期最常见的并发症为 (A)
- A. 出血或血肿
 - B. 感染
 - C. 消化道出血
 - D. 尿瘘
 - E. 高热
48. 移植术后 24 小时内发生的排斥反应, 首先考虑 (A)
- A. 超急性排斥反应
 - B. 急性排斥反应
 - C. 亚急性排斥反应
 - D. 症状性排斥反应

- E. 慢性排斥反应
49. 急性排斥反应多发生在移植后 (A)
- A. 1 个月内
 - B. 3 4日
 - C. 1 2日
 - D. 2 3日
 - E. 24 小时内
50. 艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、流行性乙型脑炎属于哪类传染病 (B)
- A. 甲类
 - B. 乙类
 - C. 丙类
 - D. 丁类
51. 确定输血后，医护人员持输血申请单和贴好标签的试管，当面核对患者的 (D)
- A. 姓名、性别、年龄
 - B. 病案号、病室/门急诊、床号
 - C. 血型和诊断，采集血样
 - D. 以上都要核对
52. 患者，女性，肝移植术后 5 天，诊断为“急性排斥反应”，首选药物为 (D)
- A. 抗生素
 - B. 止血药
 - C. 环孢素
 - D. 甲基泼尼松龙
 - E. 水溶性维生素
53. 急性排斥反应多发生在移植后 (A)
- A. 1 个月内
 - B. 3~4 日
 - C. 1~2 日
 - D. 2~3 日
 - E. 24 小时内
54. 按移植植物来源将移植分为 (E)
- A. 自体移植
 - B. 同质移植
 - C. 同种异体移植
 - D. 异种异体移植
 - E. 以上 4 种都对
55. 以下不属于移植术后免疫抑制治疗方案用药的是 (D)
- A. FK 506
 - B. MMF
 - C. 激素
 - D. 抗生素
56. 移植术后 24 小时内发生的排斥反应，首先考虑 (A)
- A. 超急性排斥反应
 - B. 急性排斥反应

- C. 亚急性排斥反应
 - D. 症状性排斥反应
 - E. 慢性排斥反应
57. 目前应用最广泛的器官保存液 (C)
- A. 生理盐水
 - B. 蒸馏水
 - C. UW 液
 - D. 中药
58. 以下不属于肝移植术后并发症的是 (E)
- A. 排斥反应
 - B. 肺部感染
 - C. 胆瘘
 - D. 术后出血
 - E. 肢体麻木
59. 肝硬化早期诊断最可靠的方法是 (C)
- A. 肝功能检查
 - B. B 型超声
 - C. 腹腔镜直视下活检
 - D. CTE、食管钡餐透视
60. 行小量不保留灌肠配置“1、2、3”溶液时, 50%硫酸镁、甘油和温开水的量分别是 (A)
- A. 30ml, 60ml, 90ml
 - B. 1ml, 2ml, 3ml
 - C. 10ml, 20ml, 30ml
61. 鼻饲液输注前抽吸胃液胃滞留量大于_____属于胃潴留,严重者可引起胃食管反流 (A)
- A. 150ml
 - B. 100ml
 - C. 200ml
 - D. 250ml
62. 医疗废物登记资料至少保留 (D)
- A. 半年
 - B. 1 年
 - C. 2 年
 - D. 3 年
63. 预防性应用抗菌药物, 术中需要追加的情况见于 (D)
- A. 手术时间大于 3 小时
 - B. 手术时间大于 2 小时
 - C. 术中失血量大于 1500ml
 - D. A 和 C
 - E. B 和 C
64. 食管全长约 (C)
- A. 20cm
 - B. 30cm
 - C. 25cm
 - D. 35cm

- E. 40cm
65. 胆汁是由哪一部分分泌的 (B)
- A. 胆囊
 - B. 肝细胞
 - C. 肝小叶
 - D. 胆小管
 - E. 肝窦
66. 外周阻力是指 (A)
- A. 小动脉和微动脉处的血流阻力
 - B. 毛细血管的血流阻力
 - C. 主动脉及其分支的血流阻力
 - D. 微静脉和小静脉的血流阻力
 - E. 腔静脉的血流阻力
67. 低脂 (或低蛋白) 饮食是指每日进食脂肪 (或蛋白质) 不超过 (C)
- A. 20g
 - B. 30g
 - C. 40g
 - D. 50g
 - E. 60g
68. 抢救链霉素过敏性休克加用钙剂的目的是 (A)
- A. 缓解低血钙
 - B. 降低毛细血管通透性
 - C. 中和链霉素杂质
 - D. 抗过敏
69. 人体最主要的呼吸肌是 (A)
- A. 膈肌和肋间肌
 - B. 膈肌和腹肌
 - C. 肋间肌和腹肌
 - D. 腹肌和颈部肌肉
70. 我国引起肝硬化的最常见的原因是 (C)
- A. 酒精中毒
 - B. 营养障碍
 - C. 病毒性肝炎
 - D. 胆汁淤积
 - E. 循环障碍
71. 下列哪项不是门脉高压的临床表现 (D)
- A. 腹水
 - B. 食管静脉曲张
 - C. 脾大
 - D. 末梢血象全血细胞减少
 - E. 蜘蛛痣, 肝掌
72. 肝硬化脾肿大的主要原因是 (B)
- A. 腹水压迫使脾血回流受阻
 - B. 门静脉高压

- C. 肝动脉压力增高
 - D. 毒物刺激
 - E. 肝静脉压力增高
73. 门脉高压的特异性表现是 (D)
- A. 腹水
 - B. 脾肿大
 - C. 脾功能亢进
 - D. 侧支循环开放
 - E. 肝掌, 蜘蛛痣
74. 急性胰腺炎患者应禁用下列那种药物 (C)
- A. 生长抑素
 - B. 哌替啶
 - C. 吗啡
 - D. 西米替丁
75. 体内氨的主要去路: (A)
- A. 在肝脏合成尿素
 - B. 形成酪胺酰胺储存
 - C. 合成氨基酸
 - D. 合成含氮化合物
76. 门脉高压引起的上消化道出血宜选用: (B)
- A. 维生素 K
 - B. 垂体后叶素
 - C. 安络血
 - D. 止血敏
 - E. 止血芳酸
77. 虽然发生了错误事实, 但未给患者机体与功能造成任何损害, 或有轻微后果但无需任何处理可完全康复, 属于 (C) 事件
- A. □级事件 (警告事件)
 - B. □级事件 (不良后果事件)
 - C. □级事件 (未造成后果事件)
 - D. □级事件 (隐患事件)
78. 主要通过消化道传播的肝炎 (A)
- A. 甲型肝炎
 - B. 乙型肝炎
 - C. 丙型肝炎
 - D. 丁型肝炎
 - E. 戊型肝炎
79. 患者解黑便时提示出血量在: (C)
- A. 30ml
 - B. 80ml
 - C. 50~70ml
 - D. 20ml
80. 减少胰腺分泌的重要护理措施是: (D)
- A. 应用生长抑素

- B. 抗炎治疗
 - C. 禁食
 - D. 禁食和胃肠减压
81. 下列哪个属于非同步电除颤的适应症? (B)
- A. 室上性心动过速
 - B. 心室颤动
 - C. 快速型心房纤颤
 - D. 室性心动过速
82. 我国第一部《护士条例》从什么时候开始实施: (B)
- A. 2008/5/5
 - B. 2008/5/12
 - C. 2008/5/10
 - D. 2009/5/12
 - E. 2007/5/12
83. 医疗机构收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾属于什么废物 (D)
- A. 病理性废物
 - B. 严重污染性废物
 - C. 生活垃圾
 - D. 感染性废物
 - E. 损伤性废物
84. 护士发现医师医嘱可能存在错误, 但仍然执行错误医嘱, 对病人造成严重后果, 该后果的法律责任承担者是 (C)
- A. 开写医嘱的医师
 - B. 执行医嘱的护士
 - C. 医师和护士共同承担
 - D. 医师和护士无需承担责任
 - E. 处理医嘱护士承担
85. 下列哪项符合卫生手消毒的概念: (D)
- A. 医务人员用速干毒剂揉搓双手, 以减少部分致病菌的过程
 - B. 医务人员用肥皂和流动水洗手, 以减少暂居菌的过程
 - C. 医务人员用肥皂和流动水洗手, 以去除手部皮肤污垢的过程
 - D. 医务人员用速干毒剂揉搓双手, 以减少暂居菌的过程
 - E. 医务人员用速干毒剂揉搓双手, 以杀灭手部暂居菌的过程
86. 下列叙述不正确的是 (C)
- A. 在病人入院 2 小时内进行入院评估及病史收集
 - B. 实施护理措施应本着舒适和安全的原则
 - C. 病人入院后 48 小时内制定护理计划
 - D. 100%的完成所管病人的出院总结
 - E. 应经常、准确、持续地记录病人状况
87. 在无菌技术操作原则中, 预防交叉感染的关键措施是: (C)
- A. 操作区域要清洁、宽敞
 - B. 取无菌物品时, 必须使用无菌持物钳
 - C. 一份无菌物品只能供一个病人使用
 - D. 无菌物品与非无菌物品分别放置

- E. 无菌物品疑有污染不可再用
88. 《医疗废物管理条例》于何时颁布 (A)
- A. 2003/6/16
 - B. 2003/7/16
 - C. 2004/6/16
 - D. 2004/7/16
 - E. 2005/7/16
89. 以下哪个部门负责对医疗卫生机构的医疗废物管理工作实施监督 (A)
- A. 县级以上地方人民政府卫生行政主管部门
 - B. 县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门
 - C. 县级以上地方人民政府工商行政管理部门
 - D. 县级以上地方人民政府建设主管部门
 - E. 市级以上地方人民政府卫生行政主管部门
90. 发生医疗废物管理不当导致 1 人以上死亡或者 3 人以上健康损害重大事故时, 县级、省级卫生行政主管部门逐级上报的时限是多少 (B)
- A. 6 小时
 - B. 12 小时
 - C. 24 小时
 - D. 48 小时
 - E. 72 小时
91. 书写护理诊断的注意事项不正确的是: (E)
- A. 诊断明确, 简单易懂, 使用标准护理诊断
 - B. 一个诊断针对一个具体问题
 - C. 要有充足的主、客观资料作为支持护理诊断的依据
 - D. 护理诊断的原因部分必须明确, 潜在的护理诊断应列出危险因素, 以便为护理活动提供方向
 - E. 护理诊断的原因必须明确, 潜在的护理诊断无需列出危险因素
92. 盛装医疗废物的包装袋或容器应符合哪项规定 (C)
- A. 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》
 - B. 《医疗机构管理条例》
 - C. 《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》
 - D. 《医院消毒卫生标准》
 - E. 《消毒管理办法》
93. 《医疗废物分类目录》将医疗废物分几类 (C)
- A. 3 类
 - B. 4 类
 - C. 5 类
 - D. 6 类
 - E. 7 类
94. 由于及时发现错误, 但未形成事实, 属于 (D) 级不良事件?
- A. □级
 - B. □级
 - C. □级
 - D. □级

95. 护士被吊销执业证书的，不得申请执业注册是自执业证书被吊销之日起：(B)
- A. 一年
 - B. 两年
 - C. 三年
 - D. 四年
 - E. 五年
96. 申请护士执业注册的时限为通过护士执业资格考试之日起 (C)
- A. 1年内
 - B. 2年内
 - C. 3年内
 - D. 4年内
 - E. 5年内
97. 医疗卫生机构对医疗废物实施分类管理的根据是什么 (B)
- A. 《消毒管理办法》
 - B. 《医疗废物分类目录》
 - C. 《医疗器械管理条例》
 - D. 《传染病防治法》
 - E. 《医院消毒卫生标准》
98. 非预期的死亡，或是非疾病自然进展过程中造成永久性功能丧失，属于 (A) 级不良事件？
- A. □级
 - B. □级
 - C. □级
 - D. □级
99. 蛛网膜下腔出血患者不应出现 (C)
- A. 频繁呕吐
 - B. 一过性意识障碍
 - C. 一侧肢体瘫痪
 - D. 脑膜刺激征
 - E. 剧烈头疼
100. 张力性气胸急救的首选措施是：(E)
- A. 胸膜腔闭式引流
 - B. 尽早剖胸探查、修补裂口
 - C. 使用足量抗生素预防感染
 - D. 加压包扎胸壁
 - E. 粗针头于患侧第2肋间锁骨中线处刺入胸膜腔排气减压
101. 心肌梗塞的病人主要死亡原因是：(A)
- A. 心源性休克
 - B. 心力衰竭
 - C. 心律失常
 - D. 心脏破裂
 - E. 附壁血栓
102. 细菌性心内膜炎最常累及的瓣膜是：(A)
- A. 二尖瓣

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/547051013046006041>