专业《执业药师之西药学专业二》考试必背200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年广西壮族自治区巴马瑶族自治县《执业药师之西药学专业二》考试必背200题通关秘籍题库带答案（完整版）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.用于肝病的氨基酸制剂的是

A：复方氨基酸注射液（6AA）

B：复方氨基酸注射液（18AA）

C：复方氨基酸注射液（9AA）

D：赖氨酸注射液

答案：A

2.低致吐性化疗药物所引起的恶心呕吐,宜选用的止吐治疗方案是()

A：化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予2天的地塞米松或昂丹司琼

B：化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

C：化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药

D：化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予2天的阿瑞吡坦和2~3天的地塞米松

答案：C

3.不属于氟喹诺酮类的药物是

A：莫西沙星

B：小檗碱

C：依诺沙星

D：环丙沙星

答案：B

4.门冬酰胺酶能抑制蛋白质的合成，使细胞停止于()，从而降低其对甲氨蝶呤的敏感性，限制甲氨蝶呤的骨髓毒性

A: G

B: M期

C: G

D: G

答案：D

5.较常引起外周神经炎的抗癌药是

A: 甲氨蝶呤

B: 长春新碱

C: 巯嘌呤

D: 氟尿嘧啶

答案：B

6.功能性子宫出血可选用的药物是()

A: 米非司酮

B: 司坦唑醇

C: 雌二醇

D: 他莫昔芬

答案：C

7.在体内不易蓄积,适用于老年和肾功能不全患者的胰岛素促泌剂类降糖药是（）

A: 利拉鲁肽

B: 艾塞那肽

C: 瑞格列奈

D: 罗格列酮

答案：C

8.噻托溴铵平喘的主要机制是ABCDE

A: 激动肾上腺素 β2受体

B: 抑制白三烯受体

C: 拮抗M胆碱受体

D: 阻断腺苷受体

答案：C

9.常规剂量应用多潘立酮不易导致的不良反应是

A: 男子乳房女性化

B: 锥体外系反应

C: 女性月经不调

D: 室性心律失常

答案：B

10.刺激胰岛B细胞分泌胰岛素的是

A: A和B均无效

B: 胰岛素

C: 二甲双胍

D: 磺酰脲类

答案：D

11.中毒症状主要表现为胃肠道反应、中枢神经系统反应和心脏毒性三个方面的是

A: 地高辛

B: 卡托普利
C: 哌唑嗪
D: 氨氯地平
答案：A

12.可用于治疗重度痤疮，但妊娠期妇女避免使用的药物是
A: 克拉霉素
B: 特比萘芬
C: 克罗米通
D: 异维A酸
答案：D

13.属于第四代头孢菌素的药物是()
A: 头孢哌酮
B: 头孢噻吩
C: 头孢吡肟
D: 头孢噻肟
答案：C

14.（2021年真题）关于钠-葡萄糖协同转运蛋白-2（SLG-2）抑制剂达格列净作用特点和不良反应的说法，错误的是（）
A: 适用于1型糖尿病或糖尿病酮症酸中毒
B: 重度肾功能不全患者禁用
C: 降糖效果受肾小球滤过的葡萄糖负荷的影响
D: 降糖作用不依赖于胰岛B细胞的功能及机体对胰岛素的敏感性
答案：A

15.属于必需氨基酸，人体不能合成或合成速度不能满足人体需要()

A: 精氨酸

B: 复方氨基酸注射液(18AA)

C: 赖氨酸

D: 复方氨基酸注射液(3AA)

答案：C

16.血浆蛋白结合率低，易透过血-脑屏障用于治疗流行性脑脊髓膜炎的药物是

A: 磺胺多辛

B: 甲氧苄啶

C: 复方新诺明

D: 磺胺嘧啶

答案：D

17.作用于DNA拓扑异构酶II的抗肿瘤药物是

A: 紫杉醇

B: 来曲唑

C: 顺铂

D: 依托泊苷

答案：D

18.下列对孕激素作用的描述，哪一项是不正确的()

A: 促进女性性器官的发育成熟

B: 大剂量抑制卵巢排卵

C: 抑制子宫平滑肌的收缩

D: 促进乳腺腺泡发育，为哺乳做准备

答案：A

19.特比萘芬属于()

A: 丙烯胺类抗真菌药

B: 唑类抗真菌药

C: 多烯类抗真菌药

D: 棘白菌素类抗真菌药

答案：A

20.对红霉素的描述，下列不正确的是

A: 具有肝脏毒性

B: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效

C: 抗茵谱与青霉素相似但略广

D: 属繁殖期杀菌剂

答案：D

21.蛋白结合率较高（>70%）的头孢菌素类是

A: 头孢吡肟

B: 头孢呋辛

C: 头孢曲松

D: 头孢噻肟

答案：C

22.（2017年真题）对需氧革兰阴性菌具有抗菌活性，属于单酰胺类的抗菌药物是（）

A: 氨曲南

B: 头孢吡肟

C: 拉氧头孢

D: 头孢西丁

答案：A

23.患者，男，35岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

A: 驱钩虫+亚叶酸钙

B: 驱钩虫+口服铁剂

C: 输血+注射右旋糖酐铁

D: 驱钩虫+注射右旋糖酐铁

答案：B

24.因易导致新生儿溶血,妊娠晚期妇女禁用的抗菌药物是（）

A: 苄星青霉素

B: 甲硝唑

C: 呋喃妥因

D: 庆大霉素

答案：C

25.甲氨蝶呤抗肿瘤作用机制是抑制

A: 四氢叶酸合成酶

B: 四氢叶酸还原酶

C: 二氢叶酸还原酶

D: 二氢叶酸合成酶

答案：C

26.（2015年真题）属于超强效的外用糖皮质激素是（）。

A: 曲安奈德

B: 卤米松

C: 地塞米松

D: 氢化可的松

答案：B

27.卡马西平适用于

A：急慢性脑功能不全

B：神经源性尿崩症

C：原发性失眠

D：内分泌失调引起的失眠

答案：B

28.没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是()。

A：氯化铵

B：右美沙芬

C：可待因

D：苯丙哌林

答案：D

29.关于黄体酮的叙述，下列说法正确的是

A：是天然孕激素

B：是短效类口服避孕药的组成成分

C：是长效类口服避孕药的组成成分

D：具有雄激素作用

答案：A

30.焦虑型、夜间醒来次数较多者宜选用

A：夸西泮

B：谷维素

C：氯美扎酮

D：氟西泮

答案：D

31.（2018年真题）不能减小前列腺的体积,也不能降低PSA水平，但可松弛前列腺平滑肌,缓解膀胱和下尿道急性症状的药物是（）

A: 西地那非

B: 坦索罗辛

C: 他达拉非

D: 非那雄胺

答案：B

32.主要用于口服给药的广谱青霉素类是

A: 头孢哌酮

B: 阿莫西林

C: 头孢噻肟

D: 庆大霉素

答案：B

33.联用治疗细菌性心内膜炎的是()

A: 青霉素和链霉素

B: 青霉素和磺胺嘧啶

C: 链霉素和磺胺嘧啶

D: 链霉素和异烟肼

答案：A

34.（2020年真题）通过抑制5-HT和去甲肾上腺素（NA）再摄取，增加突触间隙5-HT和NA浓度从而增强中枢5-HT和NA能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

A: 阿米替林

B: 吗氯贝胺

C: 度洛西汀

D: 舍曲林

答案：C

35.患者,女,63岁,因心绞痛急诊就医,诊断为ST段抬高心肌梗死,血压175/95mmHg,心率110次/分,该患者适使用的药物是

A: 贝那普利

B: 美托洛尔

C: 硝普钠

D: 氨氯地平

答案：B

36.（2015年真题）属于二磷酸腺苷P2Y12受体阻断剂的是（）。

A: 阿司匹林

B: 替罗非班

C: 氯吡格雷

D: 奥扎格雷

答案：C

37.（2017年真题）对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是（）

A: 吸入性糖皮质激素+长效 β2受体激动剂

B: 吸入性糖皮质激素+短效 β2受体激动剂

C: 长效M胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂

D: 长效 β2受体激动剂+长效M胆碱受体阻断剂

答案：A

38.（2015年真题）属于芳香氨酶抑制剂的抗肿瘤药是（）。

A：他莫昔芬

B：阿那曲唑

C：丙酸睾酮

D：炔雌醇

答案：B

39.细胞内液的主要阳离子是

A：钠

B：钙

C：钾

D：镁

答案：C

40.对氨基水杨酸的抗结核杆菌作用原理是

A：抑制分枝菌酸合成

B：抑制结核杆菌叶酸的代谢

C：抑制RNA多聚酶

D：抑制蛋白质合成

答案：B

41.具有心脏毒性的抗肿瘤药物

A：紫杉醇

B：长春新碱

C：柔红霉素

D：博来霉素

答案：C

42.周某，男，31岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

A: 四氢叶酸

B: 维生素B

C: 硫酸亚铁

D: 叶酸

答案：C

43.宜选用塞来昔布治疗的疾病是

A: 骨关节炎

B: 痛风

C: 胃溃疡

D: 支气管哮喘

答案：A

44.下列药物中，能促进食物消化的药物是

A: 雷尼替丁

B: 乳酶生

C: 胶体果胶铋

D: 兰索拉唑

答案：B

45.（2018年真题）对沙眼、结核性眼病及某些病毒性眼病均有治疗作用的药物是（）

A: 左氧氟沙星

B: 阿托品

C: 卡替洛尔

D: 利福平

答案：D

46.属于长效B2受体激动剂的平喘

A：多索茶碱

B：沙丁胺醇

C：沙美特罗

D：布地奈德

答案：C

47.物质代谢过程中催化"一碳单位"转移反应的辅酶组成成分是

A：叶酸

B：维生素A

C：维生素

D：维生素B

答案：A

48.关于外用糖皮质激素类药物的说法错误的是

A：外用糖皮质激素可增加感染风险

B：治疗全身性或严重过敏疾病时,不宜合用口服抗过敏药

C：外用糖皮质激素具有抗炎、抗过敏等作用

D：外用糖皮质激素不应长期、大面积应用

答案：B

49.关于右美沙芬药理作用及临床评价的说法,正确的是

A：通过阻断肺一胸膜的牵张感受器产生的质迷走神经反射而起到镇咳作用

B：口服吸收缓慢,主要经肝脏代谢作用时间长

C：镇咳作用弱于可待因

D: 主要用于干咳但左旋右美沙芬有镇痛作用

答案：D

50.属于头霉素类抗菌药物的是

A: 氨曲南

B: 头孢他啶

C: 头孢美唑

D: 头孢噻肟

答案：C

51.口服后在肝脏水解为阿昔洛韦而发挥抗疱疹病毒作用的药物是

A: 泛昔洛韦

B: 喷昔洛韦

C: 昔多福韦

D: 伐昔洛韦

答案：D

52.多黏菌素B的抗菌机制是

A: 影响叶酸代谢

B: 抑制细菌细胞壁的合成

C: 抑制蛋白质合成的全过程

D: 影响胞浆膜的通透性

答案：D

53.以上属于成瘾产妇的新生儿戒断症状的是

A: 胃痉挛、心动过速、极度疲乏

B: 神经过敏、失眠、恶心、呕吐

C: 惊厥、震颤、反射加速、发热

D：哈欠、打喷嚏、流涕、出汗

答案：C

54.关于ARB药物的叙述，错误的是

A：所有的ARB起效时间在2小时左右

B：除厄贝沙坦和替米沙坦外，其他药的口服生物利用度都较低

C：ARB药物多在体内代谢后排出

D：所有的ARB蛋白结合率大于96%

答案：C

55.属于白三烯受体阻断剂的平喘药是

A：多索茶碱

B：布地奈德

C：孟鲁司特

D：沙美特罗

答案：C

56.非选择性的钙拮抗剂是

A：硝苯地平

B：地尔硫卓

C：氟桂利嗪

D：维拉帕米

答案：C

57.长期频繁使用可致眼部真菌感染

A：氯霉素

B：利巴韦林

C：四环素可的松

D: 更昔洛韦

答案：C

58.属于PDE5抑制剂的禁忌人群的是

A: 2周前发生过心肌梗死或脑卒中

B: 轻度、稳定型心绞痛

C: 高血压未得到控制者

D: 中度的充血性心力衰竭

答案：C

59.判断华法林维持量是否足够，需观察的时间是

A: 12～15日

B: 8～10日

C: 5～7日

D: 2～3日

答案：C

60.可用于治疗阴茎勃起功能障碍的药物是

A: 米非司酮

B: 他达拉非

C: 炔诺酮

D: 丙酸睾酮

答案：B

61.患者，男，19岁，既往有癫痫病史2年，长期服用苯妥英钠控制良好。1周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4次/日。

A: 抑酸作用强大，持续时间长

B: 停药后复发率低

C: 很少发生耐药

D: 能有效地抑制夜间基础胃酸分泌

答案：D

62.下述不属于扩瞳药不良反应的是()

A: 结膜炎

B: 眼压降低

C: 一过性针刺感

D: 接触性眼睑皮肤炎

答案：B

63.可引起胃内压力增加和便秘的抗酸药是

A: 莫沙必利

B: 碳酸钙

C: 奥关拉唑

D: 枸橼酸铋钾

答案：B

64.长期、单一应用 β

A: 暂时性低血糖

B: 支气管痉挛

C：耐药性

D：头痛

答案：C

65.与脊髓上水平的中枢镇痛、欣快感和依赖性有关的受体

A: μ1受体

B: K受体

C: μ2受体

D: δ 受体

答案：A

66.属于广谱抗心律失常药物的是()

A: 利多卡因

B: 胺碘酮

C: 苯妥英钠

D: 地高辛

答案：B

67.多柔比星与肝素、头孢菌素等同用()

A: 导致坏死性结肠炎

B: 易产生沉淀

C: 增加肝毒性

D: 增加心脏毒性

答案：B

68.（2016年真题）军团菌和支原体混合感染宜首选的抗菌药物是

A: 头孢他啶

B: 罗红霉素

C: 利奈唑胺

D: 头孢曲松

答案：B

69.阿托品对眼部的作用特点是()

A: 扩瞳，调节麻痹

B: 缩瞳，降低眼压

C: 扩瞳，降低眼压

D: 缩瞳，调节麻痹

答案：A

70.下列关于氯化钾注射液的描述，正确的是()

A: 可以肌内注射，禁止直接静脉注射

B: 禁止肌内注射，可以直接静脉注射

C: 严禁肌内注射和直接静脉注射，仅可静脉滴注

D: 可以肌内注射，也可以直接静脉注射

答案：C

71.变异型心绞痛不宜选用的药物是()

A: 普萘洛尔

B: 胍乙啶

C: 硝苯地平

D: 硝酸甘油

答案：A

72.（2015年真题）治疗侵袭性念珠菌病首选（）。

A: 氟康唑

B: 灰黄霉素

C: 伏立康唑

D: 氟胞嘧啶

答案：A

73.下列哪种药物与碳酸钙合用时，易发生高钙血症

A：四环素类

B：噻嗪类利尿剂

C：氧化镁

D：阿莫西林

答案：B

74.体内代谢迅速,严重过量导致出血时,可用鱼精蛋白拮抗的药物是

A：阿司匹林

B：氯吡格雷

C：肝素

D：依诺肝素

答案：C

75.用于成人非瓣性房颤患者的卒中和全身栓塞，治疗深静脉血栓形成，解救药可用艾达司珠单抗的是

A：华法林

B：依达肝素

C：达比加群酯

D：肝素

答案：C

76.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

A：抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，升高尿尿酸量

B：碱化尿液，促进尿酸排泄

C：抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状

D：抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成

答案：C

77.属于丙烯胺类的是

A：氟胞嘧啶

B：特比萘芬

C：制霉菌素

D：卡泊芬净

答案：B

78.（2019年真题）患者，女，32岁，孕2周，既往有癫痫病史，长期服用卡马西平治疗，为防止引起新生儿出血，该患者妊娠晚期应当补充的维生素是（）

A：维生素K

B：叶酸

C：维生素B12

D：维生素D

答案：A

79.解救大剂量甲氨蝶呤中毒

A：地塞米松

B：氟他胺

C：昂丹司琼

D：亚叶酸钙

答案：D

80.治疗滴虫病宜选用

A：氯喹

B：吡喹酮

C：甲硝唑

D：甲苯咪唑

答案：C

81.因抑制P-糖蛋白使地高辛浓度增加70%～100%的是

A：克拉霉素

B：呋塞米

C：硫酸镁

D：胺碘酮

答案：D

82.两性霉素B属于()

A：棘白菌素类抗真菌药

B：唑类抗真菌药

C：多烯类抗真菌药

D：丙烯胺类抗真菌药

答案：C

83.丙烯胺类抗真菌药()

A：特比萘芬

B：阿莫罗芬

C：氟康唑

D：两性霉素

答案：A

84.单独应用时止吐作用相对较弱，主要作为辅助药物，用于减轻地塞米松所致焦虑和甲氧氯普胺所致静坐不能，也可用于减少预期性的化疗所致恶心呕吐的是

A: 氯丙嗪

B: 劳拉西泮

C: 甲氧氯普胺

D: 帕洛诺司琼

答案：B

85.强心苷的心脏毒性反应中最常见的心律失常是

A: 房颤

B: 二联律

C: 室性期前收缩

D: 房性期前收缩

答案：C

86.甲氨蝶呤主要用于()

A: 室管膜瘤

B: 慢性粒细胞性白血病

C: 髓母细胞瘤

D: 儿童急性白血病

答案：D

87.抑制过敏介质释放，主要用于预防哮喘发作的药物是

A: 异丙肾上腺素

B: 特布他林

C: 色甘酸钠

D: 倍氯米松

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/547121162052010024