
常见药物药理作用及临床应用知识试卷

1. 患者女性，40 岁。上呼吸道感染服用磺胺嘧啶。同时还可加用的药物是（ ）

- A、维生素 B6
- B、碳酸氢钠
- C、碳酸钙
- D、维生素 C
- E、氯化铵

【正确答案】：B

2. 对乙酰氨基酚较特殊的毒副作用（ ）

- A、瑞夷综合征
- B、高铁血红蛋白血症
- C、偶致视力障碍
- D、急性中毒可致肝坏死
- E、引起水钠潴留

【正确答案】：D

3. 有关氨基苷类抗生素的神经肌肉阻断作用描述不正确的是（ ）

- A、与抑制突触前膜乙酰胆碱释放有关
- B、不能用钙剂解救
- C、可用新斯的明解救
- D、表现为肌肉麻痹，呼吸暂停
- E、不宜与肌肉松弛药合用

【正确答案】：B

4. 对水盐代谢影响最大的是（ ）

- A、醛固酮
- B、氢化可的松
- C、泼尼松
- D、地塞米松
- E、氟轻松

【正确答案】：A

5. 吗啡的适应证是（ ）

- A、肺心病
- B、支气管哮喘
- C、心源性哮喘
- D、分娩止痛
- E、颅脑损伤、颅内高压

【正确答案】：C

6. 胺碘酮的作用是 ()

- A、延长 APD, 阻滞 Na^+ 内流
- B、缩短 APD, 阻滞 Na^+ 内流
- C、延长 ERP, 促进 K^+ 外流
- D、缩短 APD, 阻断 β 受体
- E、缩短 ERP, 阻断 α 受体

【正确答案】：A

7. 对快动眼睡眠影响小, 成瘾性轻的安眠药是 ()

- A、苯巴比妥
- B、地西洋
- C、司可巴比妥
- D、硫喷妥钠
- E、巴比妥

【正确答案】：B

8. 新斯的明的药理作用特点是 ()

- A、兴奋骨骼肌作用最强
- B、兴奋胃肠平滑肌作用最强
- C、促进腺体分泌作用最强
- D、兴奋中枢作用最强
- E、减慢心率作用最强

【正确答案】：A

9. 对骨髓无明显抑制作用的药物是 ()

- A、长春新碱
- B、5-氟尿嘧啶
- C、甲氨蝶呤
- D、环磷酰胺
- E、6-巯基嘌呤

【正确答案】：A

10. 丙硫氧嘧啶 ()

- A、能诱发甲状腺功能亢进
- B、对甲状腺功能亢进危象、重症甲状腺功能亢进列为首选的药物
- C、能引起粒细胞的减少
- D、引起黏液性水肿
- E、需在体内转化后, 通过抑制过氧化酶活性而抑制酪氨酸碘化及耦联的抗甲状腺药

【正确答案】：B

11. 患者男性，55 岁。1 小时前因右侧腰背部剧烈疼痛，难以忍受，出冷汗，服颠茄片不见好转，来院急诊。尿常规检查：可见红细胞。B 型超声波检查：肾结石。患者宜选用的药物是（ ）

- A、阿托品
- B、哌替啶
- C、阿托品并用哌替啶
- D、吗啡
- E、阿托品并用吗啡

【正确答案】：C

12. 下列消毒剂中属中效消毒剂的是（ ）

- A、戊二醛
- B、过氧乙酸
- C、氯己定
- D、臭氧
- E、碘伏

【正确答案】：E

13. 产 ESBLs 肠杆菌科细菌以（ ）最为常见

- A、鲍曼不动杆菌
- B、结核分支杆菌
- C、大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌
- D、铜绿假单胞菌
- E、沙门氏菌

【正确答案】：C

14. 以下哪项不是外周阿片受体的作用（ ）

- A、肠梗阻
- B、便秘
- C、内分泌失调
- D、感冒
- E、肿瘤生长

【正确答案】：D

15. 对阿苯达唑药理特点的描述错误的是（ ）

- A、具有驱虫谱广、高效、低毒的特点
- B、口服后吸收迅速，血药浓度很高
- C、对肠道多种蠕虫有驱杀作用
- D、对棘球蚴病（包虫病）、肺吸虫病无效
- E、副作用轻，一般耐受良好

【正确答案】：D

16. 治疗量麻黄碱皮下注射，血压变化是（ ）

- A、收缩压和舒张压均缓慢而持久升高，对肾血流影响较小
- B、收缩压升高，舒张压不变或稍下降
- C、收缩压升高，舒张压升高，脉压差变小
- D、收缩压升高，舒张压上升不多，脉压差变大
- E、收缩压升高，舒张压下降，脉压差变大

【正确答案】：D

17. 下列有关乙胺丁醇的描述正确的是（ ）

- A、肾功能不全患者可用
- B、对耐药结核杆菌无效
- C、抗菌作用与增加通透性有关
- D、已被对氨基水杨酸取代
- E、不良反应少，视神经炎是最严重的毒性反应

【正确答案】：E

18. 下列有关抗流感病毒药描述不正确的是（ ）

- A、金刚烷胺对甲型流感病毒有效
- B、金刚烷胺对乙型流感病毒有效
- C、利巴韦林对甲型流感病毒有效
- D、利巴韦林对乙型流感病毒有效
- E、奥司他韦对甲型流感病毒有效

【正确答案】：B

19. 患者男性，18 岁，确诊金黄色葡萄球菌引起的急性骨髓炎，最佳选药是林可霉素。若加用红霉素可以（ ）

- A、扩大抗菌谱
- B、由于竞争结合部位产生拮抗作用
- C、增强抗菌活性
- D、降低毒性
- E、增加毒性

【正确答案】：B

20. 一急性阿米巴痢疾患者妊娠 8 个月可选用下列哪种药物（ ）

- A、氯喹
- B、新斯的明
- C、喹碘方
- D、甲硝唑
- E、四环素

【正确答案】：D

21. 糖皮质激素最常用于（ ）

-
- A、过敏性休克
 - B、心源性休克
 - C、神经性休克
 - D、感染性休克
 - E、低血容量性休克

【正确答案】：D

22. 术前给予大剂量催眠药的目的是（ ）

- A、消除患者紧张情绪
- B、迅速进入外科麻醉期
- C、在此基础上进行麻醉，可使药量减少，麻醉平稳
- D、防止吸入性肺炎及反射性心律失常
- E、以增强麻醉效果

【正确答案】：C

23. 复方鲜竹沥液适用于以下哪个证型（ ）

- A、痰热咳嗽，痰黄黏稠
- B、风寒感冒咳嗽
- C、风热咳嗽，痰多上气
- D、咳嗽多痰，气促，气喘
- E、NULL

【正确答案】：A

24. 急性苯中毒主要损害是（ ）

- A、神经系统、消化系统、血液系统
- B、骨骼、泌尿系统
- C、中枢神经系统
- D、骨骼、牙齿
- E、消化系统、呼吸系统

【正确答案】：C

25. 抗精神病作用强而几乎无锥体外系副作用的药物是（ ）

- A、氯丙嗪
- B、氯氮平
- C、氟哌啶醇
- D、氯普噻吨
- E、五氟利多

【正确答案】：B

26. 抗抑郁症药是（ ）

- A、氯丙嗪
- B、丙米嗪

-
- C、碳酸锂
 - D、地西洋
 - E、五氟利多

【正确答案】：B

27. 局部应用治疗阴道滴虫病的是（ ）

- A、甲硝唑
- B、二氯尼特
- C、喹碘方
- D、氯喹
- E、乙酰砷胺

【正确答案】：E

28. 在物理降温配合下，可使体温降至正常以下，用于人工冬眠的药物是（ ）

- A、哌替啶
- B、异丙嗪
- C、氯丙嗪
- D、布洛芬
- E、酮替芬

【正确答案】：C

29. 以下关于食物与药物相互作用的说法，错误的是（ ）

- A、红霉素宜与碱性食物同服
- B、大量乳制品不宜与诺氟沙星同服
- C、多食蛋白质食物有利于铁剂吸收
- D、服多酶片等酶制剂时可饮茶
- E、NULL

【正确答案】：D

30. 伴有糖尿病的水肿患者，不宜选用的利尿药是（ ）

- A、氢氯噻嗪
- B、呋塞米
- C、螺内酯
- D、乙酰唑胺
- E、山梨醇

【正确答案】：A

31. 半合成青霉素的分类及其代表药搭配正确的是（ ）

- A、耐酶青霉素——阿莫西林
- B、抗铜绿假单胞菌广谱类——双氯西林
- C、耐酸青霉素——苯唑西林
- D、抗铜绿假单胞菌广谱类——青霉素 V

E、广谱类——氨苄西林

【正确答案】：E

32. 治疗立克次体感染的首选药是（ ）

- A、头孢他啶
- B、土霉素
- C、庆大霉素
- D、多西环素
- E、氯霉素

【正确答案】：D

33. 硝酸甘油的作用不包括（ ）

- A、扩张静脉
- B、降低回心血量
- C、增快心率
- D、增加室壁肌张力
- E、降低前负荷

【正确答案】：D

34. 老年人服用甲状腺素过量时，可出现（ ）

- A、心绞痛和心肌梗死
- B、血管神经性水肿
- C、甲状腺功能不全
- D、致癌作用
- E、粒细胞缺乏症

【正确答案】：A

35. 硫脲类最严重的不良反应是（ ）

- A、过敏反应
- B、粒细胞缺乏症
- C、血管神经性水肿
- D、甲状腺功能低下
- E、新生儿甲状腺肿

【正确答案】：B

36. 肥胖及单用饮食控制无效的轻型糖尿病患者最好选用（ ）

- A、二甲双胍
- B、氯磺丙脲
- C、正规胰岛素
- D、格列本脲
- E、罗格列酮

【正确答案】：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/547126054036010044>