

# 后勤员工院感防控知识考核

广东泰科物业管理有限公司驻中山六院项目部

您的姓名：[填空题] \*

---

1. 医疗废物袋装量达 3/4 时应扎紧袋口后放入医用废物暂存容器（转运箱）中，锐器盒装量达 3/4 时封口，转运时放入转运箱中，转运箱应加盖后扣紧环扣。[判断题] \*

对(正确答案)

错

2. 环境物体表面的清洁消毒首选经消毒液规范浸泡后的抹布或消毒湿巾擦拭，不宜采取喷洒消毒方式。[判断题] \*

对(正确答案)

错

3. 有序实施以“床单元”为单位的终末清洁与消毒工作时，从医用织物到环境物体表面，先清洁、后消毒，从上到下，从相对清洁物体表面到污染物体表面，清除所有污染与垃圾。可搬离的医疗设备与家具，应在原地实施有效清洁与消毒后，方可搬离。[判断题] \*

对(正确答案)

错

4. 医疗废物由医院专人、定时、定线、使用密封容器进行收集、运送，不污染环境。收集人员应做好必要的防护，如工作衣、手套等。每天运送结束后，应对运送工具进行清洁和消毒。[判断题] \*

对(正确答案)

错

5. 戴手套不能取代手卫生。 [判断题] \*

对(正确答案)

错

6. 疫情期间，在医院上班的保洁人员需要每天健康监测。 [判断题] \*

对(正确答案)

错

7. 医疗废物运送人员，无需应做好个人防护，因为医疗废物全部采取鹅颈式封口。  
[判断题] \*

对

错(正确答案)

8. 呼吸机、监护仪、输液泵、注射泵、雾化器等设备表面，用一次性消毒湿巾或75%乙醇，采用湿式擦拭，1次/日。 [判断题] \*

对(正确答案)

错

9. 有肉眼可见污染物：应先使用一次性吸水材料清除污染物，再用2000mg/L含氯消毒液完全清除污染物，作用30分钟。 [判断题] \*

对(正确答案)

错

10. 擦拭地面的地巾不同病房及区域之间应更换，用后集中清洗、消毒、干燥保存。 [判断题] \*

对(正确答案)

错

11. 被传染病病人血液、体液等污染时，清洁消毒顺序？ [单选题] \*

A.消毒→清洁→再消毒(正确答案)

B.消毒→清洁

C.清洁→消毒

D.清洁→消毒→再消毒

12. 当手部有血液或其他体液等肉眼可见的污染时，可采用下列哪种方式洗手？ [单选题] \*

A.使用速干手消毒剂消毒双手

B.卫生手消毒

C.流动水洗手(正确答案)

D.外科手消毒

13. 使用后医用织物暂存时间不超过。 [单选题] \*

A.24 小时

B.48 小时(正确答案)

C.72 小时

D.12 小时

14. 环境物体表面清洁与消毒方法，日常清洁每日清洁消毒多少次？ [单选题] \*

A.1 次

B.2 次(正确答案)

C.3 次

D.4 次

15. 配制 500mg/L 有效氯的消毒液 1000ml, 需要每片含 500mg 有效氯的片剂几片? [单选题] \*

A.1 片(正确答案)

B.2 片

C.3 片

D.4 片

16. 普通病区的床单元 (感染高风险部门除外), 日常清洁消毒原则为 ( ) [单选题] \*

A.每日上下午各清洁 1 次, 遇污染应随时清洁与消毒, 发生院感爆发或病区环境中检出多重耐药菌时, 应强化清洁消毒。(正确答案)

B.每周清洁 1 次

C.出院时再清洁

D.污染时清洁

17. 医疗废物不应超过包装物或容器容量多少应进行更换。 [单选题] \*

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4(正确答案)

18. 对疑似或确诊新冠肺炎患者的医疗废物的包装袋, 使用 ( C ) 的含氯消毒剂喷洒消毒? [单选题] \*

A.250mg/L

B.500mg/L

C.1000mg/L(正确答案)

D.5000mg/L

19. 用于清洁、消毒的布巾、地巾使用要求 \*

- A.不同区域、不同患者之间，抹布应更换(正确答案)
- B.不同病房、不同区域之间需要更换地巾(正确答案)
- C.所有清洁待用的抹布浸湿后拧干，每擦拭完一个床单元或清洁区域，丢弃于回收桶内，最后集中送洗/清洗消毒(正确答案)
- D.抹布数量应多于住院病人数量(正确答案)
- E.不应将使用后或污染的抹布重复浸泡至使用中清洁剂/消毒剂内反复使用(正确答案)

20. 被锐器刺伤后，伤口职业暴露后如何处理？ \*

- A.被锐器刺伤后，立即在伤口旁近心端向远心端轻轻持续挤压，尽可能挤出损伤处的血液，避免来回挤压，同时用肥皂水和流水进行冲洗，消毒液进行消毒，并包扎(正确答案)
- B.粘膜、角膜被污染后，立即用大量生理盐水反复对黏膜进行冲洗。及时请专科医师诊治(正确答案)
- C.职业暴露后，立即报告部门负责人，24小时内院内报告系统如实填写登记表备案(正确答案)

21. 在转运病人的过程中，我必须严格遵守规定，如果手触碰到污染的地方，应该立即进行手消毒。 [判断题] \*

对(正确答案)

错

22. 我天天转运发热病人，各项动作已经很熟练了，转运完毕后，可以不做好个人卫生就离开。 [判断题] \*

对

错(正确答案)

23. 佩戴防护口罩必须遮蔽口鼻，并且只能在安全区域(清洁区或指定脱卸地点)才能取下防护口罩。 [判断题] \*

对(正确答案)

错

24. 转运病人时，我戴了两层手套，可以不做手卫生，就能很好的保护自己 [判断题] \*

对

错(正确答案)

25. 出发热门诊，随便在一脱间或者二脱间脱防护服就可以，反正脱完就走了。 [判断题] \*

对

错(正确答案)

26. 医用防护口罩(N95)的佩戴方法错误的是 [单选题] \*

- A.将口罩罩住鼻.口及下巴，口罩下方带系于颈后，上方带系于头顶中部
- B.将一只手的大拇指和食指放在鼻夹上，向内按压，根据鼻梁形状塑造鼻夹 (正确答案)
- C.调整系带的松紧度，不应过松或过紧
- D.佩戴好的口罩应完全遮盖口鼻，完成密闭性检查

27. 关于进入发热门诊内预防院内感染正确的是 [单选题] \*

- A.在发热门诊脱防护用品后，我一定要认真进行卫生处置才能下班离开(正确答案)
- B.在发热门诊脱防护用品后，我可以直接下班离开
- C.在转运病人的过程中，我的手机从密封袋里掉了出来，我应该立即捡起来，并装回密封袋内继续使用
- D.转运病人时，我戴了双层手套，可以不做手卫生，就能很好的保护自己

28. 关于进出发热门诊流程，有误的是 [单选题] \*

- A.发热门诊执行规范的进出流程，必须严格遵守
- B.穿好防护服进入污染区后，就不能逆行再返回清洁区了

- C.绝对不能无任何保护，仅穿自己的私人衣物进入发热门诊诊室
- D.出发热门诊时候，随便在一脱间或者二脱间脱防护服就可以，反正脱完就走了  
(正确答案)

29. 关于佩戴防护面罩，正确的是 [单选题] \*

- A.佩戴后，很不舒服，影响工作，我可以随手取掉
- B.防护面罩起雾了，在操作中，我可以用手直接擦掉防护面罩内壁的雾气
- C.防护面罩意外掉落，我应该立即捡起来，重新戴上
- D.防护面罩意外掉落，紧急情况下，我应该执行手卫生后,重新佩戴一个新的面罩(消毒后的面罩)(正确答案)

30. 关于防护服的穿脱正确的是 [单选题] \*

- A.为了舒服，可以不将防护服的拉链完全拉上
- B.刚运送完病人，已经到了下班时间，为了方便，我随便找个地方把防护服脱了
- C.防护服的帽子可以不遮盖住头发，反正里面都还有帽子
- D.脱防护服很重要，必须在发热门诊一脱间(每两个病房外的小隔断房间)脱，并且每一步都要仔细，避免污染(正确答案)

31. 手卫生的指征有哪些？ \*

- A.接触病人前后(正确答案)
- B.接触病人体液、分泌物、血液、尿液、粪便、伤口、黏膜后(正确答案)
- C.触病人周围环境后(病人床单元周围)(正确答案)
- D.处理废物后，饭前便后(正确答案)

32. 进入隔离区要穿什么防护用品？ \*

- A.手卫生，乳胶手套(正确答案)
- B.工作服，隔离衣，防护服（必要时）(正确答案)
- C.医用外科口罩，医用防护口罩（必要时）(正确答案)
- D.护目镜/防护面屏,工作帽,靴套(正确答案)

33. 上班族在返岗途中应注意什么? \*

- A.在公共交通工具上，全程佩戴口罩，可随身携带免洗洗手液、消毒纸巾等，做好手卫生，并擦拭扶手等可能触碰的地方(正确答案)
- B.不随地吐痰，咳嗽打喷嚏时屈肘遮住口鼻(正确答案)
- C.条件允许时，适当打开窗户通风(正确答案)
- D.尽量不在火车上进食，若进食，应提前做好手部清洁(正确答案)

34. 去饭堂吃饭应该如何防控? \*

- A.建议买饭回办公室进餐，不扎堆进餐(正确答案)
- B.如必须在食堂进餐，可采用分餐制(正确答案)
- C.就餐人员可分时间段就餐，进餐时保持一定距离(正确答案)
- D.食堂按食品卫生要求进行规范消毒(正确答案)

35. 去搭乘公共电梯里如何防控? \*

- A.电梯是密闭场所，乘坐时要佩戴口罩(正确答案)
- B.触碰电梯按键后及时洗手(正确答案)
- C.如果楼层不高，可以选择步行上下楼(正确答案)
- D.有关管理部门定期对电梯进行消毒，视使用人数增加消毒频次，保证通风设备正常运转(正确答案)

36. 患者的床单、被套、病号服等物品，按生活垃圾处理。 [判断题] \*

对

错(正确答案)

答案解析：正确答案：医疗废物

37. 有人条件下，可持续开启空气消毒机消毒。 [判断题] \*

对(正确答案)

错



38. 不耐腐蚀的医疗器械，可用 75%乙醇消毒液浸泡 30min。[判断题] \*

对(正确答案)

错

39. 呕吐物、排泄物、分泌物可用专门容器收集，使用2000mg/L 的含氯消毒剂，按物:药比例 1:2，消毒作用 2 小时。[判断题] \*

对

错(正确答案)

答案解析：正确答案：20000 mg/L

40. 处置呕吐物、排泄物、分泌物等污染地面时，可用含有效氯5000 mg/L ~ 10000 mg/L 的含氯消毒液淋湿吸水材料（如纱布、抹布等）上，少量污物则小心移除。  
[判断题] \*

对(正确答案)

错

41. 处置呕吐物、排泄物、分泌物等大量污物时，消毒湿巾需覆盖作用30 min 后小心清除干净。[判断题] \*

对(正确答案)

错

42. 处置呕吐物、排泄物、分泌物时，清除污物后，再用高水平消毒湿巾或有效氯 2000mg/L 的含氯消毒剂的擦（拖）布擦（拖）拭可能接触到呕吐物的物体表面及其周围环境（消毒范围为呕吐物周围 1 米），擦拭 1 遍。[判断题] \*

对

错(正确答案)

答案解析：正确答案：2 米范围，擦拭 2 遍

43. 在无人状态下，使用气溶胶喷雾法对隔离病房进行室内空气消毒时。使用2000mg/L的含氯消毒剂，按20ml/m<sup>3</sup>的量进行气溶胶喷雾消毒。[判断题] \*

对(正确答案)

错

44. 在无人状态下，使用气溶胶喷雾法对隔离病房进行室内空气消毒时。消毒前开放门窗，喷雾时按先上后下、先左后右、对表面及空间均匀喷雾，作用60min。[判断题] \*

对

错(正确答案)

答案解析：正确答案：消毒前关闭门窗

45. 对隔离病房进行气溶胶喷雾法消毒时，必须覆盖所有区域，包括清洁区、潜在污染区、污物通道、病房的天花板、墙壁等。[判断题] \*

对(正确答案)

错

46. 气溶胶喷雾法进行室内消毒时，应将室内易腐蚀的仪器设备（如监护仪、显示器）等物品盖好，消毒结束后对易腐蚀物品用75%乙醇喷洒和一次性使用消毒湿巾擦拭消毒。[判断题] \*

对(正确答案)

错

47. 病人使用过的床单、被套、被褥及病号服等物品，直接装入单层黄色医疗废物袋，送洗涤机构按感染性织物消毒清洗处理。[判断题] \*

对

错(正确答案)

答案解析：正确答案：双层

48. 洁净系统的消毒：按要求更换过滤器；出风口用含有效氯 1000mg/L 的含氯消毒剂喷雾消毒，作用 60 分钟，消毒后用清水擦拭干净（如消毒处理后出现损坏，需更换）。[判断题] \*

对(正确答案)

错

49. 床帘和窗帘的消毒：1000mg/L 的含氯消毒剂喷洒至表面湿润，作用 30min 后，再按照常规程序进行拆洗处理。[判断题] \*

对(正确答案)

错

50. 终末消毒结束后，对隔离病房各区域的空气与物体表面进行消毒效果监测。[判断题] \*

对(正确答案)

错

51. 用 75%乙醇进行消毒时要特别注意防火。[判断题] \*

对(正确答案)

错

52. 轮椅、担架、床旁心电图机等不能专人专用的医疗器械、器具及物品要在每次使用后，使用 1000mg/L 的含氯消毒剂擦拭消毒。[判断题] \*

对(正确答案)

错

53. 隔离检查室患者检查后，环境和使用的物品应当进行终末消毒，并做好相关记录可追溯。[判断题] \*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/54800005060006034>