

## 2024 年安徽省泗县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库大全（能力提升）

### 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，28 岁，处于哺乳期，因阴道分泌物增多、稀薄且带鱼腥臭味，就医后确诊为细菌性阴道病，首选用药方案是

- A: 口服甲硝唑 400mg，每日 2 次，连服 7 日
- B: 甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚 1 次，连用 7 日
- C: 咪康唑栓，阴道给药，每晚 1 粒（200mg），连用 7 日
- D: 1: 2 服克林霉素 300mg，每日 2 次，连用 7 日

答案：B

2. 容易氧化的药物是

- A: 胃蛋白酶
- B: 青霉素类
- C: 牛痘菌苗
- D: 阿扑吗啡

答案：D

3. 收集所有质量可靠的随机对照试验经分析属于

- A: 四级证据
- B: 三级证据
- C: 一级证据
- D: 二级证据

答案：C

4. 以下药物中，用于治疗细菌感染性腹泻应首选的是

- A: 抗生素
- B: 谷维素
- C: 维生素
- D: 黄连素

**答案：D**

5. 中成药血脂康中含有的化学成分是

- A: 洛伐他汀
- B: 依折麦布
- C: 阿托伐他汀
- D: 辛伐他汀

**答案：A**

6. 外用杀精剂的主要活性成分为（）

- A: 壬苯醇醚
- B: 黄体酮
- C: 甲地孕酮
- D: 米非司酮

**答案：A**

7. （2017 年真题）患毒，27 岁，妊娠 20 周，出现发热体温最高达 38.5℃，体格检查：肾区叩痛，经相关实验室检查诊断为急性肾盂肾炎，宜选用的药物是（）

- A: 阿奇霉素
- B: 头孢噻肟钠
- C: 甲硝唑

D: 阿米卡星

**答案：B**

8. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

A: 阿司匹林肠溶片于晚上服用

B: 阿司匹林肠溶片应整片服用，不能嚼碎

C: 若需减量，阿司匹林肠溶片可掰开减量服用

D: 氨氯地平片可于早上服用

**答案：C**

9. 控制心室率的药物是

A: 氯吡格雷

B: 达比加群酯

C: 胺碘酮

D: 美托洛尔

**答案：D**

10. 适用于年轻、震颤突出的患者

A: 恩托卡朋

B: 左旋多巴

C: 司来吉兰

D: 苯海索

**答案：D**

11. 属于蛋白酶抑制剂的是（）

A: 齐多夫定

- B: 利托那韦
- C: 依非韦伦
- D: 利巴韦林

**答案：B**

12. 一级信息资料的最突出优点是

- A: 读者可以自己 对文献进行评价，免受他人观点的影响
- B: 提供的信息丰富、详实
- C: 查阅时需要利用所提供的参考文献去验证
- D: 内容广泛、使用方便

**答案：A**

13. 癫痫的药物治疗适用于各型癫痫的药物

- A: 丙戊酸钠
- B: 苯妥英钠
- C: 拉莫三嗪
- D: 卡马西平

**答案：A**

14. 可卡因属于哪一类兴奋剂

- A: 利尿剂
- B: 蛋白同化激素
- C:  $\beta$  受体阻断剂
- D: 精神刺激剂

**答案：D**

15. 患者，男，65 岁。因“不稳定型心绞痛急性发作”入院治疗。医生建议服用阿司匹林，正确的用量与用法是

A: 首次口服非肠溶制剂或嚼服肠溶制剂 300mg；随后 75~100mgqd，长期维持

B: 25~50mgqd，长期维持

C: 100-150mgqd，长期维持

D: 75~100mgbid，长期维持

**答案：A**

16. 治疗窗窄以及代谢存在较大的个体差异的药物是

A: 顺铂

B: 苯妥英钠

C: 茶碱

D: 地高辛

**答案：C**

17. 孕妇、绝经后女性及骨质疏松患者可适当选服

A: 钙剂

B: 中草药制剂

C: 复合营养素

D: 复合维生素

**答案：A**

18. 某患者，女，27 岁，多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁 3 个月。血 FT

A: 血压

B: 体重

C: 白细胞

D: 心率

**答案：A**

19. 第二代抗组胺药氯雷他定治疗过敏性鼻炎的用法、用量是

- A: 一次 2mg，每日 3 次
- B: 一次 10mg，每日 1 次
- C: 一次 4mg，每日 3 次
- D: 一次 4mg，每日 1 次

**答案：B**

20. 痉挛性便秘

- A: 乳果糖
- B: 比沙可啶
- C: 开塞露
- D: 羧甲基纤维素钠

**答案：D**

21. 布洛芬作为非处方药主要用于治疗

- A: 鼻炎
- B: 感冒
- C: 抑郁
- D: 发热

**答案：D**

22. 可单独用于轻度、早期高血压的是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 甘露醇
- C: 呋塞米
- D: 阿米洛利

**答案：A**

23. 患者，男，65 岁，慢性咳嗽、喘息 10 余年，活动后症状明显，近 7 天症状加重入院，伴便秘，每周 2 次排便。既往有高血压病史 12 年；长期口服硝苯地平控释片 30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温 36.6℃，P82 次/分，R22 次/分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿啰音，杵状指。辅助检查：血常规 WBC $11.2 \times 10^9 / L$ ，肺功能 FEV<sub>1</sub> / FVC60%，FEV<sub>1</sub>55%。治疗方案如下：氨溴索注射液 30mg tid ivgtt，莫西沙星氯化钠注射液 0.4g bid ivgtt，异丙托溴铵溶液 0.5mg bid 雾化吸入，布地奈德混悬液 1mg bid 雾化吸入

- A: 布地奈德混悬液
- B: 异丙托溴铵注射液
- C: 硝苯地平控释片
- D: 氨溴索注射液

**答案：B**

24. 与胆酸螯合剂合用，应至少提前 2h 服用的药物是

- A: 依折麦布
- B: 螺内酯
- C: 伊曲康唑
- D: 他汀类与烟酸类联用

**答案：A**

25. (抗癫痫药物的选择)，癫痫全身强直阵挛发作的一线用药是

- A: 乙琥胺
- B: 卡马西平
- C: 加巴喷丁
- D: 扑米酮

**答案：B**

26. 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药

B: 酚麻美敏口服液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚，应避免重复用药

C: 酚麻美敏口服液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药

D: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药

**答案：C**

27. 有助于药师明确被问询问题的咨询服务方法步骤是

A: 确立有效的检索方法、查阅文献

B: 对问题进行确定并归类

C: 对文献进行评价、分析和整理

D: 形成答案并以口头形式提供给询问者

**答案：C**

28. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。目前体检：身高 160cm，体重 70kg。实验室检查：白细胞  $8.0 \times 10^9 / L$ ，红细胞  $4.0 \times 10^{12} / L$ ，总胆红素  $11 \mu mol / L$ ，总胆固醇  $6.0 mmol / L$ ，空腹血糖  $7.6 mmol / L$ 。

A: 糖尿病

- B: 肝炎
- C: 感染性疾病
- D: 高脂血症

**答案：A**

29. 患儿，男，1 岁 3 个月，因仍不能独立行走而就诊。经询问其母亲，该患儿一直睡眠不好，夜哭较多，非常容易出汗，数次罹患呼吸道感染。查体：头部有“枕秃”。实验室检查：血钙水平低于正常值。诊断为“佝偻病”。

- A: 维生素 D+钙剂+泼尼松
- B: 复合维生素 B+钙剂
- C: 维生素 D+钙剂
- D: 复方维生素 AD+钙剂

**答案：C**

30. 变异型心绞痛发作应首选的药物是

- A: 美托洛尔
- B: 硝酸甘油
- C: 单硝酸异山梨酯
- D: 氨氯地平

**答案：D**

31. 以下药物中，肝病患者应该慎用的是

- A: 泛酸钙
- B: 氯丙嗪
- C: 甘草酸二铵
- D: 谷氨酸

**答案：B**

32. 稳定型心绞痛发作时应选用的治疗药物是（）

- A: 氟伐他汀
- B: 美托洛尔
- C: 硝酸甘油
- D: 阿司匹林

**答案：C**

33. 口服普萘洛尔用于解救

- A: 瘦肉精中毒
- B: 硝西泮中毒
- C: 氯丙嗪中毒
- D: 苯丙胺中毒

**答案：A**

34. 由用药顺序确定最可疑致病药物一有意识地停用最可疑或引起相互作用的药物一根据停药后症状的变化、确诊，即可

- A: 确定致病药物
- B: 排除药物以外的因素；必要的实验室检查
- C: 流行病学的调查
- D: 追溯用药史；询问用药过敏史和家族史

**答案：A**

35. 急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为

- A: 溶栓前 12h
- B: 溶栓后 24h
- C: 溶栓同时
- D: 溶栓后 12h

**答案：B**

36. 服药时进食高脂肪食物可促进药物吸收的是

- A: 硫酸亚铁
- B: 维生素 A
- C: 西咪替丁
- D: 格列本脲

**答案：B**

37. 药物对医学检查指标异常结果的影响,可能导致  $\gamma$ -谷氨酰转移酶升高的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 阿司匹林
- C: 胰岛素
- D: 氯氮平

**答案：A**

38. 分析以下用药错误的事例,属于"认知缺失"的是

- A: 患者自行选购药品、误用假药、劣药
- B: 新手值班以及计算机医嘱系统缺陷
- C: 调剂工作过于繁忙
- D: 医师非主观意愿的诊断错误、造成误诊误治

**答案：D**

39. 药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

- A: 没有临床症状,无需治疗
- B: 指不良反应症状不明显,重要器官或系统功能有轻度损害
- C: 指轻微的反应或疾病,症状不发展,一般无需治疗

D: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

**答案：D**

40. 抗类风湿关节炎药物中,至少服用 6 个月才能宣布无效，可导致失明的是

A: 柳氮磺吡啶

B: 青霉素

C: 来氟米特

D: 氯喹

**答案：D**

41. 治疗胃食管反流病，艾司奥美拉唑的正确服药时间是

A: 三餐前 30min

B: 早餐前 30min

C: 症状发作时、餐后 1.5h 和睡前

D: 餐后、睡前

**答案：B**

42. 对 A 组  $\beta$  溶血性链球菌有抗菌活性，但由于抗菌谱广，且过度使用可能延迟结核病的诊断，增加结核分枝杆菌对该类药物的耐药性，不建议用于常规治疗的药物是

A: 阿莫西林

B: 克林霉素

C: 莫西沙星

D: 阿奇霉素

**答案：C**

43. 重要器官或系统功能有严重损害、缩短或危及生命，应判为

- A: 重度
- B: 弱轻度
- C: 中度
- D: 轻度

**答案：A**

44. 患者到药店购买"扑尔敏片"，药师应给予()

- A: 氯苯那敏片
- B: 更昔洛韦片
- C: 阿昔洛韦片
- D: 奥司他韦片

**答案：A**

45. 用药后可出现痛风、面色潮红的抗结核药是

- A: 吡嗪酰胺
- B: 链霉素
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

**答案：A**

46. 患者，女，43 岁。近 3 月来午后低热，剧烈咳嗽，痰中带血，进食少，乏力，消瘦，应用抗菌药及止咳化痰药物无效，×线检查未见异常，血沉未见增快，痰中找到结核菌，临床诊断为肺结核。

- A: 定期随诊，监测血常规和肝肾功能
- B: 由于增加不良反应，不提倡联合用药
- C: 应全程督导服药，提高用药的依从性
- D: 肺结核属于传染病，患者咳嗽、打喷嚏和高声讲话时不能直向旁人

**答案：B**

47. 患者，女，55 岁，化验结果：TC4.0mmol/L（参考值参<5.2mmol/L），TG8.1mmol/L（参考值 0.56~1.70mmoL/L），应首选的调脂药物为

- A: 氟伐他汀
- B: 苯扎贝特
- C: 依折麦布
- D: 烟酸

**答案：B**

48. （2019 年真题）下列通用名与别名的组合中，不是同一种药品的是

- A: 醋酸氯己定与洗必泰
- B: 氨甲苯酸与止血敏
- C: 桂利嗪与脑益嗪
- D: 利可君与利血生

**答案：B**

49. 三环类抗抑郁药中毒出现

- A: 明显的锥体外系症状
- B: 心血管毒性
- C: 肌肉震颤、抽搐
- D: 谵妄、躁狂、幻觉

**答案：B**

50. 药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑 ADR 时，需要进行因果关系评价患者，男，45 岁，因慢性乙型肝炎给予干扰素，治疗 1 个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状逐渐好转，再次应用干扰素，患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是

- A: 肯定
- B: 可能无关
- C: 可能
- D: 很可能

**答案：A**

51. 下列为二级信息源的药学文献的是

- A: 药物信息手册
- B: 中国国家处方集
- C: 药学杂志
- D: 中国药学文摘

**答案：D**

52. 常用于退热时的是

- A: 肌肉注射
- B: 直肠给药
- C: 静脉注射
- D: 口服给药

**答案：B**

53. 6 岁以下的儿童应该慎用的抗过敏药品是

- A: 四环素
- B: 氯雷他定
- C: 依巴斯汀
- D: 庆大霉素

**答案：C**

54. 药师应及时向患者交待有关用药的注意事项，以避免误用药物，减轻患者不必要的恐慌，提高用药依从性。根据患者用药情况，发药时药师应有针对性的提示患者各类药物的应用注意事项。

- A: 患者二?
- B: 患者三?
- C: 患者四?
- D: 患者一?

**答案: A**

55. 阿司匹林可导致

- A: 结晶沉积
- B: 肾小球滤过率下降
- C: 前列腺素合成障碍
- D: 不可逆性肾小管坏死

**答案: C**

56. 患者，女，56 岁。患直肠癌，其粪外观可呈现

- A: 细条便
- B: 鲜血便
- C: 乳凝块便
- D: 白陶土样便

**答案: A**

57. 可引起驾驶员口渴、头晕的药物是

- A: 抗过敏药
- B: 双嘧达莫
- C: 阿米洛利
- D: 东莨菪碱

**答案：C**

58. 发挥局部作用的栓剂是

- A: 甘油栓
- B: 吲哚美辛栓
- C: 阿司匹林栓
- D: 盐酸克伦特罗栓

**答案：A**

59. 溶栓治疗

- A: 阿司匹林
- B: 巴曲酶
- C: 低分子肝素
- D: 阿替普酶

**答案：D**

60. 治疗癌痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘,宜选择的药物是()

- A: 乳果糖
- B: 硫酸镁
- C: 东莨菪碱
- D: 比沙可啶

**答案：A**

61. 抗抑郁药司来吉兰用于伴前列腺增生症患者,应评判为

- A: 无正当理由超适应证用药
- B: 过度治疗用药
- C: 有禁忌证用药
- D: 联合用药不适宜

**答案：C**

62. 因可提高血液携氧量,被长跑运动员用于提高成绩,因而被列为兴奋剂管理的药物是()

- A: 人促红素
- B: 甲睾酮
- C: 哌替啶
- D: 可卡因

**答案：A**

63. 服用帕罗西汀等选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的患者,如果欲更换用单胺氧化酶抑制剂,必须先停用()

- A: 5 天
- B: 14 天
- C: 7 天
- D: 10 天

**答案：B**

64. 治疗头痛的非处方药应首选

- A: 谷维素
- B: 阿司匹林
- C: 布洛芬
- D: 对乙酰氨基酚

**答案：D**

65. 氢氯噻嗪与地高辛同服出现心律失常的机制是

- A: 协同作用
- B: 敏感化作用

C: 减少不良反应

D: 竞争性拮抗作用

**答案: B**

66. 可减弱华法林抗凝作用的食物有

A: 韭菜

B: 葡萄柚

C: 大蒜

D: 洋葱

**答案: A**

67. 可能影响儿童骨骼发育的药物是

A: 头孢克洛

B: 阿莫西林

C: 诺氟沙星

D: 华法林

**答案: C**

68. 关于蛇咬伤中毒后的一般处理措施，叙述错误的是

A: 用绳索将伤口的近心端 5cm 处捆住，以防止毒液在体内扩散

B: 用 1: 1000 高锰酸钾溶液反复冲洗伤口

C: 每隔 15~20min 放松带子 1~2min. 以防止肢体缺血坏死

D: 在伤口上做多个“十”字小切口以便排毒

**答案: B**

69. 过敏性皮炎常表现为()

A: 中性粒细胞增多

B: 血红蛋白减少

C: 红细胞增多

D: 嗜酸性粒细胞增多

**答案：D**

70. 药名词干为"-penem"的药品是

A: #NAME?

B: #NAME?

C: #NAME?

D: #NAME?

**答案：D**

71. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体检面色较苍白。

血红蛋白 80g / L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞  $7 \times 10^9 / L$ ，血小板  $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁  $300 \mu g / L$ 。

A: 输血

B: 右旋糖酐铁肌注

C: 硫酸亚铁口服

D: 维生素 B12 肌肉注射

**答案：C**

72. 治疗流行性脑脊髓膜炎首选药是

A: 替硝唑

B: 磺胺多辛

C: 磺胺嘧啶

D: 磺胺甲噁唑

**答案：C**

73. 结肠癌

- A: 红细胞
- B: 真菌
- C: 上皮细胞
- D: 白细胞增多

**答案：A**

74. (2015 年真题) 可作为根除幽门螺旋杆菌感染一线治疗方案的是 ( )。

- A: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mg tid+枸橼酸铋钾 0.6g tid
- B: 埃索美拉唑 20mgqd+阿莫西林 1.0gqd+枸橼酸铋钾 0.6gqd
- C: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mgbid+阿莫西林 1.0g tid+枸橼酸铋钾 0.6g tid
- D: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mgqd+阿莫西林 0.5g tid

**答案：C**

75. 治疗严重先兆子痫的首选药物为

- A: 依那普利
- B: 硫酸镁
- C: 氢氯噻嗪
- D: 美托洛尔

**答案：D**

76. (2021 年真题) 下列组合中，属于联合化疗的是 ( )

- A: CHOP 方案 (环磷酰胺+阿霉素+长春新碱+泼尼松)
- B: MTX 方案 (甲氨蝶呤小剂量鞘内注射+甲氨蝶呤大剂量静脉输注)
- C: CTX+美司钠 (环磷酰胺+美司钠)
- D: VEGF 抑制剂+ALK 抑制剂 (贝伐珠单抗+奥希替尼)

**答案：A**

77. 处方中“溶液”的规范书写是

- A: Dos
- B: Mist
- C: Liq
- D: Dil

**答案：C**

78. 老年糖尿病患者不建议使用

- A: 噻唑烷二酮类
- B: 双胍类
- C:  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂
- D: 长效磺脲类

**答案：D**

79. 患者,男,57岁,化验结果:TC4.6mmol/L(参考值<5.2mmol/L),TG11.0mmol/L(参考值0.56——1.70mmol/L)尿酸508 $\mu$ mol/L(参考值<420 $\mu$ mol/L),应首选的调脂药物为()

- A: 考来烯胺
- B: 非诺贝特
- C: 烟酸
- D: 依折麦布

**答案：B**

80. 患儿,男,6个月,体重9.0kg,平素健康,近日出现多汗、夜哭、易惊。体检:前囟平软,颅骨有乒乓球感,枕秃,肋骨串珠。人工喂养,尚未添加任何辅食,平素较少出门。

- A: 6000IU

B: 400IU

C: 10000IU

D: 4000IU

**答案：D**

81. 脂溶性维生素 A 宜餐后服用的原理是

A: 利用油脂增加其溶解

B: 减少被胃酸破坏

C: 餐后胃酸分泌增多有利于吸收

D: 延长在胃肠道中的滞留时间

**答案：A**

82. （2015 年真题）接种乙肝疫苗后，血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是（ ）。

A: 乙型肝炎病毒 e 抗原

B: 乙型肝炎病毒表体抗体

C: 乙型肝炎病毒表面抗原

D: 乙型肝炎病毒

**答案：B**

83. 患者，男，65 岁，慢性咳嗽、喘息 10 余年，活动后症状明显，近 7 天症状加重入院，伴便秘，每周 2 次排便。既往有高血压病史 12 年；长期口服硝苯地平控释片 30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温 36.6℃，P82 次/分，R22 次/分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿啰音，杵状指。辅助检查：血常规 WBC $11.2 \times 10^9/L$ ，肺功能 FEV<sub>1</sub>/FVC60%，FEV<sub>1</sub>55%。治疗方案如下：氨溴索注射液 30mg tid ivgtt，莫西沙星氯化钠注射液 0.4g bid ivgtt，异丙托溴铵溶液 0.5mg bid 雾化吸入，布地奈德混悬液 1mg bid 雾化吸入

- A: 后期发作必要时可使用 PDE-4 抑制剂
- B: 需掌握吸入技术
- C: 单独应用 ICS 减少急性发作频数
- D: 偶发呼吸困难可使用短效支气管舒张剂

**答案：C**

84. 肌肉注射给药的外文缩写是

- A: ivgtt
- B: im
- C: i. h
- D: iv

**答案：B**

85. 低危患者

- A: 先观察（血压及危险因素）数周，然后决定是否进行药物治疗
- B: 观察相当一段时间，再决定是否进行药物治疗
- C: 立即进行抢救治疗
- D: 立即使用抗高血压药物

**答案：B**

86. 患者,男,65 岁,临床诊断:2 型糖尿病、周围神经病变、冠心病。

- A: 瑞格列奈片用量不合理
- B: 单硝酸异山梨酯缓释片用量不合理
- C: 选用美托洛尔缓释片不合理
- D: 选用阿卡波糖片不合理

**答案: B**

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文,请访问:

<https://d.book118.com/548010062046007022>